

4^o Zool. 128^f

JÄHRliche
PERIODE DER INSECTENFAUNA VON ÖSTERREICH-UNGARN.

IV. DIE SCHMETTERLINGE (*LEPIDOPTERA*).

2. DIE NACHTFALTER (*HETEROCERA*).

VON

KARL FRITSCH,

EM. VICE-DIRECTOR DER K. K. CENTRAL-ANSTALT FÜR METEOROLOGIE UND ERDMAGNETISMUS, CORRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Mit graphischen Darstellungen auf 4 Tafeln.

BESONDERS ABGEDRUCKT AUS DEM XII. BANDE DER DENKSCHRIFTEN DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE
DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI KARL GEROLD'S SOHN,
BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1879.

JÄHRLICHE
PERIODE DER INSECTENFAUNA VON ÖSTERREICH-UNGARN.

IV. DIE SCHMETTERLINGE (*LEPIDOPTERA*).

2. DIE NACHTFALTER (*HETEROCERA*).

VON

KARL FRITSCH,

EM. VICE-DIRECTOR DER K. K. CENTRAL-ANSTALT FÜR METEOROLOGIE UND ERDMAGNETISMUS, CORRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Mit graphischen Darstellungen auf 4 Tafeln.

BESONDERS ABGEDRUCKT AUS DEM XLI. BANDE DER DENKSCHRIFTEN DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE
DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI KARL GEROLD'S SOHN,
BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1879.

JÄHRGANG

PERIODE DER INSEKTENFAUNA VON ÖSTERREICH-UNGARN

IV. DIE SCHMETTERFLUGEN (LEPIDOPTERA)

2. DIE NACHTFALTERN (NYCTOPTERA)

VON

KARL FRITSCHE

Im kaiserlichen Hofmuseum in Wien

Verlag von Carl Gerold's Sohn

WIEEN

Verlag des kaiserlichen Hofmuseum in Wien

Verlag von Carl Gerold's Sohn

1879

JÄHRLICHE PERIODE DER INSECTENFAUNA

VON

ÖSTERREICH-UNGARN.

IV. DIE SCHMETTERLINGE (*LEPIDOPTERA*).

2. DIE NACHTFALTER (*HETEROCERA*).

VON

KARL FRITSCH,

EM. VICE-DIRECTOR DER K. K. CENTRAL-ANSTALT FÜR METEOROLOGIE UND ERDMAGNETISMUS, CORRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

(Mit graphischen Darstellungen auf 4 Tafeln.)

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 13. JUNI 1879.

Dem ersten Theile meiner Arbeit über die Schmetterlinge, welcher die Tagfalter (*Rhopalocera*) behandelt, lasse ich nun den zweiten folgen, welcher die übrigen Ordnungen, die als *Heterocera* zusammengefasst werden, zum Gegenstande hat, also die Schwärmer, Spinner, Eulen, Spanner und die Klein-Schmetterlinge: Wickler, Zünsler, Motten und Federmotten.

Zu den Tagfaltern könnte man in phänologischer Beziehung auch einen beträchtlichen Theil der *Heterocera* rechnen, welche in allen Familien bald mehr, bald weniger Gattungen enthalten, die Tags über fliegen, und über welche sich daher, da die Beobachtungen in der Regel nur am Tage angestellt werden, gleich genaue Daten der Erscheinung wie über die Tagfalter sammeln lassen.

Schon im Jahre 1844, als ich in Prag Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Thierreiche anzustellen begann,¹ dehnte ich sie über beide Abtheilungen aus, wenn die Beobachtungen auch vorerst nur wenige Arten umfassten — 28 im J. 1844 und 65 im J. 1845 — meistens solche, die man schon im Fluge leicht erkennen kann, ohne sie erst fangen und näher untersuchen zu müssen.

In der ersten Anleitung zu derlei Beobachtungen, welche ich in Kreil's Auftrage Namens der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie im J. 1853 verfasste, waren von Tagfaltern 22, Schwärmern nur 6, von Spin-
nern 3, von Eulen nur 1 Art aufgestellt worden. Alle übrigen Familien blieben unberücksichtigt.²

¹ K. Kreil, Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. Anhang: Vegetations-Beobachtungen von K. Fritsch. Prag 1845 und 1846.

² K. Kreil, Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt, II. Band. Anhang: Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Pflanzen- und Thierreiche von K. Fritsch. Wien 1854.

In der grösseren Instruction vom J. 1856 wurden empfohlen: von Tagfaltern 40, Schwärmern 17, Spinnern 12, Eulen 6, Spannern 3, Motten und Federmotten je nur 1 Art.¹

Mein hochgeehrter Freund, Herr Custos A. Rogenhofer, wählte für seine Instruction² von Tagfaltern 36, Schwärmern 13, Spinnern 18, Eulen 23, Spannern 16, Züslern 8, Wicklern ebenfalls 8, Motten 16 und Federmotten 3 Arten.

In der dritten Instruction endlich, welche von mir anlässlich des internationalen statistischen Congresses in Wien (1857) im J. 1859 ausging,³ von Tagfaltern 26, Schwärmern 8, Spinnern 4, und von Eulen, Spannern und Federmotten nur je 1 Art. Die Arten sind hier unter die Ordnungen nach Heidenreich's Katalog vertheilt.

Man darf wohl annehmen, dass für die in den Instructionen enthaltenen Arten die meisten Beobachtungen von den Stationen vorliegen. Nähere und bestimmte Aufschlüsse hierüber kann nur die Einsicht in die Namen-Register und die Vergleichung der beiderseitigen Verzeichnisse einerseits der Instructionen, andererseits des folgenden Registers der Erscheinungszeiten gewähren. Hierauf hingedeutet zu haben, dürfte hier genügen.

In den Instructionen wurden nur über bestimmte näher bezeichnete Arten Beobachtungen verlangt, weil dieselben von verschiedenen Orten nur dann vergleichbar sind, wenn sie sich auf dieselben Objecte beziehen. Ich selbst und mehrere andere Theilnehmer an den Beobachtungen beschränkten ihre Beobachtungen nicht auf die in den Instructionen genannten Arten, sondern dehnten sie so weit als thunlich über die ganze Fauna aus, ohne dass sie an Genauigkeit einbüssten.

Besonders hervorzuheben sind in dieser Hinsicht vor den übrigen zuerst die zehnjährigen Aufzeichnungen in den Jahren 1859—68 des Herrn Joseph Otto in Brünn, welcher früher einige Jahre hindurch auch schon in Neutitschein beobachtete, dann die vierjährigen mit besonderer Sorgfalt gesammelten Aufzeichnungen des Herrn Prof. J. Geyer zu Gömör-Rosenau in Ungarn.⁴ Ihnen reißen sich zunächst an: †Prof. J. Hinteröcker in Linz und die meisten der übrigen in der Abtheilung für die Tagfalter angeführten Theilnehmer. Näheres hierüber, so weit es die Namen der Stationen betrifft, kann man aus dem Index entnehmen. Ich selbst beobachtete in Salzburg im Ganzen nahe an 500, in Wien über 300 Arten (494 und 329).

Die Jahrgänge der Beobachtungen an den Stationen sind dieselben wie bei den Tagfaltern, nur für Salzburg wurden auch noch die Beobachtungen des Jahres 1878 einbezogen, worüber in der Abtheilung B Näheres enthalten ist.

Heinemann hat in den drei Bänden seines Werkes über die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz⁵ 3460 Arten beschrieben. Von diesen liegen hier für 897 Arten Beobachtungen vor, also nur für 26% der sämtlichen Arten. Viel günstiger gestaltet sich aber das Verhältniss nach Ausscheidung der so zahlreichen Motten.

Während die Tagfalter mit mehr als 70% vertreten sind, entfallen für die Schwärmer, Spinner und Spanner noch je über oder bei 50%, die Eulen und Züslern betheiligen sich mit beiläufig 30%, die Wickler und Federmotten mit weniger als 20%. Auf die Motten entfallen gar nur 6%, obgleich, oder vielleicht weil sie nicht weniger als 1286, also reichlich $\frac{1}{3}$ der sämtlichen Arten begreifen.

Man erkennt recht gut, dass jene Ordnungen, deren Arten vorzugsweise am Tage oder doch wenigstens in der Dämmerung fliegen, in den Beobachtungen stärker vertreten sind, als die übrigen; es ist deshalb die tägliche Flugzeit in dem folgenden Register auch angegeben, so weit sie aus Heinemann's Werk zu entnehmen war.

¹ Anhang zu den Jahrbüchern, V. Band. Wien 1856.

² Anhang zu den Jahrbüchern, VII. Band. Wien 1859.

³ Sitzungsberichte der k. Akademie d. Wissensch. XXXVII. Bd. Wien 1859.

⁴ Zoophänologische Beobachtungen, gemacht in den Jahren 1868—71 in Rosenau (Com. Gömör) und seiner Umgebung (Jahrbücher des Ungarischen Karpathen-Vereines).

⁵ II. Band 1863, III. Band 1870 erschienen.

Über die Motten dürften aber grösstentheils aus anderen Gründen so wenige Beobachtungen vorliegen, sie entziehen sich denselben, weil sie ihrer minutiösen Grösse wegen leicht übersehen werden, oder an verborgenen Orten aufhalten und noch zu wenig bekannt sind.

Die Einrichtung des folgenden Registers der Erscheinungszeiten ist dieselbe wie in der ersten Abtheilung. Von den Synonymen sind jedoch alle aus Heinemann's Werk aufgenommen, nicht wie in der ersten Abtheilung blos jene, deren sich Heydenreich in seinem Catalogus zur Bezeichnung der Arten bediente.

Auch wurden alle einjährigen Beobachtungen aufgenommen, bei den gemeinen wie bei den seltenen Arten, wenn auch die letzteren in der Regel zu spät zur Beobachtung gelangen und das Datum mehr der Mitte der Erscheinungsdauer entsprechen dürfte.

Bei einem nicht unbeträchtlichen Theile der beobachteten Arten sind die Erscheinungszeiten in Heinemann's Werk entweder gar nicht, oder mehr oder weniger unrichtig angegeben, abgesehen davon, dass sie nach Monaten, meine hingegen nach Tagen angegeben, also viel genauer bestimmt sind.

Meine Angaben für die späteren Phasen der Erscheinungszeiten: „Beginn einer neuen Generation und Verschwinden“, sind wohl nicht immer sicher, da ich meistens nur aus den Lücken in den Beobachtungen darauf schliessen konnte und nur solche Daten einzelner Jahrgänge in ein Mittel vereinte, welche unter sich nicht zu sehr verschieden waren. Namentlich gilt dies von den seltener beobachteten Arten. So liegen in Salzburg für *Macroglossa fuciformis* folgende Beobachtungen vor:

1868 Juli 16, 21; 1869 Juni 5, 21; 1871 Juli 28; 1874 April 21; 1878 Mai 23; Juni 11. Von diesen Daten nahm ich 1869 Juni 5; 1874 April 21; 1878 Mai 23 als für die erste Erscheinung gültig an, da aber die einzelnen Jahresdaten zu sehr divergiren, berechnete ich keinen Mittelwerth, sondern schrieb (3) $(21-4-5-6)$, d. h. in drei Jahren schwankte die beobachtete erste Erscheinungszeit zwischen April 21 und Juni 5.

Für die letzte Erscheinung wählte ich 1868 Juli 21 und 1871 Juli 28 und erhielt $Z = (2) 24-7$ $(21-7-28-7)$, d. h. nach zweijährigen Beobachtungen die mittlere Zeit des Verschwindens = Juli 24 mit den Grenzen Juli 21—28.

Da aber Heinemann für den Süden eine zweite Generation im August annimmt, hätte man ebenso gut setzen können $2A = 22-7$ $(16-7-28-7)$. Die übrigen Daten, weil zu wenig von der benützten entfernt, blieben unberücksichtigt.

Ich habe absichtlich einen Fall mit fragmentarischen Beobachtungen gewählt. Bei den zahlreicher beobachteten Arten stehen die Verhältnisse günstiger, besonders wenn sie nur eine Generation haben.

So wurde *Epialus Sylvinus* beobachtet: 1866 August 26, 28; 1868 August 22; 1875 August 23, 24, 26, 27; 1876 August 22; 1877 August 27, 28, 29; 1878 September 3. Hieraus wurde berechnet: Datum der ersten Erscheinung im Mittel (6) $26-8$ $(22-8-3-9)$.

Für die letzte Erscheinung wurde kein Mittelwerth gefolgert, da das mittlere Datum der letzten Erscheinung noch in den Spielraum der ersten gefallen wäre, wenn man auch zugeben wollte, dass die Flugzeit nur einige Tage dauert.

Einige Arten erscheinen zuerst im Herbst und überwintern, haben also nur eine Generation und dennoch zwei Flugzeiten. In solchen Fällen sollten dieselben Bezeichnungen wie bei zwei Generationen gewählt werden, wenn nur die Flugzeit und nicht zugleich die Entwicklung des Thieres beobachtet wird, wie es in der Regel der Fall war.

Die Werthe von $2A$ und Z können mit vollständiger Sicherheit nur für jene Arten bestimmt werden, von denen man die Entwicklung beobachten kann. Aus blossen Flug-Erscheinungen kann man keine so sicheren Schlüsse ziehen. Letztere Methode hat aber vor der ersteren den Vorzug, dass man die Beobachtungen gleichzeitig über die ganze Fauna ausdehnen kann, während sie im Gegenfalle auf wenige Arten beschränkt bleiben muss.

In der Regel habe ich mit $2A$ oder Z spätere Erscheinungsdaten bezeichnet, welche zu weit von jenen der ersten Erscheinung abstanden, als dass man sie in den Mittelwerth derselben hätte einbeziehen können,

wenn die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Generation nicht aus anderen Gründen ausgeschlossen blieb und das Datum sich nicht mit den übrigen zu einen Mittelwerth für die letzte Erscheinung vereinen liess.

A. Register der Erscheinungszeiten.

B. Sphinges.

II. SESIARIA.

30. *Trochilia* (*Trochilium*) Scp.

1. *Apiformis* L. Juni, Juli. (*Crabroniformis*, *Tenebrioniformis*.)

Agram (3) 29—5 (27—5 — 3—6).

Brünn (4) 1—6 (25—5 — 9—6).

Freistadt (3) 4—7 (27—6 — 12—7).

Iglau (5) 1—7 (14—6 — 6—7).

Innsbruck (1) 24—6.

Kaschau (1) 4—6.

Lemberg (1) 27—6.

Neutitschein (1) 1—7.

Rosenau (5) 22—6 (16—6 — 1—7).

Troppau (3) 15—6 (2—6 — 28—6).

3. *Laphriiformis* Tr.

Salzburg (1) 23—7.

31. *Sesia* Lsp.

Der Flug ist am Tage sehr behend, am Abend sitzen sie ruhig. Sie fliegen in den Sommermonaten.

4. *Tabaniformis* Rtb. Juni bis September. (*Asiliformis*, *Rhingiaeformis*, *Serratiformis*.)

Rosenau (1) 7—6.

Rottalowitz (1) 3—6.

5. *Scoliiformis* Bk. (? *Emphytiformis*.)

Salzburg (1) 23—7.

6. *Speciformis* F. Mai, Juni.

Brünn (4) 21—5 (19—5 — 23—5).

Rosenau (1) 2—6.

9. *Tipuliformis* L. Juni.

Brünn (4) 21—5 (10—5 — 5—6).

Innsbruck (2) 2—6 (2—6 — 3—6),

Z = (1) 27—6.

Kessen (1) 1—6.

Pressburg (1) 12—4!

Salzburg (5) 1—7 (15—6 — 19—7).

Kommt somit auch schon im Mai und auch noch im Juli vor.

11. *Asiliformis* Rtb. Juni, Juli. (*Cynipiformis*, *Oestriiformis*, ? *Melliniformis*.)

Brünn (4) 31—5 (16—5 — 23—6).¹

Wien (1) 4—10.

Die Erscheinung in Wien im October scheint eine zweite Generation anzudeuten, wenigstens in warmen Jahren (1859).

12. *Myopiformis* Bk. Mai bis Juni. (*Mutillaeformis*, *Culiciformis*.)

Innsbruck (1) 6—6.

Neutitschein (1) 27—5.

Trotzberg (1) 7—8.²

14. *Culiciformis* L. Juni und Juli. (! *Thymiformis*.)

Cilli (1) 29—5.

Innsbruck (1) 5—6.

Rosenau (1) 17—5.

Salzburg (1) 8—6.³

16. *Formiciformis* Esp. (*Nomadaeformis*.)

Salzburg (1) 6—6.

17. *Ichneumoniformis* F. Juli, August. (*Vespiformis*, *Systrophaeformis*, *Megillaeformis*.)

St. Jakob (2) 11—6 (10—6 — 13—6).

Trotzberg (1) 7—8.

Kommt auch schon im Juni vor.

21. *Empiformis* Esp. Im Juni bis August. (*Tenthrediniformis*.)

Brünn (1) 16—6.

Neutitschein (1) 4—7.

Rosenau (1) 30—6.

23. *Braconiformis* H. S.

Brünn (1) 16—5.

32. *Bembecia* Hb.

Sie fliegen des Nachts.

31. *Hylaeiformis* Lsp. Juni bis August. (*Apiformis*.)

Brünn (1) 8—7.

Salzburg (1) 7—8.

¹ (3) 26—5 (16—5 — 26—5).

² Auf den Alpen.

³ Am Gaisberg.

III. THYRIDINA.

Flug bei Tage im Sonnenschein.

33. *Thyris* Ill.32. *Fenestrella* Scop. Juni, Juli. (*Fenestrina*, *Pyralidiformis*.)

Hausdorf (3) 19—5 (13—5 — 25—5).

Linz (1) 13—5.

Salzburg (1) 10—5.

Trotzberg $Z = (1) 16-7$.

Wien (1) 23—5.

Fliegt schon im Mai.

IV. SPHINGINA.

34. *Macroglossa* O.

Flug am Tage im Sonnenschein, bisweilen auch in der Dämmerung.

33. *Fuciformis* L. Mai, Juni; im Süden wieder im August. (*Bombyliiformis*.)

Bregenz (3) 1—5 (23—4 — 7—5)

Brünn (3) 11—5 (9—5 — 19—5).

Gresten (2) (10—5 — 6—6).

Iglau (3) 31—5 (21—5 — 5—6).

Kaschau (1) 20—5.

Linz (4) 14—5 (30—4 — 22—5).

Prag (1) 4—5.

Rosenau (3) 9—5 (3—5 — 17—5).

Salzburg (3) (21—4 — 5—6),

 $Z = 4-7 (21-7 - 28-7)$.¹Wien $2A = (1) 25-7$.34. *Bombyliiformis* O. Mai, Juni. (*Fuciformis*, *Milesiformis*.)

Brünn (4) 12—5 (5—5 — 20—5).

Cilli (1) 7—4.

Freistadt (1) 15—5.

Innsbruck (2) (7—5 — 1—6).

Lemberg (1) 24—5.

Salzburg (6) 4—6 (23—5 — 9—6).

Wien (2) 30—4 (24—4 — 7—5).

Fliegt manchmal schon im April.

36 *Stellatarum* L. Mai bis October.

Admont (6) 20—6 (15—6 — 27—6).

Agram (3) 2—6 (28—5 — 7—6),

 $Z = (2) 10-11 (5-11 - 15-11)$.

Altenburg (Ung.-) (1) 14—4.

¹ In 2000' Seehöhe.

Biala (8) 6—6 (24—5 — 15—6),

 $2A = (1) 20-7$, $Z = (7) 11-10 (25-9 - 30-10)$.

Bludenz (1) 15—6,

 $Z = (1) 26-10$.

Bozen (1) 2—4,

 $2A = (1) 21-6$.Bregenz $Z = (2) 6-10 (6-10 - 6-10)$.

Brünn (11) 2—6 (10—5 — 27—6),

 $2A = (5) 18-7 (15-7 - 27-7)$, $Z = 7-11 (27-10 - 12-11)$.

Budweis (1) 12—6.

Bugganz (2) 8—6 (8—6 — 8—6).

Cilli (1) 18—5.

St. Florian (1) 13—6.

Freistadt (1) 27—6,

 $2A = (1) 3-8$.

Gresten (2) 6—6 (2—6 — 10—6),

 $Z = (1) 23-10$.

Hausdorf (8) 15—6 (8—6 — 19—6).

St. Jakob (2) 11—6 (5—6 — 17—6).

Iglau (5) 1—6 (20—5 — 8—6).

Igló (1) 9—6.

 $Z = (1) 17-9$.

Innsbruck (1) 29—3,

 $2A = 19-6 (10-6 - 29-6)$, $Z = (1) 7-11$.

Kaschau (1) 25—5,

 $2A = (1) 11-7$.

Kessen (2) (25—5 — 29—6).

Kirchdorf (7) (9—6 — 11—8),¹ $Z = (3) 19-10 (2-10 - 1-11)$.

Kremsier (5) 20—6,

 $2A = (1) 25-7$.

Kremsmünster (1) 6—6.

Lemberg $Z = (1) 8-10$.

Lesina (3) (30—1 — 10—3).

Linz (3) 23—4 (18—4 — 25—4),

 $2A = (2) 26-6 (19-6 - 4-7)$.

Neusohl (1) 26—6.

Neutitschein (3) 21—6.

 $Z = (2) 14-10 (11-10 - 17-10)$.

Oberhaag (1) 28—4.

Oberschützen (1) 26—5.

Prag (1) 12—5,

 $Z = (3) 18-9 (28-9 - 8-10)$.¹ Beide Flugzeiten vereint.

- Pressburg (2) 22—4 (17—4 — 27—4).
 Rosenau (4) 27—5 (11—5 — 11—6),
 $2A = (2) 8—7 (6—7 — 10—7)$,
 $Z = (2) 29—10 (24—10 — 4—11)$.
 Rottalowitz (16) (6—6 — 3—10).¹
 Salzburg (10) 12—6 (23—5 — 17—7).²
 $Z = (5) 19—10 (5—10 — 2—11)$.
 Schässburg (2) 3—6 (2—6 — 5—6).
 Senftenberg (1) 25—5,
 $Z = (1) 3—10$.
 Taufers (1) 16—6.
 Troppau (1) 22—6,
 $Z = (1) 26—10$.
 Wien (11) 8—6 (18—5 — 29—6),
 $Z = (8) 13—10 (6—10 — 26—10)$.
 Wilten (2) 17—4 (15—4 — 30—4),
 $2A = (2) 28—6 (26—6 — 1—7)$.

Dieser Schwärmer scheint zuweilen zu überwintern. Am 28—12 (1873) fand man ihn in einer Wohnung Salzburgs am Fenster an der Wand sitzend. In Lesina ist er noch im Jänner (1867) schwärmend, hier und an anderen Orten in allen Frühlingsmonaten beobachtet worden.

Ich habe mich daher entschieden, zwei Flugzeiten anzunehmen,³ obgleich mir die Trennung derselben wenig sicher scheint. Die Eingangs angegebene wäre demnach die zweite. Das Verschwinden im Herbst kann sich bis in den November hinein verzögern.

37. *Oenotherae* Esp.

Linz (2) 4—5 (1—5 — 8—5).

35. *Sphinx* L.

Flug in der Dämmerung.

38. *Neri* L. Juni, Juli und October.

Bozen (1) 18—6.

Kessen (1) 24—7.

*38. *Elpenor* L. Mai, Juni.

Agram (1) 3—6.

Biala (8) 6—5 (1—5 — 20—5),

$Z = (4) 7—7 (1—7 — 10—7)$.

Bozen (3) 11—6 (4—6 — 23—6).

Bregenz (2) (11—5 — 25—6).

Brünn (7) 9—6 (16—5 — 27—6).

Budweis (1) 10—6.

Iglau (2) 4—6 (26—5 — 13—6).

¹ Absolute Extreme der Flugzeit, da die Phasen nicht bestimmbar sind.

² In dem kalten Jahre 1871 erst 17—7.

³ S. Tabelle der jährlichen Frequenz.

Innsbruck (1) 17—6.

Kaschau (4) 1—6 (20—5 — 13—6).

Kessen (1) 13—6.

Linz (1) 24—5.

Melk (1) 23—5.

Pressburg (1) 18—4!

Rosenau (3) 10—6 (30—5 — 23—6).

Salzburg (3) 12—6 (9—6 — 15—6),

$2A = (4) 22—7 (13—7 — 3—8)$.

$Z = (2) 4—9 (26—8 — 12—9)$.

Senftenberg (1) 9—6.

Nach den Beobachtungen in Salzburg schwärmt der Falter auch in den Monaten Juli, August und September, und sind zwei Flugzeiten ziemlich wahrscheinlich, wenn es auch auffällt, dass die Beobachtungen an anderen Stationen keine Andeutung hierüber enthalten.

39. *Porcellus* L. Mai, Juni.

Bregenz (1) 26—6.

Brünn (7) 3—6 (14—5 — 16—6).

Freistadt (1) 27—5.

Iglau (5) 13—6 (3—6 — 25—6).

Innsbruck (1) 17—6.

Kaschau (1) 5—6.

Neutitschein (2) 4—6 (30—5 — 9—6).

Rosenau (3) 14—5 (12—5 — 16—5).

Salzburg (2) 5—6 (31—5 — 10—6),

$2A = (2) 23—7 (17—7 — 29—7)$,

$Z = (4) 27—8 (10—8 — 12—9)$.

Troppau $2A = (1) 15—7$.

Von diesem Schwärmer gilt dasselbe, wie von dem vorigen. Die zweite Flugzeit wird noch durch die Beobachtungen in Troppau bestätigt, wenngleich hier die erste fehlt.

41. *Lineata* L. Mai, August. (*Livornica*.)

Salzburg (1) 6—6,

$2A = (3) 24—7 (22—7 — 27—7)$.

42. *Galii* Rtb. Mai bis Juli, September.

Agram (2) 2—7 (27—6 — 7—7).

Biala (1) 12—6.

Brünn (2) 25—5 (25—5 — 25—6).

Budweis (1) 22—5.

Kaschau (2) 6—6 (4—6 — 9—6).

Kremsier (1) 15—5.

Linz (2) 18—7 (17—7 — 19—7).

Salzburg (1) 17—6,

$2A = (1) 6—8$,

$Z = (2) 31—8 (27—8 — 4—9)$.

Troppau (1) 15—7.

Wien $Z = (1) 1-10$.

43. *Euphorbiae* L. Juni bis September.

Agram (3) 1—7 (27—6 — 7—7).

Baumgartenberg $2A = (1) 16-8$.

Biala (10) 19—5 (10—5 — 28—5),

$2A = (1) 20-8$.¹

Bregenz (3) 13—6 (31—5 — 29—6),

$2A = (1) 6-8$.

Brünn (10) 22—5 (10—5 — 10—6),

$Z = (2) (20-9 — 15-10)$.

Iglau (1) 8—6.

Igló (1) 17—5.

Innsbruck (1) 5—6,

$Z = (1) 14-9$.

Kaschau (3) 1—6 (20—5 — 9—6).

Kremsier (3) (22—5 — 23—7).

Kremsmünster (2) 2—7 (30—6 — 5—7).

Leutschau (2) 2—6.

Linz (4) 12—6 (3—6 — 28—6).

Neusohl (2) (20—3! — 20—5).

Neutitschein (3) 4—6 (29—5 — 9—6),

$2A = 5-9 (29-8 — 13-9)$.

Rosenau (1) 13—5,

$2A = (2) 25-7 (18-7 — 1-8)$,

$Z = (1) 7-10$.

Rottalowitz (1) 31—5,

$2A = 5-8 (20-7 — 11-8)$,

Salzburg (1) 3—6,²

$2A = 2-8 (28-7 — 8-8)$,

$Z = (1) 14-9$.

Senftenberg (2) 29—5 (21—5 — 7—6),

$2A = 13-8 (1-8 — 26-8)$.

Taufers (1) 15—6.

Troppau (1) 20—5.

Wien (1) 25—5.

Fliegt auch im Mai und hat wahrscheinlich zwei Flugzeiten; die zweite beginnt im August.

46. *Ligustri* L. Mai, Juni.

Agram (3) 27—6 (22—6 — 3—7).

Brünn (7) 2—6 (20—5 — 9—6).

Freistadt (2) (19—5 — 17—6).

Innsbruck (2) (16—5 — 12—6).

Kaschau (2) 1—6 (28—5 — 5—6).

¹ (4) 12—7 (10—7 — 15—7).

² Gezogen.

Kremsier (1) 24—6.

Linz (1) 9—6.

Neusohl (1) 27—6.

Neutitschein (1) 9—6,

$Z = (1) 20-7$.

Salzburg (1) 7—6,

$Z = (2) (17-7 — 5-8)$.

Taufers (2) (25—5 — 14—6).

36. *Acherontia* O.

Flug bei Nacht.

47. *Convolvuli* L. Mai, Juni, August bis October.

Admont $2A = (1) 30-7$.

Agram (3) 27—6 (22—6 — 3—7),

$Z = (1) 24-10$.

Biala (9) 5—6 (26—5 — 1—7),

$2A = (6) 27-8 (20-8 — 8-9)$,

$Z = (6) 4-10 (30-9 — 10-10)$.

Bozen (2) 19—6 (17—6 — 21—6).

Bregenz (1) 22—5,

$2A = (1) 6-8$.

Brünn (10) 1—6 (16—5 — 15—6),

$2A = (6) 12-9 (30-8 — 19-9)$,

$Z = (8) 29-10 (16-10 — 5-11)$.

St. Jakob $2A = (2) (24-7 — 14-8)$.

Iglau (1) 7—6.

Innsbruck (2) 1—6 (28—5 — 6—6).

Kaschau (3) 2—6 (24—5 — 13—6).

Kessen $2A = (1) 7-8$.

Kremsier (2) 6—6 (28—5 — 15—6).

Linz (4) 14—6 (4—6 — 19—6),

$Z = (1) 30-9$.

Neutitschein (2) 26—6 (24—6 — 29—6),

$Z = (1) 17-10$.

Rosenau (2) 28—5 (20—5 — 5—6),

$2A = (1) 17-8$,

$Z = (1) 18-9$.

Rottalowitz $2A = (10) 11-8 (21-7 — 28-8)$,

$Z = (1) 14-9$.

Salzburg $2A = (5) 25-7 (11-7 — 2-8)$.

$Z = (1) 25-9$.

Senftenberg (2) 24—5 (21—5 — 28—5),

$2A = (4) 5-8 (22-7 — 15-8)$,

Taufers $2A = (1) 31-7$.

Troppau (1) 23—6.

Wien (2) 2—7 (30—6 — 5—7).

Auch im Juli. Die beiden Flugzeiten nicht sicher trennbar.

48. *Pinastri* L. Mai, Juni, August.

Biala (9) 21—5 (4—5 — 10—6),

$Z = (1) 30—8.$

Bregenz (2) (22—5 — 15—6).

Brünn (6) 5—6 (25—5 — 12—6).

Budweis 2A = (1) 2—7.

Freistadt (1) 23—6,

2A = (1) 31—7.

Gresten 2A = (1) 6—7.

Iglau (3) 11—6 (10—6 — 12—6).¹

Innsbruck (3) 25—5 (16—5 — 6—6).

Kaschau (2) 11—6 (10—6 — 13—6).

Kremsier 2A = (1) 18—7.

Linz (2) 25—5 (19—5 — 31—5).

Salzburg (4) 12—6 (30—5 — 29—6),

2A = (3) 27—7 (15—7 — 3—8),

$Z = (2) 9—8 (6—8 — 12—8).$

Senftenberg (3) 21—5 — 25—6).

Taufers (1) 8—6.

Wie der vorige.

49. *Atropos* L. Juni, August, September.

Admont (6) 15—9 (6—9 — 26—9).

Agram (2) 28—8 (22—8 — 3—9),

$Z = (1) 24—10.$

Bania (1) 27—9.

Biala (9) 9—9 (18—8 — 20—9),

$Z = (8) 17—10 (30—9 — 30—10).$

Bludenz (1) 4—10.

Bregenz (1) 9—8,

$Z = (1) 2—11.$

Brünn (10) 11—9 (5—9 — 22—9),

$Z = (1) 22—10.$

Cilli (2) (15—8 — 12—9),

$Z = (1) 12—11.$

Innsbruck $Z = (1) 20—10.$

Kalksburg (1) 1—9.

Kessen (1) 22—9.

Korneuburg $Z = (1) 23—10.$

Kremsier (2) 9—9 (3—9 — 16—9).

Kremsmünster (1) 17—9.

Linz (5) 30—9 (15—9 — 8—10).

Neutitschein (3) 25—9 (18—9 — 29—9).

Oberhaag (1) 16—3!.

¹ Einmal schon 7—5.

Pressburg (1) 11—9.

Rosenau (3) 14—9 (8—9 — 21—9).

Rottalowitz (1) 12—9.

Salzburg (2) (13—9¹ — 15—10).

Schässburg (1) 18—8 (8—8 — 20—8).

Weissbriach (1) 17—4!.

Wien (2) 23—9 (16—9 — 30—9).

Wilten (4) 14—9 (24—8 — 7—10).

Nach den Beobachtungen in Oberhaag und Weissbriach scheint der Schwärmer zu überwintern. Im Juni ist er an keiner Station beobachtet worden.

37. *Smerinthus* Latr.

Flug bei Nacht.

50. *Populi* L. April bis Juli.

Agram (2) 27—6 (22—6 — 3—7).

Biala (8) 17—5 (7—5 — 4—6),

$Z = (4) 26—8 (20—8 — 30—8).$

Bregenz (1) 16—5.

Brünn (10) 11—5 (3—5 — 16—5).

Freistadt (3) 16—5 (10—5 — 16—5).²

Iglau (5) 30—5 (10—5 — 11—6).

Innsbruck (4) 4—6 (19—5 — 23—6).

Kaschau (3) (1—5 — 16—6).

Kesmark (2) 10—6 (10—6 — 10—6).

Kessen (1) 30—5.

Kremsier (6) 12—5 (28—4 — 26—5).

Leutschau (2) 16—5 (16—5 — 17—5).

Linz $Z = (1) 26—10!.$

Melk (1) 11—5.

Mistek (1) 28—5.

Neusohl (4) 27—5 (8—5 — 16—6).

Neutitschein (3) 19—5 (8—5 — 28—5),

$Z = (1) 16—7.$

Rosenau (4) 4—6 (14—5 — 16—6),

$Z = (1) 18—7.$

Salzburg (3) 10—7! (4—7 — 29—7).

Taufers (1) 2—6.

Troppau (2) (17—5 — 6—6).

Wien (1) 25—5.

Der April ist noch nicht in der regelmässigen Flugzeit einbegriffen. Aus den Beobachtungen in Salzburg scheint sich eine zweite Flugzeit zu ergeben,³ welche nach den Beobachtungen in Linz sich bis über den October zu erstrecken scheint.

¹ Gezogen 13—9.

² (3) 24—6 (16—6 — 2—7).

³ 1868 wurde noch am 27—7 ein ♀ ausschüpfend im Freien getroffen.

52. *Tiliae* L. Mai, Juni.

- Agram (3) 27—6 (22—6 — 3—7).
 Biala (8) 29—5 (12—5 — 5—6),
 $Z = (5) 14—7 (10—7 — 20—7)$.
 Bregenz (3) 20—5 (19—5 — 20—5).
 Brünn (7) 20—5 (10—5 — 30—5).
 Budweis (2) (4—5 — 21—6).
 Freistadt (3) (7—6 — 2—7).
 Iglau (3) 11—6 (3—6 — 17—6).
 Innsbruck (3) 29—5 (16—5 — 6—6).
 Kessen (3) 13—6 (6—6 — 21—6).
 Kirchdorf (1) 1—6.
 Kremsier (2) 25—5 (22—5 — 28—5).
 Kremsmünster (1) 20—6.
 Lemberg (1) 27—6.
 Leutschau (2) 23—5 (21—5 — 25—5).
 Linz (4) 7—6 (1—6 — 16—6).
 Melk (2) 24—5 (20—5 — 28—5).
 Mistek (1) 4—7.
 Neusohl (1) 20—3!
 Neutitschein (2) 17—5 (11—5 — 24—5).
 Nikolsburg (1) 5—6.
 Pressburg (1) 24—4.
 Raab (1) 16—6.
 Rosenau (4) 15—5 (9—5 — 25—5).
 Rottalowitz (1) 4—6.
 Senftenberg (2) (14—5 — 4—6).
 Taufers (1) 31—5.
 Troppau (4) 27—5 (4—5 — 14—6).
 Wien (3) 21—5 (18—5 — 25—5).

Scheint in sehr seltenen Fällen schon im April, wenn nicht im März vorzukommen (Neusohl, Pressburg), weniger selten auch noch im Juli.

53. *Ocellatus* L. Mai bis August. (*Salicis*.)

- Agram (3) 1—7 (27—6 — 3—7).
 Biala (8) 18—5 (7—5 — 26—5),
 $Z = (3) 25—9 (20—9 — 30—9)$.¹
 Bozen (1) 30—4.
 Bregenz (1) 12—5.
 Brünn (10) 15—5 (5—5 — 30—5).
 Budweis (1) 31—5.
 Cilli (2) 3—5 (2—5 — 5—5).
 Freistadt (1) 2—6.
 Iglau (3) 9—6 (4—6 — 15—6).

¹ (2) 17—7 (15—7 — 20—7).

- Innsbruck (2) 22—5 (21—5 — 24—5).

$$Z = (1) 30—9.$$

- Kaschau (1) 28—6.
 Kirchdorf (1) 25—5.
 Kremsier (5) 15—5 (11—5 — 24—5).
 Linz (2) (11—5 — 7—6).
 Melk (1) 1—5.
 Neusohl (1) 25—5.
 Neutitschein (3) 23—5 (13—5 — 31—5),
 $Z = (1) 12—7$.
 Rosenau (5) 23—5 (13—5 — 8—6).
 Senftenberg (1) 30—5.
 Taufers (2) 4—6 (28—5 — 12—6).
 Troppau (1) 17—6.
 Wien (2) 26—5 (25—5 — 28—5).

Die Schwärmzeit scheint sich bis über den September zu erstrecken.

V. ZYGAENOIDEA.

39. *Ino* Leach.55. *Pruni* V. Juni bis September.

- Biala (9) 11—6 (22—5 — 28—6).
 Brünn (3) 16—6 (7—6 — 22—6).
 Iglau (1) 17—6.
 Wien (3) 27—6 (23—6 — 1—7).

57. *Globulariae* Esp. Juli.

- Bregenz (1) 9—6.
 Brünn (1) 14—5.
 Hausdorf (1) 14—6.
 St. Jakob (3) 16—6 (31—5 — 25—6),
 $Z = (1) 17—7$.

- Innsbruck (1) 12—6.
 Kaschau (1) 6—7.
 Kirchdorf (3) 11—6 (31—5 — 18—6).
 Linz (1) 29—5.
 Neutitschein (3) 3—6 (26—5 — 9—6).
 Salzburg (2) 21—6 (20—6 — 22—6).
 Wien (7) 20—6 (25—5 — 4—7).

Erscheint ganz entschieden schon im Juni und zuweilen selbst im Mai.

59. *Statice* L. Juni bis August. (? *Chrysocephala*.)

- Brünn (4) 11—6 (1—6 — 18—6).
 Budweis (1) 13—5.
 Freistadt (4) 7—6 (19—5 — 21—6).

¹ (1) 10—7.

Gresten (3) 5—6 (4—6 — 6—6).¹
 Hausdorf (10) 23—6 (10—6 — 1—7).
 St. Jakob (2) (12—6 — 10—7).
 Innsbruck (1) 15—6.
 Kaschau (2) 18—7 (18—7 — 19—7).
 Kessen (2) 4—6 (2—6 — 4—6).
 Linz (1) 29—5.
 Prag $Z = (1) 25—8$.
 Rosenau (3) 12—6 (11—6 — 14—6).²
 Rottalowitz (8) 28—6 (11—6 — 18—7).
 Salzburg (10) 9—6 (28—5 — 7—7).

Wie der Vorige.

40. *Zygaena* F.

Fliegen von Mitte Juni bis August.

60. *Minos* F. Juni und Juli.

Brünn (10) 18—6 (1—6 — 12—7).
 Bugganz (1) 5—7.
 Freistadt (2) 12—7 (3—7 — 21—7).
 Gresten (4) 4—7 (24—6 — 14—7).
 Hausdorf (8) 30—6 (30—5 — 25—7).
 St. Jakob (3) 6—7 (20—6 — 21—7).
 Kaschau (1) 25—6.
 Linz (2) (1—7 — 24—7).
 Neutitschein (3) 7—7 (4—7 — 12—7).
 Prag (7) 10—7 (1—7 — 21—7),
 $Z = (2) 16—8 (12—8 — 21—8)$.
 Rosenau (5) 30—6 (22—6 — 22—7).
 Rottalowitz (9) 4—7 (15—6 — 16—7),
 $Z = (3) 2—8 (21—7 — 21—8)$.
 Salzburg (8) 28—6 (15—6 — 20—7).
 Senftenberg (3) 13—7 (1—7 — 21—7).
 Taufers (2) 12—6 (5—6 — 20—6).
 Wien (4) (31—5 — 21—7).

64. *Scabiosae* Esp. Juni, Juli.

Brünn (2) 26—6 (20—6 — 2—7).
 Freistadt (1) 26—6.
 St. Jakob (1) 16—6.

66. *Achilleae* Esp. Juni, Juli. (*Bellis*, *Viciae*, *Triptolemus*.)

Brünn (3) 27—5 (20—5 — 5—6).
 Freistadt (1) 15—7.
 Innsbruck (2) (1—6 — 25—7).
 Prag (2) (2—8 — 20—8).

¹ (1) 1—7.

² (1) 13—7.

Salzburg (2) (8—6 — 28—7).

Wien (2) (4—7 — 27—7),
 $Z = (2) (24—8 — 28—9)$.

Auch im August und selbst September.

68. *Lonicerae* Esp. Juni, Juli.

Brünn (9) 9—6 (25—5 — 18—6).
 Hochwald (1) 3—7.
 Innsbruck (2) (1—6 — 30—7).
 Kessen (1) 2—6.
 Prag (3) (1—7 — 19—8),
 $Z = (1) 1—9$.
 Rosenau (3) 10—7 (1—7 — 15—7).
 Rottalowitz $Z = (1) 5—9$.
 Salzburg (5) 13—7 (26—6 — 20—7),
 $Z = (3) 25—8 (20—8 — 1—9)$.
 Wien (3) 5—7 (24—6 — 13—7),
 $Z = (1) 15—9$.

Kommt noch im August vor.

71. *Meliloti* Esp. Juli. (*Loti*, *Stentzii*.)

Gresten (3) 18—6 (12—6 — 22—6).
 Salzburg (1) 12—7.

72. *Angelicae* O. (*Loti*.)

Brünn (1) 5—6.
 Rosenau (1) 9—7.
 Wien (1) 27—6,
 $Z = (1) 27—7$.

74. *Hippocrepidis* Hb.

Hausdorf (3) 5—7 (2—7 — 9—7).¹

76. *Filipendulae* L. Juni bis August. (*Chrysanthemi*.)

Agram (3) 8—6 (27—5 — 22—6).
 Bärn (10) 28—6 (12—6 — 16—7).
 Bludenz (1) 26—6.
 Bregenz (1) 3—7.
 Brünn (10) 9—6 (25—5 — 17—6).
 Bugganz (1) 28—6.
 Cilli (1) 4—6.
 Gresten (3) 25—6 (12—6 — 2—7).
 Hausdorf (2) (15—6 — 10—7).
 St. Jakob (1) 25—6,
 $Z = (1) 9—9$.
 Innsbruck (1) 7—7.
 Kaschau (4) 11—7 (24—6 — 25—7).

¹ (1) 2—6.

Kessen (2) 10—6 (8—6 — 13—6).
 Kirchdorf (13) 9—6 (28—5 — 28—6).
 Kremsmünster (1) 8—6.
 Leutschau (3) 13—7 (4—7 — 26—7).
 Linz (5) (29—5 — 28—7).
 Mistek (1) 2—6.
 Neutitschein (3) 19—6 (10—6 — 24—6).
 Prag (6) (30—6 — 1—9).
 Rosenau (1) 18—7.
 Rottalowitz (16) 29—6 (8—6 — 22—7),
 $Z = (5) 8—8 (26—7 — 31—8)$.
 Salzburg (10) 10—7 (8—6 — 9—8),
 $Z = (11) 24—8 (2—8 — 7—9)$.
 Senftenberg (1) 16—7.
 Taufers (1) 23—6.
 Wien (8) 26—6 (5—6 — 17—7),
 $Z = (3) 7—8 (4—8 — 13—8)$.

78. *Ephialtes* L. (*Peucedani*, *Acacus*, *Coronillae*, *Falcatae*, *Hippocrepidis*.)

Baumgartenberg (1) 23—7.
 Bregenz (1) 12—7.
 Brünn (1) 9—7.
 Linz (1) 24—7.
 Neutitschein (3) 22—7 (18—7 — 29—7).
 Prag (6) 29—7 (10—7 — 10—8).
 Rottalowitz (12) 22—7 (1—7 — 19—8).
 Salzburg (6) 24—7 (15—7 — 2—8).
 Wien (3) 18—7 (17—7 — 21—7).

79. *Onobrychis* V.

Agram (2) 1—6 (27—5 — 7—6).
 Brünn (7) 9—7 (20—6 — 22—7).
 Gresten (1) 20—7.
 Linz (3) 27—7 (23—7 — 4—8).
 Prag (5) 1—8 (7—7 — 19—8),
 $Z = (2) 26—8 (20—8 — 1—9)$.
 Wien (7) 7—7 (5—6 — 14—8).

C. Bombyces.

VI. COSSINA.

Flug bei Nacht.

41. *Cossus* F.

Die Schmetterlinge im Juni und Juli.

1. *Ligniperda* F.

Agram (3) 6—6 (28—5 — 17—6).
 Biala (8) 4—6 (25—5 — 14—6),
 $Z = (5) 18—7 (15—7 — 25—7)$.

Bozen (1) 29—6.
 Bregenz $Z = 22—7$.
 Brünn (8) 8—6 (25—5 — 14—6).
 Budweis (1) 17—6.
 Freistadt (2) 15—6 (10—6 — 20—6),
 $Z = (1) 1—8$.
 Gresten (2) 6—7 (4—7 — 8—7).
 Iglau (5) 27—6 (14—6 — 14—7).
 Innsbruck (1) 10—6.
 Kaschau (2) 3—7 (24—6 — 12—7).
 Kirchdorf (1) 7—7.
 Kremsier (6) 11—6 (5—6 — 18—6).
 Linz (1) 17—5.
 Neutitschein (1) 19—6.
 Prag (1) 21—6.
 Raab (1) 13—6.
 Rosenau (2) 17—6 (13—6 — 21—6).
 $Z = (2) 23—7 (12—7 — 4—8)$.
 Salzburg (6) 28—6 (30—5 — 30—7).
 $Z = (1) 1—9$.
 Troppau (2) 7—7 (3—7 — 11—7).
 Wien (1) 5—7.

42. *Zeuzera* Latr.

Flugzeit: Juli, August.

4. *Aesculi* L.

Brünn (2) 17—6 (13—6 — 21—6).
 Kaschau (1) 12—7.
 Melk (1) 20—6.

Auch schon im Juni.

44. *Limacodes* Latr.

Flug bei Nacht.

7. *Testudo* F. Mai, Juni. (*Testudinana*.)

Brünn (2) 10—6 (9—6 — 12—6).
 Rosenau $Z = (1) 10—7$.

Für das Vorkommen im Mai sind weitere Beobachtungen erwünscht.

VII. EPIALOIDEA.

Flug in der Dämmerung.

45. *Epialus* F.

9. *Humuli* L. Juni, Juli.

Admont (4) 22—6 (16—6 — 28—6).
 Brünn (1) 14—6.
 Freistadt (2) (12—6 — 10—7).
 Leutschau (1) 26—5.

Linz (3) 6—6 (2—6 — 10—6).

Neutitschein (1) 28—6.

10. *Ganna* Hb. Alpen. Juli, August.

Trotzberg (1) 11—8.

12. *Sylvinus* L. August, September. (*Lupulina*,
Hamma, *Flina*,

Salzburg (6) 26—8 (22—8 — 3—9).

Wien (2) 20—8 (20—8 — 21—8),

$Z = (1) 4—9$.

15. *Hecta* L. Juni, Juli.

Salzburg (1) 7—6.

VIII. PSYCHINA.

Die Arten fliegen bei Tage und in der Dämmerung.

46. *Psyche*¹ Schr.

Sie erscheinen vom April bis Juni.

17. *Stettinensis* Hr. Juni. (*Fasciculella*.)

? Rosenau (1) 28—4.

22. *Unicolor* Hfn. Juni, Juli. (*Graminella*.)

Brünn (6) 10—6 (6—6 — 17—6).

Freistadt (2) (16—5 — 28—6).

Hausdorf (3) 23—6 (20—6 — 26—6).

Innsbruck (1) 5—3!.

23. *Opacella* H. S.

Hausdorf (3) 23—4 (14—4 — 4—5).

24. *Plumifera* O. April, Mai.

Innsbruck (1) 7—5.

25. *Muscella* V. April, Mai.

Innsbruck (5) 7—3 (12—2 — 22—3).

Kessen (1) 15—5.

Wien (1) 1—5.

Auch schon im März und selbst Februar.

28. *Hirsutella* O.

Freistadt (1) 31—5.

47. *Epichnopteryx* Hb.

33. *Pulla* Esp. Im Juni. (*Plumella*.)

Brünn (6) 10—5 (7—5 — 12—5).

Cilli (1) 15—4.

Gresten (4) 25—4 (19—4 — 3—5).

¹ Leben nur kurze Zeit und sterben bald nach der Begattung, weshalb sie meist schwer aufzufinden sind.

² (1) 23—4.

Kessen (1) 18—5.

Neutitschein (3) 19—5 (24—5 — 24—5).

Rosenau (3) 5—5 (28—4 — 16—5).

Salzburg (2) 28—3 (23—3 — 2—4),

$Z = (3) 21—5 (15—5 — 3—6)$.

Wien (1) 23—4.

Fliegt schon im April und Mai und nicht erst im Juni.

IX. DREPANULINA.

Flug bei Nacht.

50. *Platypteryx* Lsp.

41. *Cultraria* Vill. (*Unguicula*.)

Rosenau (2) 9—5 (29—4 — 18—5).

42. *Hamula* V. (*Uncula*.)

Brünn (1) 17—5.

43. *Sicula* V.

Brünn (1) 26—5.

44. *Falcataria* L.

Innsbruck (2) 4—5 (2—5 — 6—5).

Linz $Z = (1) 15—7$.¹

Rosenau (4) 22—5 (29—4 — 11—6).

$Z = (2) 21—7 (17—7 — 25—7)$.¹

Salzburg (1) 25—5.

Wien (1) 24—5.

46. *Lacertinaria* L. (*Lacertula*.)

Linz (1) 21—4.

Neutitschein $Z = (1) 28—7$.¹

Rosenau (1) 18—5.

X. SATURNINA.

Die Schmetterlinge im April und Mai.

51. *Saturnia* Sch.

Flug bei Nacht.

47. *Pyri* V. (*Pavonia major*.)

Agram (2) 25—5 (17—5 — 3—6).

Bozen (2) 25—4 (18—4 — 2—5).

Brünn (10) 18—4 (7—4 — 11—5).

Bugganz (1) 8—5.

Kaschau (2) 8—5 (7—5 — 9—5).

Korneuburg (1) 9—5.

Kremsier (6) 7—5 (27—4 — 21—5).

Linz (1) 3—5.

Mediasch (1) 20—5.

¹ 2A? Bei *Platypteryx* könnten zwei Generationen vorkommen.

Melk (1) 14—5.
 Nikolsburg (1) 18—5.
 Oberhaag (3) 24—4 (17—4 — 3—5).
 Pressburg (1) 12—4.
 Rosenau (6) 3—5 (25—4 — 9—5).
 Rottalowitz (8) 24—5 (30—4 — 1—6),
 $Z = (1) 27-7$.
 Troppau (1) 16—5.
 Wien (2) (4—4 — 28—5).

Einmal noch im Juli beobachtet, würde hiernach auch im Juni vorkommen.

48. *Spini* V.

Brünn (10) 10—4 (25—3 — 28—4).
 Cilli (1) 23—3.
 St. Jakob (1) 27—4.
 Kaschau (2) 27—4 (23—4 — 2—5).
 Nikolsburg (1) 27—4.
 Pressburg (1) 18—4.
 Rosenau (4) 24—4 (15—4 — 4—5).
 Wien (2) 23—4 (20—4 — 27—4).

49. *Carpini* V. (*Pavonia minor*.)

Agram (2) 22—5 (17—5 — 27—5).
 Bregenz (1) 21—4.
 Brünn (6) 5—4 (21—3 — 16—4).
 Budweis (1) 28—4.
 Cilli (2) 10—4 (2—4 — 19—4).
 Freistadt (1) 20—4.
 Innsbruck (4) (8—2 — 15—4).
 Kaschau (2) 21—4 (11—4 — 2—5).
 Kremsier (6) 15—4 (17—3 — 27—4).
 Melk (1) 4—5.
 Neusohl (2) 8—4 (1—4 — 16—4).
 Oberschützen (1) 1—5.
 Rosenau (4) 23—4 (11—4 — 3—5).
 Salzburg (1) 15—4.¹
 Senftenberg (3) 29—4 (19—4 — 9—5).
 Taufers (1) 27—3.
 Wien (2) 23—4 (20—4 — 27—4).

Kommt auch schon im Februar und März, wenn auch sehr selten, vor.

52. *Agria* O.

Flug bei Tage.

51. *Tau* L.

Biala (7) 4—5 (20—4 — 28—5),
 $Z = (5) 3-6 (10-6 — 15-6)$.

¹ Gezogen.

(Fritsch.)

Bregenz (1) 28—5.
 Brünn (10) 16—4 (28—3 — 29—4).
 Bugganz (2) 29—4 (29—4 — 30—4).
 Cilli (5) 24—4 (15—4 — 10—5).
 Freistadt (4) 7—5 (1—5 — 13—5).
 Gresten (5) 19—4 (9—4 — 1—5).
 Hausdorf (10) 25—4,
 $2A = (1) 18-10! (1872)$.
 Hochwald (2) 16—5 (7—5 — 25—5).
 Igló (1) 9—5.
 Innsbruck (3) 23—4,
 $Z = (1) 15-6$.
 Kaschau (2) (11—4 — 10—5).
 Kessen (2) (24—4 — 15—5).
 Leibitz (1) 14—5.
 Lemberg (2) (20—4 — 15—5).
 Leutschau (1) 22—4.
 Linz (8) 29—4 (26—3 — 22—5).
 Melk (2) 20—4 (15—4 — 25—4).
 Neusohl (2) (20—4 — 27—5).
 Neutitschein (2) 3—5 (27—4 — 10—5).
 Rosenau (6) 26—4 (12—4 — 4—5).
 Rottalowitz (6) 11—5 (30—4 — 26—5).
 Salzburg (4) 19—4 (11—4 — 27—4),
 $Z = (4) (29-4 — 3-6)$.
 Troppau (3) 5—5 (29—4 — 17—5).
 Wien (5) 14—4 (5—4 — 7—5),
 $Z = (1) 24-5$.

In sehr seltenen Fällen kommen zwei Generationen vor (Hausdorf).

*52. *Bombyx Mori* H.¹

Biala (8) 24—7 (5—7 — 4—8),
 $Z = (4) 22-8 (15-8 — 20-8)$.
 Brünn (1) 20—7.
 Kaschau (1) 22—7.
 Linz (1) 15—5!,
 (1) 19—7.
 Roveredo (1) 16—6.
 Salzburg (3) 6—7 (24—6 — 15—7).²

An allen Stationen, wohl gezogen. Nach den Beobachtungen in Linz scheinen zuweilen zwei Generationen möglich.

¹ Fehlt in Heinemann's Werk.

² Gezogen.

53. *Endromis* O.52. *Versicolora* L.

Oft schon im März.

Agram (3) (28—3 — 3—5).

Brünn (10) 2—4 (19—3 — 22—4).

Freistadt (1) 19—4.

Iglau (3) (25—4 — 21—5).

Innsbruck (1) 6—5.

Kremsier (3) (29—3 — 4—6).

Rosenau (1) 14—4.

XI. BOMBYCOIDEA.

Flug bei Nacht.

54. *Gastropacha* O.54. *Betulifolia* F. Mai. (*Ilicifolia*.)

Linz (1) 6—4.

Rosenau 2 A = (1) 8—8.¹

Salzburg (1) 22—5.

Auch im April, und nach den Beobachtungen in Rosenau zwei Generationen wahrscheinlich.

55. *Quercifolia* L. Juni, Juli. (*Alnifolia*.)

Agram (1) 29—5.

Biala (7) 22—6 (14—6 — 28—6),

Z = (3) 25—7 (20—7 — 30—7).

Bregenz (1) 2—8.

Brünn (10) 26—6 (19—6 — 7—7).

Budweis (1) 20—7.

Cilli (1) 18—6.

Hausdorf (1) 4—7.

Kaschau (1) 10—7.

Kremsier (4) 30—6 (12—6 — 25—7).

Leutschau (1) 8—7.

Linz (3) 20—7 (11—7 — 2—8).

Neutitschein (2) 26—6 (24—6 — 29—6).

Prag (1) 25—7.

Rottalowitz (1) 7—8.

Salzburg (5) 25—7 (21—6 — 13—8).

Mehrere von den Zeitangaben wären als für die letzte Erscheinung gültig anzunehmen, wenn sie durch längere Zeiträume von den Angaben für die erste Erscheinung getrennt wären.

56. *Populifolia* V. Juli.

Hausdorf (1) 22—7.

Kessen (1) 2—7.

Auch im Juli.

¹ *Lasiocampa betulifolia*.57. *Pruni* L. Juni, Juli.

Budweis (2) (4—6 — 24—7).

Rosenau (1) 13—7.

Troppau (1) 27—7.

58. *Potatoria* L. Juli.

Brünn (7) 20—6 (16—6 — 25—6).

Freistadt (2) 26—6 (24—6 — 28—6).

Neutitschein (2) 27—6 (25—6 — 30—6).

Salzburg (3) 17—7 (1—7 — 24—7).

60. *Pini* L. Mai bis August.

Biala (1) 20—6.

Bregenz Z = (1) 27—8.

Brünn (7) 14—6 (5—6 — 24—6).

Budweis (1) 9—6.

Freistadt (1) 30—6.

Innsbruck (1) 4—6.

Linz (2) 13—6 (9—6 — 17—6).

61. *Quercus* L. Juni, Juli.

Biala (1) 20—6,

Z = (1) 30—7.

Bregenz (1) 4—7.

Brünn (8) 15—6 (5—6 — 21—6),

Z = (1) 30—7.

Cilli (2) 16—6 (12—6 — 20—6).

Kessen Z = (1) 7—9!.

Linz (3) 14—6 (3—6 — 25—6).

Salzburg (10) 17—7 (9—7 — 26—7),

(7) 20—7 (15—7 — 26—7), im Freien,

(3) 10—7 (9—7 — 12—7), gezogen.

Taufers (1) 16—6.

Trotzberg (1) 24—7.

62. *Trifolii* V. Juli, August. (*Medicaginis*.)

Bregenz (1) 17—7.

Kessen (2) (10—8 — 5—9).

Salzburg (5) 12—8 (1—8 — 27—8), im Freien,

(2) 3—8 (1—8 — 5—8), gezogen,

Z = (4) 26—8 (16—8 — 3—9).

63. *Rubi* L. Mai bis Juli.

Brünn (9) 23—5 (6—5 — 7—6).

Freistadt (1) 8—6.

Innsbruck (1) 10—6.

Linz (1) 8—5.

Neusohl (1) 27—5.

Neutitschein (2) 9—6 (31—5 — 19—6).

Rosenau (5) 15—5 (10—5 — 19—5).

Salzburg (2) (16—4 — 8—6).

Wien (4) 20—5 (12—5 — 2—6).

Fliegt Tags über bei Sonnenschein.

64. *Crataegi* L. August, September. (*Airae*.)

Agram (1) 15—9.

Bregenz (1) 28—8,

$Z = (1) 4—10$.

65. *Populi* L. September, October.

Brünn (3) 25—9 (20—9 — 1—10).

Kremsier (1) 28—6!

Rosenau $Z = (1) 18—11$.

Salzburg $Z = (1) 28—1$.¹

Nachzügler bis in den Winter hinein. Wenn die Beobachtung in Kremsier auf keinem Versehen beruht, zuweilen zwei Generationen.

67. *Neustria* L. Juni bis August.

Agram (2) 31—5 (28—5 — 3—6).

Bärn (3) 29—5 (10—5 — 15—6).

Biala (8) 8—6 (20—6 — 10—7),

$Z = (3) 12—8 (10—8 — 15—8)$.

Brünn (10) 21—6 (5—6 — 5—7).

Budweis (2) 16—6 (15—6 — 18—6).

Iglau (4) 3—7 (24—6 — 18—7).

Innsbruck (1) 24—6.

Kaschau (3) 2—7 (23—6 — 10—7).

Kessen (1) 22—7.

Kremsier (1) 25—6.

Melk (1) 18—5.

Neutitschein (2) 2—7 (25—6 — 9—7).

Rosenau (2) 28—6 (27—6 — 29—6).

Salzburg (9) 5—7 (17—6 — 20—7),

(6) 7—7 (25—6 — 20—7), im Freien,

(4) 28—6 (17—6 — 20—7), gezogen.

Troppau (3) 6—7 (24—6 — 20—7).

Wien (1) 21—7.

68. *Castrensis* L. Juli, August.

Linz (1) 26—6.

Wien (2) (8—7 — 28—7).

70. *Catax* L. August, September. (*Everia*.)

Brünn (6) 19—9.

Linz (1) 28—9.

¹ An einer Hausmauer am 28. Jänner 1872 fast ganz erstarrt sitzend.

Rosenau $Z = (2) 16—10 (15—10 — 17—10)$.

Rottalowitz (1) 7—8,

$Z = (1) 14—10$.

Auch im October.

71. *Lanestris* L. August, September.

Brünn (1) 19—9.

Freistadt (3) 28—3 (20—3 — 5—4)!.¹

Linz (1) 25—9.

Salzburg (2) (1—3 — 30—3)²

Überwintert also auch und erscheint im ersten Frühjahr. Die Erscheinung im Herbste dürfte in der Regel erst mit October beginnen und eine Unterbrechung durch den Winter erleiden.

55. *Lasiocampa* Schr.

Im October.

72. *Dumeti* L.

Rosenau (2) 15—10 (15—10 — 15—10).

XII. NOTODONTINA.

Die Falter fliegen in der Nacht.

56. *Cnethocampa* Stph.

76. *Processionea* L. Juli, August.

Agram (2) 31—5 (28—5 — 3—6)!.

Wien (1) 3—8.

Wenn die Beobachtungen in Agram auf keinem Irrthume beruhen, wären zwei Generationen anzunehmen.

57. *Ptilophora* Stph.

77. *Plumigera* V. October, November.

Salzburg (2) 19—11 (16—11 — 22—11).³

58. *Harpyia* O.

Der Schmetterling im Mai bis Juli.

78. *Vinula* L. (*Minax*.)

Biala (8) 18—5 (5—5 — 28—5).

Bregenz (1) 23—5.

Brünn (7) 12—5 (29—4 — 25—5).

Budweis (1) 23—5.

Bugganz (1) 7—5.

Cilli (3) 5—5 (19—4 — 17—5).

Freistadt (2) 22—4 (18—4 — 27—4).

Innsbruck (2) (29—3 — 21—4).

Kessen (1) 1—6.

¹ 1874 am 5. April ♂♀ und in Menge.

² 1873 am 1. März gezogen.

³ Gezogen.

- Kirchdorf (1) 7—6.
 Kremsier (3) (8—5 — 15—6).
 Leutschau (1) 8—5.
 Melk (2) (28—4 — 18—5).
 Neusohl (1) 24—5.
 Neutitschein (2) 31—5 (27—5 — 5—6).
 Prag (1) 4—6.
 Rosenau (4) 10—5 (1—5 — 22—5).
 Salzburg (1) 3—4.¹
 Senftenberg $Z = (1) 9—7$.
 Troppau (2) (24—4 — 18—6),
 $Z = (1) 29—7$.
 Erscheint zuerst schon im April.
79. *Erminea* Esp.
 Biala (7) 12—6 (28—5 — 25—6).
 Brünn (3) 10—5 (5—5 — 16—5).
 Neutitschein (2) 31—5 (26—5 — 5—6).
 Troppau (1) 17—5.
81. *Bifida* Bk.
 Brünn (3) (18—6 — 12—7).
 Rosenau (1) 28—5.
82. *Furcula* L. (*Fuscinula*).
 Salzburg (1) 5—5.
60. *Stauropus* Stph.
84. *Fagi* L. Mai bis Juli.
 Bregenz (1) 24—6.
64. *Notodonta* O.
92. *Tremula* V. Mai, Juni. (*Trepida*).
 Salzburg (1) 6—6.
94. *Dromedarius* L. Mai, Juni und wieder im Juli und August.
 Bregenz 2 A = (1) 10—8.
 Brünn (3) 10—5 (8—5 — 12—5).
 Wien (1) 9—5.
95. *Tritophus* V. Mai, Juni und wieder im Juli und August. (*Torva*).
 Brünn (1) 14—5 (14—5 — 15—5).
96. *Ziczac* L. April und Mai, Juli und August.
 Brünn (3) 11—5 (10—5 — 12—5).

¹ Gezogen.

97. *Dictaea* L. Mai, Juni, August.
 Brünn (1) 23—5.
 Neutitschein (2) 29—5 (24—5 — 3—6).
65. *Microdonta* Dup.
99. *Bicolora* V. Mai, Juni.
 Brünn (1) 12—6.
66. *Lophopteryx* Steph.
100. *Carmelita* Esp. April, Mai. (*Capucina*).
 Bregenz (1) 17—4.
102. *Camelina* L. April bis Juni.
 Agram (3) 4—7 (27—6 — 7—7)!.
 Brünn (1) 12—5.
 Kessen (1) 2—6.
 Troppau (1) 24—4.
68. *Pterostoma* Grm.
104. *Palpina* L. Mai, Juni.
 Brünn (5) 3—5 (27—4 — 6—5).
 Neutitschein (3) 22—4 (18—4 — 26—4),
 $Z = (2) 23—6 (16—6 — 1—7)$.
 Rosenau (1) 18—5.
 Salzburg $Z = (1) 1—7$.¹
 Troppau (1) 1—6.
69. *Phalera* Hb.
 Flugzeit im Mai und Juni.
105. *Bucephala* L.
 Biala (8) 20—5 (10—5 — 28—5),
 $Z = (4) 10—7 (30—6 — 15—7)$.
 Bregenz (1) 19—5.
 Brünn (10) 16—6 (16—5 — 12—7).
 Budweis (1) 20—5.
 Freistadt (1) 22—6.
 Gresten (1) 21—5.
 Iglau (5) 14—6 (7—6 — 2—7).
 Innsbruck (1) 8—6.
 Linz (3) (22—4 — 23—6).
 Neusohl (2) (27—5 — 24—6).
 Neutitschein (2) 24—6 (20—6 — 28—6).
 Nikolsburg (1) 5—6.
 Prag (2) 23—5 (23—5 — 23—5),
 $Z = (1) 5—7$.
 Rottalowitz (1) 5—6.

¹ Gezogen.

Salzburg (1) 2—5.¹
 Senftenberg (1) 5—6.
 Troppau $Z = (1) 30-7$.
 Wien (1) 17—6.

70. *Pygaera* O.

Doppelte Generation im Mai und Juni, und wieder im Juli und August.

108. *Anastomosis* L.

Brünn (5) 18—5 (13—5 — 24—5),
 $2A = (1) 10-8$.
 Kessen $2A = (1) 8-8$.

109. *Pigra* Hofn. (*Reclusa*.)

Salzburg (1) 18—5.

110. *Anachoreta* V.

Brünn (1) 22—4.
 Neutitschein (4) 6—5 (26—4 — 22—5),
 $2A = (2) 25-7$ (16—7 — 3—8).
 Salzburg $2A = (1) 11-7$.
 Wien (1) 12—5.

111. *Curtula* L.

Bregenz $Z = (1) 14-10$.
 Salzburg $2A = (2) 5-8$.
 Wien (1) 22—4.

Die zweite Flugzeit scheint bis in den October zu dauern.

XIII. LIPARIDINA.

71. *Orgyia* O.

Zwei Generationen im Juni und September.

113. *Antiqua* L.

Biala $2A = (1) 20-9$.
 Brünn (7) 24—6 (18—6 — 14—7),
 $2A = (6) 23-9$ (15—9 — 4—10),
 $Z = (3) 21-10$ (20—10 — 23—10).
 Gresten (2) 23—4 (22—4 — 25—4)!,
 $2A = (3) (22-8 — 26-9)$.
 Linz (1) 12—7,
 $2A = (3) 26-9$ (23—9 — 1—10).
 Neutitschein (1) 5—7,
 $2A = (3) 25-9$ (23—9 — 28—9),
 $Z = (2) 22-10$ (17—10 — 27—10).
 Salzburg (2) (30—6¹ — 29—7),
 $2A = (1) 18-9$.¹

¹ Gezogen.

Wien (3) 5—7 (28—6 — 20—7),
 $2A = 3-10$ (30—9 — 8—10),
 $Z = (8) 14-10$ (6—10 — 27—10).

Nach der Angabe des Beobachters in Gresten, des Herrn W. Schleicher, der volles Vertrauen verdient, schon im April; der Falter scheint somit zuweilen zu überwintern, wenn die Witterung im Spätherbste für die zweite Flugzeit ungünstig ist.

114. *Gonostigma* F.

Brünn $2A = (1) 11-7$.
 Kessen (2) 23—6 (16—6 — 30—6).

72. *Pentophera* Grm.

115. *Morio* L. Juni.

Brünn (8) 13—5 (7—5 — 19—5).
 Gresten (2) 24—5 (22—5 — 27—5).
 Linz (4) 15—5 (30—4 — 26—5).
 Neutitschein (1) 24—5.
 Rosenau $Z = (1) 9-7$,
 $2A = (1) 28-9$.
 Wien (4) 17—5 (14—5 — 21—5),
 $Z = (5) 26-6$ (18—6 — 4—7).

Fliegt in der Regel schon im Mai. Sehr selten im Herbste eine zweite Generation. (Rosenau.)

73. *Dasychira* Stph.

117. *Fascelina* L. Juni, Juli. (*Medicaginis*.)

Bregenz (2) 27—6 (26—6 — 28—6).
 Brünn (3) 29—5 (20—5 — 10—6).
 Budweis (1) 12—6.
 Neutitschein (2) 14—6 (10—6 — 18—6).
 Salzburg (1) 27—6.¹

118. *Pudibunda* L. Mai, Juni. (*Juglandis*.)

Biala (1) 20—4?
 Bregenz (1) 14—5.
 Brünn (6) 25—5 (16—5 — 30—5).
 Freistadt (3) 30—5 (18—5 — 10—6).
 Iglau (2) 21—6 (19—6 — 23—6).
 Kessen (1) 5—6.
 Linz (1) 15—4.
 Rosenau (3) (11—5 — 11—6).
 Salzburg (1) 11—4.¹
 Troppau (1) 15—5.

Erscheint schon im April.

¹ Gezogen.

120. *Salicis* L. Juni, Juni.

Agram (2) 12—6 (12—6 — 12—6).

Biala (2) (12—6 — 17—7),

 $Z = (2) 17-8 (15-8 - 20-8).$

Bregenz (1) 29—6.

Brünn (10) 27—6 (18—6 — 8—7).

Budweis (2) (15—6 — 12—7).

Freistadt (2) (19—6 — 10—7).

Hausdorf (1) 14—7.

Iglau (5) 24—6.

Igló (1) 26—5.

Innsbruck (3) 23—6 (15—6 — 27—6),

 $Z = (1) 15-8.$

Kaschau (4) 6—7 (3—7 — 12—7).

Kessen (1) 7—7,

 $Z = (1) 1-8.$

Kremsier (1) 3—7.

Linz (2) (26—5 — 9—7).

Melk (2) 22—6 (21—6 — 24—6).

Mistek (1) 10—7.

Neusohl (1) 27—6.

Prag (5) 3—7 (21—6 — 10—7),

 $Z = (3) 3-8 (22-7 - 15-8).$

Rosenau (5) 29—6 (13—6 — 12—7).

Rottalowitz (1) 1—7.

Salzburg (2) (10—6 — 21—7).¹

Troppau (1) 12—7.

Wien (5) 28—6 (20—6 — 7—7),

 $Z = (3) 21-7 (14-7 - 27-7).$

Kommt noch im August vor und könnte auch im Mai schon erscheinen. (Salzburg.)

74. *Ocneria* Hb.

Flugzeit im Juni und Juli.

123. *Dispar* L.

Agram (3) 15—6 (7—6 — 22—6).

♀ (3) 15—6 (7—6 — 22—6).

♂ (2) 22—6 (22—6 — 21—6).

Biala (8) 3—7 (25—6 — 15—7).

 $Z = (6) 17-8 (15-8 - 20-8).$

Brünn (10) 9—7 (26—6 — 27—7).

Kaschau (2) 12—7 (10—7 — 15—7).

Kremsier (3) 9—7 (4—7 — 14—7).

Linz (4) 11—7 (30—6 — 21—7).

Neutitschein (2) 23—7 (19—7 — 27—7).

¹ (1) 17—4. Gezogen.

Prag (3) 20—7 (13—7 — 27—7),

 $Z = (1) 26-8.$

Rosenau (5) 12—7 (30—6 — 2—8).

Rottalowitz (3) (3—3 — 1—7)!,

 $Z = (3) (27-7 - 7-9).$ Salzburg (1) 16—7.¹

Troppau (1) 9—7,

 $Z = (1) 8-8.$ Wien² (8) 16—7 (30—6 — 8—8), $Z = (6) 20-8 (2-8 - 1-9).$

Die Flugzeit erstreckt sich auch über den August und scheint höchst selten (Rottalowitz) schon im Frühjahr zu beginnen, wenn hier keine Verwechslung unterlaufen ist (*Amphidasis*).

124. *Monacha* L.

Brünn (5) 11—7 (4—7 — 22—7).

Budweis (2) 9—6 (1—6 — 18—6).

Freistadt $Z = (1) 10-8.$ Hochwald $Z = (1) 12-8.$

Iglau (3) 29—7 (17—7 — 9—8).

Kessen (1) 27—7.

Kirchdorf (1) 27—6.

Kremsier (1) 10—7.

Linz (1) 12—7.

Neutitschein (3) 17—7 (12—7 — 23—7).

Prag $Z = (1) 12-8.$

Wien (1) 13—7.

75. *Porthesia* Stph.

Die Falter im Juni bis August.

125. *Chrysorrhoea* L.

Agram (3) 12—6 (7—6 — 22—6).

Brünn (10) 24—6 (16—6 — 7—7).

Budweis (1) 14—7.

Innsbruck (2) 13—7 (6—7 — 20—7).

Kaschau (3) 10—7 (8—7 — 20—7).

Kessen (1) 6—7.

Kremsier (1) 28—6.

Linz (3) 28—6 (25—6 — 3—7).

Neutitschein (3) 9—7 (5—7 — 15—7).

Rosenau (5) 4—7 (22—6 — 12—7).

Salzburg (10) 12—7 (4—7 — 17—7), im Freien,

(3) 28—6 (17—6 — 8—7), gezogen,

♀ (6) 10—7 (21—6 — 17—7),

¹ Gezogen.² Fast nur fliegende ♂ beobachtet.

♂ (6) 5—7 (17—6 — 14—7),
 $Z = (7) 23—7 (15—7 — 1—8).$

Wien (2) 30—6 (25—6 — 4—7).

In der Regel im August nicht mehr.

126. *Auriflua* V.

Brünn (8) 25—6 (14—6 — 7—7).

Budweis (1) 23—6.

Freistadt (1) 17—7.

Kremsier (1) 1—7.

Leutschau (1) 7—7.

Linz (1) 13—7.

Rosenau (1) 18—7.

Salzburg (4) 17—7 (9—7 — 22—7),

$Z = (2) 3—8 (2—8 — 4—8).$

Wie der Vorige.

76. *Laelia* Stph.

Flugzeit im Juni, Juli.

127. *V. nigrum* F. (*Nivosa*.)

Brünn (1) 2—7.

XIV. ARCTIOIDEA.

Fuliginosa und *Russula* haben eine doppelte Generation.

79. *Phragmatobia* Stph.

131. *Fuliginosa* L. Mai, Juli.

Bregenz (1) 16—5.

Brünn (9) 9—4,

$2A = (2) 14—7 (7—7 — 22—7).$

Budweis (2) 11—4,

$2A = (1) 23—7.$

Kaschau $2A = (1) 12—7.$

Kaschau (1) 11—5.

Linz (3) (8—4 — 8—5).

Neutitschein (4) 19—4 (3—4 — 28—4),

$2A = (2) 29—7 (28—7 — 30—7),$

$Z = (2) 28—9 (24—9 — 3—10).$

Rosenau (1) 7—5.

Salzburg (5) 3—5 (18—4 — 18—5),

$2A = (9) 27—7 (18—7 — 17—8).$

Wien (2) 19—4 — 27—5).

In der ersten Generation schon im April, bei der zweiten auch noch im August und selbst September (Neutitschein).

132. *Matronula* L. Juni, Juli. (*Matrona*.)

Brünn (2) 25—6 (16—6 — 5—7).

Innsbruck (1) 8—6.

Kaschau (1) 4—7.

Kremsier (2) 20—6 (20—6 — 21—6).

Melk (1) 17—6.

Nikolsburg (1) 21—6.

Rosenau (1) 17—7.

Troppau (1) 29—6.

81. *Arctia* Schr.

Flugzeit im Mai und Juni.

134. *Lubricipeda* V.

Brünn (2) 17—5 (16—5 — 18—5).

Budweis (2) 26—6 (23—6 — 29—6).

Iglau (3) 30—5 (27—5 — 2—6).

Innsbruck (2) (6—6 — 27—6).

Linz (3) (18—5 — 17—6).

Neutitschein (1) 4—7.

Prag $Z = (2) 17—7 (10—7 — 25—7).$

Salzburg $Z = (1) 14—7.$

Senftenberg (1) 17—5.

Auch noch im Juli.

135. *Menthastri* V.

Brünn (1) 19—5.

Budweis (1) 27—5.

Freistadt (2) (24—4 — 15—6).

Linz (3) 5—6 (19—5 — 17—6).

Neutitschein (1) 20—5 (19—5 — 22—5).

Rosenau (4) 8—6 (15—5 — 3—7).

Salzburg (5) 25—5 (17—4 — 27—6),

(3) 11—6 (7—6 — 27—6), im Freien,

(2) 24—4 (17—4 — 2—5, gezogen,

$Z = (3) 16—7 (7—7 — 28—7).$

Ebenfalls noch im Juli.

137. *Mendica* L.

Brünn (3) 17—5 (5—5 — 9—6).

Melk (1) 3—5.

Rosenau (3) 21—5 (12—5 — 6—6).

Salzburg (3) 18—5 (25—4 — 14—6).

Troppau (1) 25—5.

139. *Russula* L.

Zwei Generationen, im Juni, Juli und wieder im August.

Brünn (3) 14—5 (9—5 — 25—5).

Kremsier (1) 5—6.

Linz (1) 13—5,

$2A = (1) 26—7.$

Neutitschein (3) 9—6 (2—6 — 14—6).

Prag $2A = 29-7$.¹
 Rosenau (4) $31-5$ ($15-5-6-6$),
 $2A = 9-7$ ($9-7-10-7$),¹
 $Z = (2) 5-8$ ($1-8-10-8$).
 Salzburg (2) ($28-4-30-5$),
 $2A = 18-7$ ($9-7-25-7$),
 $Z = (1) 3-8$.
 Taufers (1) $21-6$.
 Troppau (1) $2-6$.
 Wien (1) $25-5$.

Auch schon im Mai.

140. *Purpurea* L. Juni.

Brünn (4) $23-6$ ($17-6-25-6$).
 Freistadt (1) $22-6$.
 Linz (1) $11-6$.
 Prag (1) $4-5$!.
 Rosenau $Z = (1) 12-7$.
 Wien $Z = (1) 2-7$.²

143. *Aulica* L. Juni.

Brünn (4) $11-5$ ($7-5-19-5$).
 Freistadt (1) $18-6$.
 Kaschau (1) $22-5$.
 Rosenau (3) $24-5$ ($15-5-3-6$).
 Rottalowitz (1) $11-6$.
 Senftenberg (1) $5-6$.
 Troppau (1) $25-5$.

Auch schon im Mai.

145. *Villica* L. Juni, Juli.

Brünn (9) $11-6$ ($1-6-20-6$).
 Cilli (2) $24-5$ ($21-5-28-5$).
 Rosenau (2) $11-6-12-7$.
 Rottalowitz (11) $12-6$ ($21-5-9-7$),
 $2A = (1) 22-9$.
 Wien (3) $12-6$ ($25-5-24-6$)

Nach einer freilich vereinzelt Beobachtung (Rottalowitz) scheint der Spinner, wenn auch sehr selten, in zwei Generationen vorzukommen. Ein so spätes Vorkommen lässt sich wenigstens kaum anders deuten.

146. *Caja* L. Juni bis August.

Agram (3) $17-6$ ($12-6-28-6$).
 Biala (7) $2-7$ ($20-6-14-7$),
 $Z = (3) 27-8$ ($1-8-30-8$).
 Bregenz (1) $29-6$.

¹ Könnte auch Z der ersten Generation sein.

² Ein frisches Exemplar.

Brünn (10) $16-6$ ($7-6-25-6$).
 Budweis (2) $11-7$ ($2-7-21-7$).
 Bugganz $Z = (1) 22-8$.
 Freistadt (1) $15-7$.
 St. Jakob $Z = (1) 10-8$.
 Iglau (5) $25-6$ ($10-6-7-7$).
 Kaschau (1) $13-7$.
 Kessen (4) $23-7$ ($11-7-4-8$).
 Kirchdorf (2) $26-7$ ($18-7-4-8$).
 Kremsier (2) $15-7$ ($6-7-24-7$).
 Linz (3) $17-7$ ($6-7-26-7$).
 Neutitschein (3) $2-7$ ($28-6-3-7$).
 Prag $Z = (2) 10-8$.¹
 Rosenau $Z = (2) 3-8$.¹
 Rottalowitz (2) ($8-6-24-7$).
 Salzburg (10) $20-7$ ($11-7-2-6$),²
 $Z = (4) 16-8$ ($2-8-2-9$),
 ♀ (5) $22-7$ ($11-7-28-7$),
 ♂ (4) $26-7$ ($17-7-5-8$).
 Troppau (2) $9-7$ ($4-7-15-7$).
 Trotzberg (1) $5-8$.
 Wien $Z = (1) 14-8$.

Die regelmässige Flugzeit beginnt mit Juli.

148. *Plantaginis* L. Mai, Juni.

Brünn (4) $4-6$ ($20-5-21-6$).
 Freistadt (1) $16-6$.
 Linz (2) $15-6$ ($5-6-25-6$).
 Rosenau (2) $11-6$ ($11-6-11-6$).
 Rottalowitz (1) $4-6$.
 Troppau (1) $2-6$.
 Trotzberg (1) $11-8$.³

Die regelmässige Flugzeit beginnt mit Juni.

150. *Hebe* L. Juni.

Brünn (7) $9-5$ ($5-5-19-5$).
 Iglau (1) $21-6$.
 Nikolsburg (1) $16-5$.
 Wien (1) $4-5$.

Erscheint schon im Mai.

82. *Callimorpha* Ltr.

151. *Dominula* L. Juli. (*Domina*.)

Bregenz (1) $2-7$.
 Brünn (8) $5-7$ ($24-6-14-7$).

¹ Z ?

² Grösstentheils gezogen.

³ Wahrscheinlich hoch in den Alpen.

Budweis (2) 28—6 (25—6 — 2—7).
 Freistadt (4) 30—6 (20—6 — 11—7),
 $Z = (2) 21—7 (20—7 — 23—7).$
 Gresten (2) 6—7 (3—7 — 9—7).
 Innsbruck (2) (20—6 — 13—7).
 Kaschau (3) 15—7 (12—7 — 26—7).
 Kessen (1) 15—7,
 $Z = (1) 14—8.$

Kirchdorf (1) 29—6.
 Linz (1) 16—7.
 Neutitschein (1) 10—7.
 Oberschützen (2) 4—6 (2—6 — 6—6)!.
 Prag (1) 10—7.
 Rosenau (3) 5—7 (20—6 — 18—7).
 Salzburg (5) 7—7 (26—6 — 20—7).
 Trotzberg (1) 5—8.¹
 Wien (2) 5—7 (29—6 — 11—7).

Ob im Juni? (Oberschützen.)

152. *Hera* L. Juli.

Baumgartenberg (1) 31—7.
 Bregenz (2) 2—7 (25—6 — 9—7).
 Brünn (9) 20—7 (4—7 — 5—8).
 Kaschau (4) 20—7 (15—7 — 26—7).
 Kessen (1) 16—7.
 Linz (1) 8—8.
 Prag (1) 12—8,
 $Z = (1) 28—8.$
 Rosenau (2) 27—7 (27—7 — 28—7),
 $Z = (1) 23—8.$
 Rottalowitz (3) 18—5 (6—5 — 28—5)!,
 $2A = (4) 31—7 (17—7 — 16—8),$
 $Z = (1) 26—8.$
 Salzburg (8) 28—7 (13—7 — 12—8),
 $Z = (9) 25—8 (18—8 — 12—9).$
 Trotzberg (1) 5—8.
 Wien (3) 27—7 (11—7 — 6—8),
 $Z = (2) (23—8 — 19—9).$

Auch noch im August. Zuweilen zwei Generationen?
 (Rottalowitz.)

154. *Jacobaeae* L. Mai und Juni.

Biala (8) 31—5 (18—5 — 14—6),
 $Z = (5) 13—7 (10—7 — 15—7).$
 Brünn (5) 22—5 (13—5 — 30—5).
 Kaschau (1) 23—5.
 Linz (1) 26—5.

¹ Wahrscheinlich in den Alpen oder Z.

Mistek (1) 2—6.
 Prag (1) 15—5.
 Rosenau (4) 31—5 (17—5 — 9—6).
 Rottalowitz (5) 12—6 (28—5 — 30—6).
 Salzburg (1) 9—6.
 Wien (2) 26—6 (24—6 — 27—6).

83. *Emydia* Bd.

Juli.

155. *Grammica* L.

Linz (1) 27—5.

Beide Zeitangaben stimmen nicht überein.

XV. SYNTOMOIDEA.

Flug bei Tage im Juni und Juli.

84. *Syntomis* Latr.

157. *Phegea* L.

Agram (3) (22—5 — 22—6).
 Brünn (8) 18—6 (9—6 — 4—7).
 Bugganz (2) 21—6.
 Iglau (1) 21—7.
 Kaschau (4) 14—6 (10—6 — 19—6).
 Neusohl (1) 1—7.
 Nikolsburg (1) 8—7.
 Prag (5) 3—7 (18—6 — 12—7),
 $Z = (2) 14—8 (13—8 — 14—8).$
 Raab (1) 27—6.
 Rosenau (4) 18—6 (7—6 — 6—7).
 Rottalowitz (10) 27—6 (8—5! — 16—7),
 (9) 30—6 (16—6 — 16—7),
 $Z = (1) 25—7.$
 Taufers (1) 24—6.
 Wien (6) 13—6 (18—5 — 30—6),
 $Z = (7) 17—7 (8—7 — 6—8).$

Erscheint, wenn auch sehr selten, schon im Mai.

85. *Naclia* Bd.

158. *Ancilla* L.

Brünn (6) 6—7 (1—7 — 12—7).
 Rosenau (2) 22—7 (17—7 — 28—7).
 Wien (2) 4—7 (24—6 — 13—7),
 $Z = (1) 4—8.$

Erscheint erst im Juli, nicht schon im Juni.

XVI. LITHOSINA.

86. *Setina* Schr.

160. *Aurita* Esp. Alpen von 1500(?) — 7200'. (*Compluta*, *Ramosa*, *Imputa*.)

Trotzberg (1) 11—8.

161. *Roscida* V. Mai, Juni; auf den höheren Alpen im August. (*Kuhlweinii*, *Melanomos*.)

Wien (1) 31—5.

162. *Irrorella* L. Juli, August. Varietäten in den höheren Alpen. (*Irrorea*, *Andereggii*, *Freyeri*.)

Brünn (3) 5—6 — 10—7.

Linz (1) 1—7.

Neutitschein (2) 2—6 (1—6 — 4—6).

Rosenau (4) 4—7 (22—6 — 18—7).

Wien (2) (25—5 — 4—7).

Auch schon im Juni, doch nicht in den Alpen.

163. *Mesomella* L. Juni, Juli. (*Eborina*.)

Linz (1) 24—6.

Neutitschein (1) 2—7.

Rosenau (2) 3—6 (31—5 — 6—6),

$Z = (2) 16—7 (14—7 — 18—7).$

Salzburg (1) 1—7.

87. *Lithosia* F.

Meist im Juni und Juli, selten früher oder später.

164. *Sororcula* Hfn. Mai, Juni. (*Aureola*.)

Rosenau (3) 17—5 (14—5 — 18—5).

Salzburg (1) 25—4,

$Z = (1) 18—6.$

166. *Lutarella* L. Juni bis August. (*Luteola*.)

Brünn (1) 4—7.

Rosenau (1) 30—7.

Salzburg $Z = (1) 18—8.$

Dürfte erst im Juli, nicht schon im Juni erscheinen.

167. *Pallifrons* Zll. August. Noch wenig beobachtet.

Salzburg (1) 25—6.

Wahrscheinlich schon im Juli.

168. *Unita* V. (*Palleola*, ? *Vitellina*, ? *Gilveola*.)

Linz (1) 25—7.

Salzburg (8) 21—7 (6—7 — 5—8),

$Z = (4) 24—8 (19—8 — 28—8).$

Wien (2) 23—7 (17—7 — 30—7).

170. *Complana* L. Juni bis August.

Salzburg (1) 18—7.¹

¹ Bei St. Jakob.

171. *Plumbeola* Hb. Juni, Juli. (*Lurideola*.)

Rosenau (1) 31—5,

$Z = (2) 13—7 (12—7 — 15—7).$

172. *Depressa* Esp. Juni, Juli. (♂ *Helveola*, ♀ *Depressa*, *Ochreola*.)

Linz (1) 12—7.

Salzburg (1) 10—7,

$Z = (1) 1—9.$

Wahrscheinlich zuerst im Juli, nicht Juni; dann auch noch im August.

173. *Caniola* Hb.

Bozen (2) 1—6 (29—5 — 3—6),

$Z = (1) 26—8.$ ¹

88. *Gnophria* Stph.

Entwicklung im Juni und Juli.

176. *Quadra* L.

Brünn (4) 27—6 (20—6 — 2—7).

Gresten (2) 30—6 (28—6 — 2—7).

Linz (1) 30—6.

Neutitschein (3) 5—7 (29—6 — 11—7).

Prag (2) 29—7 (19—7 — 8—8).²

Rosenau (4) 10—7 (26—6 — 18—7).

Salzburg (5) 22—7 (26—6 — 31—7),

$Z = (2) (8—8 — 8—9).$

Troppau (1) 27—7.

Wien (1) 16—7.

Erst im Juli und noch im August.

177. *Rubricollis* L.

Brünn (1) 20—6.

Freistadt (2) 7—6 (29—5 — 16—6).

Innsbruck (1) 15—6.

Linz (3) 14—6 (8—6 — 17—6).

Neutitschein (1) 22—6.

Rosenau (2) 7—6 (3—6 — 11—6).

Salzburg $Z = (1) 7—7.$

Wien $Z = (1) 12—7.$

89. *Nola* Lch.

Flugzeit im Juli; *Rosea* früher.

181. *Rosea* F. Juni, Juli.

Brünn (3) 28—6 (20—6 — 20—7).

Rosenau (3) 14—7 (28—6 — 27—7).

¹ 2A?

² Wahrscheinlich zu spät.

Salzburg (3) 20—7 (18—7 — 23—7),
Z = (1) 18—8.

Wien (1) 4—7.

Auch im August.

XVII. BREPHINA.

Im ersten Frühjahre, am Tage fliegend.

91. *Brephos* O.

191. *Parthenias* L. März, April.

Brünn (4) 5—4 (25—3 — 12—4).

Freistadt (3) 17—3 (16—3 — 19—3).

Gresten (4) 11—3 (18—2 — 31—3).

Innsbruck (3) 12—3 (16—2 — 29—3).

Leutschau (1) 3—4.

Linz (6) 15—3 (28—2 — 23—3).

Pressburg (2) (4—3 — 12—4).

Rosenau (4) 26—3 (13—3 — 8—4).

Troppau (1) 11—4.

Wien (1) 28—3.

192. *Notha* Esp.

Linz (2) 19—3 (18—3 — 20—3),

Z = (1) 21—4.

Salzburg (3) 9—3 (3—3 — 16—3),

Z = (3) 30—3 (26—3 — 4—4).

Wien (1) 28—3.

193. *Puella* Esp. (*Spuria*.)

Brünn Z = (1) 15—4.

Linz (2) 30—3 (29—3 — 1—4).

Pressburg (1) 30—3.

Wien (6) 6—3 (9—2 — 21—3).

Zuweilen schon im Februar.

D. Noctuae.

XVIII. NOCTUINA.

I. CYMATOPHORIDAE.

Die Entwicklung im Frühlinge.

92. *Scodra* Heinemann.

Der Schmetterling im ersten Frühjahre.

3. *Flavicornis* L.

Bregenz (1) 4—4.

Brünn (2) 11—4 (9—4 — 13—4).

93. *Cymatophora* Tr.

6. *Ocularis* L. April, Mai. (*Octogesima*.)

Salzburg 2 A = (1) 6—8.

Zwei Generationen.

7. *Duplaris* L. Mai bis Juli. (*Bipuncta*, *Undosa*.)

Salzburg 2 A = (1) 22—8.

Wien (3) (6—4 — 25—5).

Wahrscheinlich zwei Generationen; in der ersten schon im April.

94. *Thyatira* O.

Die Schmetterlinge im Juni.

9. *Derasa* L.

Linz (1) 19—6.

10. *Batis* L.

Bregenz (1) 23—4.

Salzburg 2 A = (1) 19—8.

Zwei Generationen.

II. BOMBYCOIDEA.

95. *Diloba* Bd.

11. *Coeruleocephala* L. August bis October.

Agram (3) 19—8 (7—8 — 27—8).

Bregenz (1) 28—8.

Brünn (4) 3—5 (25—4 — 6—5),

2 A = (8) 20—9 (7—9 — 10—10).¹

Linz (1) 26—9.

Neutitschein (1) 12—9,

Z = (3) 13—10 (11—10 — 16—10).

Rosenau Z = (2) 30—10 (21—10 — 9—11).

Salzburg Z = (1) 19—10.

Nach den Beobachtungen in Brünn zwei Generationen.
Die zweite dauert auch im September und October fort.

97. *Demas* Stph.

13. *Coryli* L. Mai bis Juli.

Brünn (1) 16—5.

Hausdorf Z = (1) 14—7.²

Wien (1) 30—3.

Auch schon im April, und desshalb mit Rücksicht auf die Beobachtung in Hausdorf zwei Generationen zu vermuthen.

III. ACRONYCTIDAE.

100. *Moma* Hb.

16. *Orion* Esp. Mai, Juni. (*Aprilina*.)

Bregenz (1) 5—4.

Brünn (5) 16—5 (10—5 — 21—5).

Schon im April.

¹ Z?

² 2 A?

101. *Aronycta* O.

- 17.
- Leporina*
- L. Mai bis August. (
- Bradyporina*
- .)

Bregenz (1) 16—5.

Freistadt (1) 21—5.

Neutitschein (1) 6—7.¹

Rosenau (1) 20—5.

- 18.
- Strigosa*
- V. Mai bis Juli. (
- Favillacea*
- .)

Brünn (1) 25—4.

Neutitschein (1) 20—6.

- 20.
- Tridens*
- V. Juni, Juli. (
- Psi*
- .)

Brünn (3) 18—4 (16—4 — 22—4),

 $2A = (2) 11-7 (11-7 — 11-7).$

Rosenau (2) 18—5 (11—5 — 26—5).

Salzburg $2A = (1) 19-7.$

Wien (1) 5—5,

 $Z = (1) 30-10.$

Zwei Generationen, die erste schon im Mai, die zweite zuerst im Juli und noch im October.

- 21.
- Psi*
- L. Mai bis Juli. (
- Tridens*
- .)

Agram (1) 7—6 (3—6 — 12—6).

Bregenz (1) 16—6.

Brünn (10) 2—5 (21—4 — 11—5),

 $Z = (1) 11-7.$ Kaschau (1) 30—6.¹

Linz (1) 16—5.

Neutitschein (3) 17—5 (12—5 — 22—5).

Prag (3) (12—4 — 29—5),

 $Z = (1) 17-8.$ ²

Erscheint zuerst schon im April. Eine zweite Generation nicht unwahrscheinlich.

- 22.
- Cuspi*
- Hb. Juni.

Freistadt (1) 15—7.¹

- 23.
- Aceris*
- L. Mai bis Juli.

Brünn (4) 31—5 (21—5 — 7—6).

Rosenau (1) 9—6.

- 24.
- Auricoma*
- V. Zwei Generationen. Mai und Juli.

Bregenz (2) 16—5 (14—5 — 18—5),

 $2A = 11-8 (11-8 — 12-8).$

Brünn (9) 29—4 (20—4 — 8—5).

¹ Kaum die erste Erscheinung.² $2A$?

- 25.
- Menyanthidis*
- Hb. Zwei Generationen. Mai und Juli.

Brünn (1) 18—5.

- 26.
- Rumicis*
- L. Mai, Juli, August.

Brünn (9) 1—5 (19—4 — 22—5),

 $2A = (4) 1-7 (25-6 — 4-7).$

Linz (2) 29—4 (23—4 — 6—5),

 $2A = (1) 21-7.$

Neutitschein (3) 29—4 (26—4 — 2—5),

 $2A = (3) 15-7 (11-7 — 23-7).$

Prag (2) 2—5 (2—5 — 3—5).

Rosenau (1) 3—5.

Salzburg (3) 9—4 (4—4 — 15—4),¹ $2A = (7) 29-7 (15-7 — 3-8),$ $Z = (6) 14-8 (4-8 — 26-8).$ Wien $2A = (1) 15-7,$ $Z = (1) 30-10.$

Bei der ersten Generation schon im April (gezogen), bei der zweiten bis in den October.

- 27.
- Euphorbiae*
- V. Zwei Generationen, Mai, Juni und wieder Juli und August. (
- Esulae*
- ,
- Cyparissiae*
- .)

Bregenz (1) 4—5.

Rosenau (1) 16—6.

- 30.
- Megacephala*
- V. Mai, Juni.

Brünn (8) 23—5 (15—5 — 1—6).

Neutitschein (2) 4—6 (2—6 — 4—6).

Prag (1) 4—5.

Wien (2) 14—5 (8—5 — 21—5),

 $Z = (2) (5-7 — 4-8).$ ²

Ebenfalls zwei Generationen nicht unwahrscheinlich.

- 31.
- Ligustri*
- V. Mai, Juni.

Bregenz (1) 29—5.

102. *Bryophila* Tr.

Entwicklung im Juni bis August.

- 32.
- Perla*
- V. Juli, August.

Brünn (10) 20—7 (9—7 — 7—8).

Neutitschein (1) 5—8.

Prag (1) 28—4,

 $2A = (1) 28-7.$ Wien (1) 5—6,³ $2A = 13-7 (12-7 — 15-7).$

Zwei Generationen wahrscheinlich.

¹ Gezogen.² $2A$?³ Kaum die erste Erscheinung.

IV. HADENIDAE.

103. *Hadena* Tr.39. *Atriplicis* L. Mai bis Juli.

Bregenz (2) 24—5 (22—5 — 26—5).

Brünn (3) 30—5 (24—5 — 4—6).

Kremsier (2) 23—5.

Linz (1) 14—6.

Neutitschein (3) 3—6 (28—5 — 6—6).

Prag (2) 30—5 (24—5 — 5—6).

Rosenau (2) (10—5 — 2—6).

Salzburg (3) 21—6 (13—6 — 29—6).

40. *Strigilis* L. Juni, Juli. (*Praeduncula*, *Latruncula*.)

Neutitschein (1) 17—6.

Salzburg (3) 6—6 (2—6¹ — 14—6).41. *Furuncula* V. Juni, Juli. (*Vinctuncula*.)

Salzburg (1) 31—5,

Z = (1) 19—7.

45. *Didyma* Esp. Mai bis Juli. (*Nictitans*, *Secalina*.)

Brünn (9) 18—5 (8—5 — 12—6).

Neutitschein (2) 20—6 (19—6 — 22—6).

Prag (1) 7—5.

Salzburg (6) 3—7 (25—6 — 22—7),

Z = (5) 20—8 (18—8 — 2—9).

Wien (1) 6—7.

Auch noch im August. Ob nicht auch zwei Generationen? (Salzburg, Wien.)

46. *Scolopacina* Esp. Juli, August.

Linz (1) 22—6.

47. *Rurea* F. Mai bis Juli. (*Putris*, *Combusta*.)

Bregenz (2) 25—5 (22—5 — 29—5).

Neutitschein (1) 14—6.

52. *Basilinea* V. Mai, Juni.

Brünn (3) 6—6 (19—5 — 15—6).

Linz (1) 11—6.

Salzburg (1) 21—6.

55. *Polyodon* L. Juni, Juli. (*Radicea*.)

Prag (1) 23—7.

Rosenau (2) 12—7 (10—7 — 14—7).

Salzburg (5) 15—7 (5—7 — 27—7),

Z = (5) 17—8 (1—8 — 31—8).

Wien (1) 4—6.

Fliegt auch noch im August.

¹ 2—6. Gezogen.56. *Lithoxylea* V.

Brünn (1) 10—6.

Linz (1) 19—6.

Neutitschein (2) 11—5 (7—5 — 16—5).

Salzburg (2) 24—6 (21—6 — 28—6),

Z = (2) 30—7 (27—7 — 2—8).

69. *Ochroleuca* V. Juli, August.

Brünn (4) 6—7 (5—7 — 9—7).

Rosenau (1) 12—7.

73. *Ypsilon* V. Juni, Juli.

Neusohl (1) 10—7.

Salzburg (2) 15—7 (9—7 — 21—7),

Z = (1) 27—8.

Erst im Juli und August.

104. *Apamea* Tr.75. *Testacea* V. August, September.

Neutitschein (1) 29—8.

106. *Rhizogramma* Ld.81. *Petrorhiza* Bk. Juli, August. (*Comma*.)

Gresten (1) 23—6,

Z = (1) 28—8.

107. *Polia* Tr.Zu Ende des Sommers und im Herbst; *Chi* in doppelter Generation.83. *Chi* L. Juli, September.

Brünn (1) 18—6.

Salzburg 2A = (1) 5—9.

85. *Polymita* L. Juli. (*Ridens*.)

Rosenau (1) 21—8.

Auch im August, ob früher?

86. *Flavicincta* V. August bis October.Rosenau (1) 29—6!¹109. *Dianthoeccia* Bd.

Einige Arten haben zwei Generationen.

93. *Albimacula* Bk. Juni. (*Concinna*.)

Brünn (1) 30—5.

95. *Comta* V. Mai bis Juli.

Linz (1) 26—6.

Prag (1) 30—6.

¹ Vom Beobachter als *Eucosmia undulata* angeführt. Vielleicht mit *P. Flavicornis* nicht synonym.

- Salzburg $Z = (1) 22-7$.
Wien (1) 6-6.
97. *Cucubali* V. Mai, Juni und wieder im Juli und August.
Brünn 2 A = (1) 4-8.
Linz 2 A = (2) 12-7 (7-7 — 18-7).
Neutitschein 2 A = (2) 5-8 (5-8 — 5-8).
Salzburg 2 A = (4) 30-6 (17-6¹ — 12-7),
 $Z = (4) 20-8 (14-8 — 24-8)$.
Die erste Generation unwahrscheinlich.
110. *Mamestra* Tr.
Die Entwicklung meist im Juni, bisweilen noch in zweiter Generation im September.
102. *Glaucia* Hb. Juni, Juli.
Brünn (1) 4-5.
Neutitschein (1) 5-6.
Zuerst schon im Mai.
104. *Dentina* V. Mai bis Juli.
Brünn (6) 7-5 (4-5 — 14-5).
Rosenau (1) 17-5.
106. *Dysodea* V. Juni, Juli, September.
Bregenz 2 A = (1) 14-8.
107. *Chenopodii* V. Mai, Juni und wieder im Juli bis September.
Brünn (1) 22-4.
Prag (1) 27-4,
2 A = (1) 25-7.
Wien (2) (11-5 — 23-6).
110. *Genistae* Bk. Mai, Juni.
Brünn (3) 6-5 (3-5 — 11-5).
Linz (1) 9-6.
Neutitschein (3) (3-5 — 4-6).
Salzburg (2) 7-6 (2-6 — 12-6).
112. *Suasa* V. Mai, Juni, auch im August.
Bregenz (1) 16-5.
Neutitschein 2 A = (1) 8-8.
Salzburg (2) (11-6 — 29-7).
114. *Oleracea* L. Mai, Juni und wieder im August.
Bregenz (1) 14-5.
Brünn (6) 10-5 (5-5 — 18-5),
2 A = (1) 6-8.
Rosenau (2) 27-5 (17-5 — 6-6).

¹ Gezogen.

- Salzburg (1) 29-6.¹
Wien (1) 5-6.
116. *Pisi* L. Mai, Juni.
Brünn (5) 31-5 (22-5 — 8-6).
Neutitschein (3) 14-6 (9-6 — 22-6).
Salzburg (1) 6-5,¹
2 A = (3) 29-7 (22-7 — 2-8).
Nach den Beobachtungen in Salzburg zwei Generationen.
117. *Persicariae* L. Mai bis Juli.
Brünn (4) 25-5 (20-5 — 1-6).
Neutitschein (3) 10-6 (5-6 — 16-6).
Salzburg (2) (7-5¹ — 3-6),
 $Z = (1) 5-7$.
118. *Brassicae* L. Vom Mai bis in den September, doch nur in einer Generation.
Brünn (10) 10-5 (22-4 — 25-5).
Innsbruck (2) (3-5 — 27-6).
Linz (2) (4-6 — 24-6).
Neusohl (1) 20-6.²
Neutitschein (1) 9-7.²
Prag (3) 4-6 (24-5 — 20-6).
Rosenau (2) 31-5 (31-5 — 1-6).
Salzburg (5) 25-5 (9-5 — 19-6),
 $Z = (2) 29-8 (25-8 — 3-9)$.
Wien (1) 29-5,
 $Z = (2) 30-9 (28-9 — 2-10)$.
123. *Nebulosa* Hfn. Mai, Juni. (*Plebeja*).
Brünn (4) 6-6 (16-5 — 16-6).
Neutitschein (2) 18-6 (16-6 — 20-6).
Prag (1) 22-6.
Rosenau (2) (19-6 — 19-7).
Auch noch im Juli.
124. *Leucophaea* V. Mai, Juni.
Prag (1) 23-5.
Salzburg (2) 22-5 (15-5 — 29-5),
 $Z = (1) 22-6$.
Wien (2) 14-5 (14-5 — 15-5),
 $Z = (1) 14-6$.
111. *Neuronia* Hb.
Die Schmetterlinge im August und September.
126. *Popularis* F. (*Graminis*).
Salzburg (5) 31-8 (30-8 — 5-9).

¹ Gezogen.² Kaum die erste Erscheinung.

127. *Cespitis* V.

Salzburg (2) 29—8 (26—8 — 1—9).

114. *Cloantha* Bd.

Die Schmetterlinge im Herbst, oder Mai und Juni des nächsten Jahres.

132. *Perspicillaris* L. Wohl in zwei Generationen.

Rosenau 2 A = (1) 30—7.

Salzburg (1) 10—6,

2 A = (1) 2—8.

133. *Radiosa* Esp. (*Lyncea*.)

Brünn (2) 12—5 (12—5 — 12—5).

134. *Hyperici* V.

Brünn (2) 10—5 (9—5 — 12—5).

117. *Brotolomia* Ld.

Doppelte Generation.

137. *Meticulosa* L. Mai, Juni, August, September.

Bregenz (1) 22—5.

Brünn 2 A = 30—8 (25—8 — 4—9).

Budweis (1) 3—5.

Freistadt (1) 23—6.

Innsbruck (1) 17—6.

Kessen (1) 6—6.

Linz (1) 19—5.

Neutitschein 2 A = 7—9 (7—9 — 7—9),

Z = (1) 20—10.

Rosenau 2 A = (1) 7—8,

Salzburg (4) 4—6 (23—5 — 16—6),

2 A = (2) (8—8 — 29—8),

Z = (1) 19—9.

Auch noch im October (Neutitschein).

119. *Mania* Tr.140. *Maura* L. Juni, Juli.

Brünn (1) 16—6.

Budweis (2) 5—7 (3—7 — 8—7).

Gresten (1) 22—7.

Neutitschein (3) 20—7 (15—7 — 24—7).

Die regelmässige Flugzeit erst im Juli.

120. *Naenia* Stph.141. *Typica* L. Juni, Juli. (*Venosa*.)

Neutitschein (3) 18—6 (13—6 — 21—6).

121. *Dipterygia* Stph.142. *Pinastri* Mai bis Juli.

Rosenau (1) 11—6.

123. *Dichonia* Hb.

Die Schmetterlinge im August und September.

147. *Aprilina* L. Mai, September. (*Runica*.)

Bregenz 2 A = (1) 29—7.!

Brünn 2 A = (3) 16—9 (10—9 — 19—9).

Rosenau Z = (1) 7—10.

Zweite Generation mit August?

125. *Valeria* Grm.149. *Oleagina* V. März, April.

Brünn (2) 10—4 (8—4 — 12—4).

126. *Miselia* Stph.

August, September.

150. *Oxyacanthae* L.

Brünn (1) 20—8.

Neutitschein (1) 21—9.

Salzburg (1) 7—8,

Z = (2) 30—9 (29—9 — 2—10).

V. XYLINIDAE.

127. *Xylina* Tr.Die Schmetterlinge im August bis October, bisweilen überwinternd.¹153. *Socia* Hfn. (*Petrificata*, *Petrificosa*.)

Linz (1) 31—3.

Neutitschein (1) 2—5.

Salzburg 2 A = 26—8.

158. *Ornithopus* Hfn. (*Rhizolitha*.)

Neutitschein (1) 17—4.

Wien Z = (1) 23—10.

128. *Calocampa* Stph.

Die Schmetterlinge vom August bis zum Frühjahr.

160. *Exoleta* L.

Kessen 2 A = 3—9.

Rosenau (1) 23—4.

VI. CLEOPHANIDAE.

135. *Calophasia* Stph.Die Schmetterlinge im Mai und Juni; *Linariae* (in zweiter Generation?) auch im August und September.168. *Linariae* V.

Brünn (2) 15—5 (11—5 — 19—5).

Linz (1) 21—5.

¹ Also zwei Flugperioden.

VII. CUCULLIDAE.

Die Schmetterlinge erscheinen im Mai und Juni, einige in einer zweiten Generation im August.

136. *Cucullia* Schr.173. *Artemisiae* Hfn. Juni. (*Abrotani*.)

Brünn (3) 15—6 (9—6 — 20—6).

Linz (1) 27—6.

179. *Umbratica* L. Mai bis Juli. (*Lactucæ* ♀.)

Brünn (8) 20—5,

2 A = (2) 25—8 (24—8 — 26—8).

Budweis (1) 26—6.

Iglau (4) 30—6 (23—6 — 10—7).

Kessen (1) 18—4.

Linz (3) 14—5,

2 A = 7—7 (26—6 — 19—7).

Neutitschein (2) 21—5 (19—5 — 24—5).

Prag (3) 6—6 (29—5 — 20—6).

Rosenau (4) 8—6 (25—5 — 22—6).

Salzburg 2 A = (3) 17—7 (1—7 — 26—7).

Wien (4) 17—5 (28—4 — 14—6),

2 A = (4) 26—8 (10—8 — 8—9).

Erscheint bei der ersten Generation wenigstens schon im Mai; die beiden Generationen sicher zu trennen, scheint kaum möglich.

180. *Sonchi* V. (? *Lactucæ*, ? *Lucifuga*.)

Bregenz (1) 23—5.

Iglau (1) 21—6.

Linz (1) 7—7.

Trotzberg (1) 5—8.¹

In Betreff beider Generationen gilt die Bemerkung wie bei der vorigen.

183. *Lucifuga* V. Im Mai und Juni und bisweilen auch wieder im Juli und August.

Linz (1) 16—5,

2 A = (1) 13—7.

Salzburg (2) 26—4 (24—4² — 29—4),

2 A = (6) 24—7 (12—7 — 6—8),

Z = (2) 27—8 (20—8 — 3—9).

186. *Verbasci* L. April, Mai.

Linz (2) 13—5 (6—5 — 20—5).

Salzburg (3) 23—4 (14—4 — 3—5).³

¹ In den Alpen?

² 24—4. Gezogen.

³ Gezogen, einmal (1877) schon 2—2!

187. *Scrophulariæ* V. Juni.

Brünn (2) 17—6 (9—6 — 25—6).

Linz (1) 17—6.

VIII. ORTHOSIDAE.

137. *Nonagria* Tr.

Die Schmetterlinge im August bis October.

195. *Paludicola* Hb. August. (*Guttans*.)

Rosenau (1) 8—7.

Schon im Juli.

139. *Tapinostola* Ld.200. *Fluxa* Hb. Juli, August. (*Fulva*, *Extrema*, *Helmanni*.)

Linz (1) 16—7.

143. *Leucania* Tr.

Die Schmetterlinge zum Theil in doppelter Generation.

208. *Pallens* L. Juni bis October.

Bregenz 2 A = (2) 11—8 (10—8 — 12—8).

210. *Obsoleta* Hb. Juni, September.

Prag 2 A = (1) 4—9.

217. *Lithargyrea* Esp. Juni, Juli.

Salzburg (1) 23—7.

219. *Conigera* V. Juni, Juli.

Linz (1) 13—7.

Salzburg (2) 23—6 (18—6 — 29—6),

Z = (1) 14—7.

148. *Caradrina* Tr.

Die Schmetterlinge im Juni bis August.

225. *Alsines* Bk. Juni, Juli.

Prag (1) 3—6.

Salzburg (1) 11—6,

Z = (3) 16—7 (11—7 — 19—7).

226. *Taraxaci* Hb. Juni bis August. (*Blanda*.)

Salzburg (1) 24—7.¹

Wien (1) 25—7.¹

234. *Cubicularis* V. Juni bis August.

Neutitschein 2 A = (1) 28—8.

Prag (1) 22—6.

Rosenau 2 A = (1) 23—8.

Salzburg 2 A = (2) 6—8 (31—7 — 13—8).

Eine zweite Generation sehr wahrscheinlich, da fast alle Beobachtungen in den August fallen.

¹ Kaum die erste Erscheinung.

154. *Grammesia* Stph.
242. *Trigrammica* Hfn.
Linz (2) 28—5 (23—5 — 2—6).
156. *Charaeas* Stph.
244. *Graminis* L. Juli, August. (*Tricuspis*.)
Hausdorf (4) 16—6 (8—6 — 29—6).
St. Jakob (1) 12—6.
Salzburg $Z = (1) 21—8$.¹
159. *Asteroscopus* Bd.
247. *Sphinx* Hfn. October, November. (*Cassinia*.)
Neutitschein (1) 4—10,
 $Z = (1) 7—11$.
161. *Perigrapha* Ld.
249. *J. cinctum* V. Mai.
Wien (1) 26—3.
Mindestens schon im April.
162. *Taeniocampa* Gn.
Entwicklung im März und April.
250. *Gothica* L.
Gresten (2) 12—4 (8—4 — 17—4).
Salzburg (2) 4—5 (25—4 — 14—5).
252. *Cruda* V. (*Ambigua*.)
Brünn (1) 20—4.
Rosenau (1) 23—4.
257. *Incerta* Hfn. (*Instabilis*.)
Brünn (4) 16—4 (10—4 — 25—4).
Rosenau (1) 23—4.
Wien (1) 16—4.
Die Arten der Gattung erscheinen regelmässig erst im April, nicht schon im März.
163. *Arthosia* Tr.
Die Schmetterlinge im August bis October, oder überwintert im ersten Frühjahr.
264. *Rufna* L. August bis October.
Brünn (4) 12—9 (1—9 — 22—9).
268. *Litura* V. September, auch wohl überwintert im Frühjahr. (*Ornatix*.)
Salzburg (2) 25—8 (17—8 — 2—9).
166. *Hiptelia* Gn.
271. *Ochreago* Hb. Alpen, 3000' hoch. (*Rubecula*.)
Salzburg (1) 2—10,
 $Z = (1) 17—10$.

¹ 2 A?.

(Fritsch.)

167. *Mesogona* Bd.
Die Schmetterlinge im August und September.
272. *Oxalina* V.
Salzburg (1) 5—9.
170. *Cosmia* Tr.
Die Falter im Sommer.
277. *Paleacea* Esp. (*Fulvago*.)
Rosenau $Z = (1) 3—9$.
171. *Calymnia* Hb.
Flugzeit wie bei *Cosmia*.
280. *Trapezina* L.
Brünn (3) 3—7 (15—6 — 20—7).
Salzburg $Z = (1) 27—8$.
283. *Pyrulina* V. Juni bis August.
Salzburg (3) 8—7 (25—6 — 22—7).
172. *Hydroecia* Gn.
287. *Umbra* Hfn. Mai bis Juli. (*Marginata*, *Rutilago*.)
Linz (2) 26—6 (26—6 — 27—6).
Salzburg $Z = (2) 23—7$ (22—7 — 25—7).
288. *Nictitans* L. Juni, Juli. (*Chrysographa*, *Lucens*.)
Wien $Z = (1) 12—9$.
Mindestens auch noch im August.
174. *Xanthia* Tr.
Die Schmetterlinge im August bis October.
290. *Citrango* L.
Neutitschein (2) 31—8 (31—8 — 31—8).
293. *Fulvago* L. (*Cerago*.)
Rosenau (1) 3—9.
294. *Gilvago* V. (*Palleago*.)
Gresten (1) 26—9.
175. *Oporina* Bd.
Flugzeit wie bei *Xanthia* (174), doch etwas später, vom September bis ins Frühjahr.
296. *Croceago* V.
Brünn 2 A = (7) 13—9 (1—9 — 22—9).
Linz (1) 8—3.
Prag 2 A = (1) 2—9.
Salzburg 2 A = (2) 2—9 (31—8 — 5—9).
Wien 2 A = (1) 16—9.

176. *Scoliopteryx* Grm.

297. *Libatrix* L. August, September, auch überwinternd.

Agram 2A = 2—9 (28—8 — 7—9).

Biala (1) 9—3,

2A = (1) 20—8.

Bregenz 2A = (1) 2—7!

Brünn (2) 22—3 (20—3 — 24—3),

2A = (2) 3—9 (1—9 — 4—9),

Z = (3) 7—10 (1—10 — 13—10).

Freistadt (2) 3—5 (25—4 — 10—5).

Kaschau (1) 17—3.

Kessen 2A = (2) (3—9 — 26—9).

Linz (2) (26—2 — 25—3),

2A = (1) 26—9.

Melk (1) 4—3.

Neutitschein (2) 16—5 (14—5 — 19—5),

2A = (2) (5—8 — 27—9).

Oberschützen (1) 18—3.

Rosenau (1) 22—6,

2A = (2) (5—8 — 31—8).

Rottalowitz (1) 4—5,¹

2A = (1) 5—8,

Z = (5) 12—10 (29—9 — 7—11).

Salzburg (1) 19—3,²

2A = (10) 28—7 (13—7 — 22—8),

Z = (6) 5—9 (7—8 — 19—9).

Beide Flugzeiten sind kaum trennbar. Die Erscheinungen im Sommer an einigen Stationen können kaum von überwinterten Exemplaren herrühren. In Salzburg kommt die Eule am häufigsten noch im Juli vor. Es sind daher zwei Generationen sehr wahrscheinlich, die theilweise Überwinterung der zweiten unterliegt keinem Zweifel.

177. *Cerastis* Tr.

Die Schmetterlinge vom September bis zum Frühjahr.

299. *Veronicae* Hb. (*Dolosa*, *Cruda*, *Neurodes*.)

Rosenau (1) 12—4.

300. *Erythrocephala* V. (*Glabra*.)

Rosenau (1) 18—5.

301. *Vaccinii* L. (*Brigensis*, *Polita*, *Spadicea*, *Ligula*.)

Agram 2A = (3) 14—8 (7—8 — 27—8).

Rosenau (1) 5—3,

Z = (1) 2—10.

¹ In einem Keller 4—4.

² Im Wohnhause.

178. *Scopelosoma* Crt.

Flugzeit wie bei *Cerastis* (177).

303. *Satellitica* L.

Agram 2A = (3) 12—8 (7—8 — 17—8).

Linz (5) 10—3 (12—2 — 21—3).

Rosenau (1) 29—3,

2A = (2) 6—9 (4—9 — 9—9),

Wien (1) 30—3.

180. *Amphipyra* Tr.

Die Schmetterlinge im Juli und August.

307. *Tragopoginis* L.

Salzburg (3) 23—7 (20—7 — 26—7),

Z = (1) 5—9.

309. *Pyramidea* L.

Salzburg (7) 25—7 (13—7 — 5—8),

Z = (6) 21—8 (12—8 — 8—9).¹

Auch noch im September zuweilen.

IX. AGROTIDAE.

Der Schmetterling meistens im Juni bis August.

181. *Agrotis* Tr.

Juni, Juli.

311. *Fimbria* L.

Brünn (3) 16—6 (12—6 — 20—6).

Linz (1) 6—7.

Rosenau (1) 4—7,

Z = (1) 9—8.

316. *Pronuba* L. (*Innuba*.)

Bregenz Z = (1) 12—10.

Brünn (5) 12—6 (25—5 — 25—6).

Iglau (2) 27—6 (17—6 — 7—7).

Innsbruck (2) 23—6 (19—6 — 27—6).

Kremsier (4) 27—5 (20—5 — 5—6).

Linz (4) 18—6 (8—6 — 24—6),

Z = (1) 18—7.

Neutitschein (3) 19—6 (15—6 — 28—6).

Prag (1) 25—6,

Z = (1) 4—8.

Rosenau (2) 9—6 (8—6 — 11—6).

Rottalowitz (5) 27—6 (12—6 — 15—7).

Salzburg (4) 12—6 (1—6 — 22—6),

Z = (4) (4—8 — 1—10).

Wien (1) 9—6.

¹ Einmal (1871) noch 10—10.

323. *Baja* V. Juni bis August.
Brünn (2) 15—5 (15—5 — 16—5).
Salzburg $Z = (2) 16-8 (6-8 - 26-8)$.
325. *Neglecta* Hb. Juli. (*Cerasina*.)
Leutschau (1) 28—2!.
Scheint nach dieser Beobachtung zuweilen zu überwintern?
332. *Brunnea* V. Mai, Juni.
Brünn (1) 20—5.
334. *C. nigrum* L. Juni, Juli.
Bregenz 2 $A = (1) 26-8$.
Linz (1) 23—5.
Salzburg (3) (21—7 — 30—8),
 $Z = (1) 7-9$.
Wien 2 $A = (1) 25-8$.
Zwei Generationen, da die Beobachtungen von Juli bis September wegen ihrer grösseren Anzahl nicht als letzte Erscheinungen aufgefasst werden können.
335. *Rhomboidea* Esp. Juni, Juli. (*Stigmatica*.)
Salzburg (1) 17—7.¹
349. *Augur* F. Juni, Juli. (*Hippophaës*.)
Neutitschein (3) 28—6 (23—6 — 2—7).
350. *Simulans* Hfn. Juni, Juli. (*Pyrophila*.)
Linz (2) 19—6 (15—6 — 24—6).
355. *Ravida* V. Mai.
Rosenau (2) 7—6 (3—6 — 11—6).
360. *Lucipeta* V. Juli.
Rosenau $Z = (1) 25-8$.
Auch im August.
364. *Cinerea* V. Mai. (*Obscura*.)
Rosenau (2) 22—5 (15—5 — 30—5).
365. *Saucia* Hb. Juli. (*Aequa*.)
Salzburg $Z = (1) 16-11$.²
Scheint hiernach noch in den Herbstmonaten vorzukommen.
369. *Obelisca* V. Juni, Juli. (*Ruris*, *Themera*, *Fictilis*, *Sordida*, *Villiersii*.)
Rosenau (2) (13—8 — 30—9).
Scheint zwei Generationen zu haben, wenngleich die erste der beiden Beobachtungen noch als letzte Erscheinung der ersten aufgefasst werden könnte. Kommt jedenfalls auch im August und September vor.

¹ Kaum die erste Erscheinung.² Fremde Angabe.

373. *Plecta* L. Juni, September.
Bregenz (1) 7—6.
Neutitschein (1) 25—6.
Salzburg 2 $A = (2) 1-8 (23-7 - 10-8)$.¹
Wahrscheinlich auch im Juli und August.
382. *Exclamationis* L. Mai bis Juli. (*Unicolor*.)
Innsbruck (1) 29—6.
Linz (1) 30—5.
Prag (2) 2—6 (30—5 — 5—6).
Rosenau (3) 31—5 (17—5 — 10—6).
Salzburg (1) 15—6,
 $Z = (1) 24-7$.
Wien (1) 14—6.
386. *Clavis* Hfn. Mai und Juni. (*Segetum*, *Segetis*.)
Rosenau (1) 29—5,
 $Z = (1) 30-9$.
Troppau (1) 23—5.
Wahrscheinlich zwei Generationen.
389. *Suffusa* V. Juli, August.
Brünn 2 $A = (1) 4-7$.
Neutitschein 2 $A = (2) 20-8 (20-8 - 20-8)$.
Rosenau (1) 15—5,
 $Z = (1) 10-11$.
Salzburg $Z = (1) 7-9$.
Auch schon im Mai und Juni? Dann wieder noch im September und October. Zwei Generationen.

X. HELIOTHIDAE.

Die Schmetterlinge fliegen im Sonnenschein.

182. *Heliothis* Tr.*Ononis*, *Dipsacea* und *Scutosa* haben eine doppelte Generation.

394. *Scutosa* V. Mai, Juni und wieder im August und September.
Brünn (5) 13—5 (7—5 — 21—5),
2 $A = (3) 10-9 (1-9 - 15-9)$,
 $Z = (1) 20-10$.
Auch noch im October.
395. *Dipsacea* L. Mai, Juni und wieder im Juli bis September.
Brünn (2) 20—6 (16—6 — 25—6).

XI. ANARTIDAE.

186. *Anarta* Tr.*Myrtilli* hat eine doppelte Generation.¹ 2 A ? oder $Z = (1) 24-7$ der ersten Generation.

403. *Myrtilli* L. Mai und wieder im Juli und August.

Bregenz (1) 16—4,

$Z = (1) 29-8$.

Freistadt (1) 1—5.

Neutitschein $Z = (1) 29-8$.

187. *Heliaca* H. S.

Flug bei Tage. Mai, Juni.

404. *Tenebrata* Sep. (*Heliaca*, *Arbuti*.)

Brünn (10) 10—5 (7—5 — 20—5).

Freistadt (1) 1—6.

Gresten (4) 12—5 (7—5 — 19—5).

Kessen (1) 19—5.

Linz (1) 29—5.

Neutitschein (3) 19—5 (15—5 — 25—5).

Rosenau (2) 14—5 (11—5 — 17—5).

Salzburg (4) 13—5 (6—5 — 26—5).

XII. ACONTIDAE.

189. *Acontia* Tr.

Die Falter fliegen im Sonnenschein; sie haben zwei Generationen, im Mai und wieder im Juli und August.

406. *Lucida* Hfn. (*Solaris*, *Insolatrix*.)

Prag (1) 28—5.

Rosenau (3) 10—5 (2—5 — 18—5),

$Z = (1) 14-8$.

Wien (1) 21—5.

407. *Luctuosa* V.

Brünn (3) 28—4 (25—4 — 5—5).

Prag (3) 12—5 (27—4 — 25—5).

Rosenau (2) 6—5 (2—5 — 10—5).

Wien (8) 8—5 (17—4 — 5—6),

$2A = (6) 22-7 (7-7 — 6-8)$,

$Z = (5) 18-8 (10-8 — 1-9)$.

XIII. OPHIUSIDAE.

191. *Catephia* Tr.

Flug bei Nacht.

409. *Alchymista* V. Mai, Juni, bei frühzeitiger Entwicklung schon im September.

Rosenau (1) 19—5.

Salzburg $Z = (1) 16-7$.

Auch im Juli.

192. *Euclidia* Tr.

Glyphica und *Mi* in zwei Generationen. Flug bei Tage.

410. *Mi* L. Mai, Juni, August.

Brünn (5) 4—5 (20—4 — 12—5).

Freistadt (3) (3—5 — 7—6).

Gresten (4) 23—5 (16—5 — 31—5).

Innsbruck (1) 28—5.

Kaschau (1) 16—5.

Linz (1) 26—5.

Neutitschein (1) 8—5.

Rosenau (4) 19—5 (17—5 — 24—5).

Salzburg (3) (1—5 — 10—6).

Wien (1) 14—5.

411. *Glyphica* L. Mai, Juni, August.

Bregenz (2) (12—4 — 20—5).

Brünn (10) 2—5 (17—4 — 12—5),

$2A = (1) 20-7$.

Freistadt (3) (15—4 — 6—6).

Gresten (4) 3—5 (21—4 — 11—5).

Innsbruck (2) 16—4 (9—4 — 23—4).

Kaschau (2) 21—5 (13—5 — 29—5).

Kessen (2) 15—5 (12—5 — 18—5).

Kremsier (1) 16—5.

Linz (3) (24—4 — 26—5).

Neutitschein (3) 5—5 (29—4 — 8—5).

Rosenau (4) 16—5 (2—5 — 30—5),

$2A = 9-8$.

Rottalowitz (2) (1—5 — 28—5).

Salzburg (6) 27—4 (9—4 — 17—5),

$2A = (8) 17-7 (11-7 — 3-8)$,¹

$Z = (5) 20-8 (5-8 — 4-9)$.

Troppau (1) 1—5.

Wien (4) 14—5 (11—5 — 20—5),

$2A = (2) 19-7 (13-7 — 25-7)$.

Schon im April und auch im Juli.

193. *Catocala* Schr.

Juli, August.

413. *Agamos* Hb.

Brünn (5) 30—6 (21—6 — 4—7).

415. *Paranymphe* L.

Bregenz (1) 26—6.

Brünn (9) 23—6 (12—6 — 7—7).

Kaschau (1) 17—7.

Neutitschein (3) 16—7 (12—6 — 21—7).

Rosenau (4) 5—7 (24—6 — 19—7).

Rottalowitz (1) 31—7.

Zuweilen schon im Juni.

¹ Nach kontinuierlichen Beobachtungen im J. 1866 die beiden Generationen in einander übergehend.

418. *Electa* Hb.

Bregenz (2) 4—7 — 12—8).

Brünn (5) 27—7 (15—7 — 11—8),

 $Z = (1) 15-9.$

Freistadt (1) 28—7.

Prag $Z = (1) 4-9.$

Salzburg (3) 5—8 (22—7 — 19—8),

 $Z = (2) (22-8 - 23-9).$

Auch noch im September.

419. *Nupta* L. (*Concubina*.)

Agram (2) 4—8 (27—7 — 12—8).

Bregenz (2) (24—7 — 26—8).

Brünn (8) 24—7 (15—7 — 5—8),

 $Z = (1) 25-9.$

Hausdorf (1) 28—8.

Kaschau (1) 3—8.

Kessen (2) 19—8 (17—8 — 22—8).

Kremsier (1) 9—7.

Neutitschein (2) 26—7 (22—7 — 30—7),

 $Z = (2) 28-9 (19-9 - 8-10).$

Prag (1) 12—8.

Rottalowitz (1) 27—4!,

 $2A = (7) (31-7 - 7-10).$

Salzburg (1) 25—7,

 $Z = (1) 15-9.$

Senftenberg (1) 18—8.

Wien (1) 10—8,

 $Z = (1) 24-9.$

Auch noch im September. Nach der Beobachtung in Rottalowitz scheint die Eule manchmal zu überwintern.

420. *Elocata* Esp. (*Marita*, *Nurus*.)

Biala (9) 14—8 (10—7 — 15—9),

 $Z = (7) 5-10 (26-9 - 15-10).$

Brünn (5) 27—7 (15—7 — 11—8).

Kaschau (1) 21—7.

Kremsier (1) 21—7.

Rosenau (2) 12—8 (10—8 — 15—8),

 $Z = (1) 12-10.$

Rottalowitz (2) 29—7 (29—7 — 30—7).

 $Z = (1) 11-9.$

Auch noch im September.

421. *Promissa* V.

Brünn (7) 14—7 (25—6 — 26—7).

Salzburg (1) 27—7.

422. *Sponsa* L.

Brünn (7) 10—7 (15—6 — 31—7).

Cilli (1) 20—7.

Auch schon im Juni.

424. *Fraxini* L.

Brünn (4) 4—8 (1—8 — 9—8),

 $Z = (1) 22-9.$

Kaschau (1) 22—7.

Neutitschein (2) 31—8 (31—8 — 31—8).

Rosenau (2) 2—9 (23—8 — 12—9),

 $Z = (1) 31-10.$ Salzburg (1) 7—9.¹

Troppau (1) 19—7.

Wien (1) 10—8.

Auch noch im September und October.

194. *Pseudophia* Gn.425. *Lunaris* V. Juni, Juli.

Brünn (6) 6—5 (21—4 — 12—5).

Rosenau (4) 20—5 (8—5 — 31—5).

Erscheint schon im Mai.

196. *Toxocampa* Gn.

Die Schmetterlinge im Juli und August.

429. *Viciae* Hb. (*Coronillae*.)

Salzburg (1) 14—6.

Erscheint zuerst schon im Juni.

XV. PLUSIIDAE.

198. *Habrostola* Sod.

Die Schmetterlinge im Juni bis August in nur einer Generation.

432. *Urticae* Hb. Juni. (*Triplasia*.)

Salzburg (2) 9—7 (9—7 — 10—7).

433. *Asclepiadis* V.

Brünn (1) 15—7.

Linz (1) 15—7.

434. *Triplasia* L. Mai bis August. (*Asclepiadis*.)

Brünn (5) 24—4 (20—4 — 29—4).

Neutitschein (1) 8—8.

Salzburg (4) 10—6 (1—6 — 16—6),

 $Z = (8) 5-9 (16-8 - 30-9).$

Auch noch im September. Ob nicht zwei Generationen?

201. *Plusia* Tr.

Die Schmetterlinge im Sommer, oft auch im Sonnenschein fliegend.

¹ Kaum die erste Erscheinung.

437. *Illustris* F. Juli.

Kessen (1) 30—6.

Salzburg (1) 13—6.¹444. *Gamma* L. Mai bis September.Admont $Z = (2) 5-9 (4-9-6-9)$.

Agram (3) 29—5 (22—5 — 7—6).

Bärn (1) 25—6,

 $2A = (1) 17-8$.Biala (8) 26—5 (10—5 — 8—6),² $2A = (5) 25-7 (10-7-10-8)$, $Z = (9) 13-10 (30-9-8-11)$.

Bregenz (2) 11—6 (6—6 — 16—6),

 $Z = (1) 10-10$.

Brünn (10) 7—5 (20—4 — 22—5),

 $2A = (8) 24-7 (12-7-3-8)$, $Z = (9) 31-10 (10-10-12-11)$.Budweis $2A = (1) 22-7$.

Cilli (1) 1—5.

St. Florian (1) 4—4.

Freistadt (1) 5—6.

Gresten (3) 28—5 (25—5 — 4—6),

 $2A = (2) 30-7 (23-7-6-8)$.

Hausdorf (1) 25—6.

Igló (1) 12—6,

 $Z = (1) 9-10$.

Innsbruck (1) 6—6,

 $2A = (1) 1-8$.

Kaschau (3) 2—6 (22—5 — 13—6).

Kesmark (2) (3—5 — 4—6).

Kessen (1) 9—6.

Kremsier (3) 21—5 (14—5 — 26—5).

Leutschau (1) 9—5.

Linz (5) 17—5 (3—5 — 1—6),

 $Z = (1) 7-11$.

Neusohl (1) 18—4.

Neutitschein (3) 15—5 (9—5 — 21—5),

 $2A = (2) 3-8$, $Z = (2) 6-10 (30-9-12-10)$.

Prag (6) 11—6 (28—5 — 10—7),

 $Z = (2) 5-10 (3-10-7-10)$.

Rosenau (5) 6—6 (12—5 — 9—7),

 $Z = (4) 27-10 (2-10-26-11)$.

Rottalowitz (17) (14—5 — 24—10).

Salzburg (5) 20—6 (7—6 — 26—6),¹ $2A = (9) 23-7 (11-7-11-8)$,² $Z = (4) 25-10 (23-10-29-10)$.

Taufers (1) 31—5 (28—5 — 4—6).

Troppau (2) 31—5 (23—5 — 8—6).

Wien (5) 29—5 (15—5 — 24—6),

 $2A = (4) 22-7 (3-7-8-8)$. $Z = (4) 19-10 (13-10-22-10)$.

Erscheint auch schon im April und noch im October und November, scheint auch zuweilen zu überwintern (s. Biala). Zwei Generationen sehr wahrscheinlich, wenn nicht zuweilen drei (s. Salzburg), die Zeiten derselben aber nicht sicher zu trennen, weil in einander übergehend. Näheres hierüber im Abschnitte über jährliche Frequenz.

445. *Jota* L. Juni, August.

Rosenau (1) 14—7.

447. *Interrogationis* L. Juli.

Salzburg (5) 13—7 (6—7 — 23—7),

 $Z = (4) 4-8 (17-7-20-8)$.

Auch noch im August.

449. *Circumflexa* L.

Linz (1) 13—7.

Rosenau (1) 8—7.

451. *Festuca* L. Juli, August.Salzburg $Z = (1) 6-9$.452. *Bractea* V. Juli, August.

Neutitschein (2) (19—5 — 17—6).

Erscheint zuerst wenigstens schon im Juni.

455. *Chrysitis* L. Mai bis September. Zwei Generationen.

Bregenz (2) 17—6 (11—6 — 23—6).

Brünn (4) 13—6 (30—5 — 25—6).

Gresten $2A = (1) 6-8$.

Kesmark (1) 9—6.

Kessen (1) 14—6.

Linz (3) 15—6 (9—6 — 18—6).

Neutitschein $2A = (3) 30-7 (26-7-4-8)$, $Z = (1) 7-9$.

Rosenau (1) 6—6.

Rottalowitz $2A = (2) 25-7 (22-7-29-7)$.

Salzburg (3) 4—6 (1—6 — 5—6),

 $2A = (6) 3-8 (21-7-17-8)$, $Z = (7) 3-9 (17-8-19-9)$.¹ Gezogen.² Einmal schon 27—3.¹ Einmal (1874) schon 20—4.² 1871 eine dritte Generation beobachtet.

Erscheint im Mai noch nicht. Die Generationen nicht scharf geschieden.

456. *Moneta* F. Juni, Juli.

Linz (1) 8—7.

Salzburg (2) 17—7 (17—7 — 18—7).

XVI. NOCTUOPHALAENIDAE.

202. *Erastria* Tr.

463. *Deceptoria* Sep. Mai, Juni. (*Atrātula*.)

Prag (1) 11—5.

Rosenau (2) (27—5 — 29—6).

464. *Pyragra* Hfn. Mai bis Juli. (*Fuscula*.)

Salzburg (1) 25—6.

203. *Photodes* Ld.

465. *Captiuncula* Tr. Alpen. August.

Salzburg (3) 23—7 (12—7 — 6—8).

Auch im Juli.

205. *Emmelia* Hb.

Flug bei Tage.

467. *Sulphuralis* L. Mai bis Juli. (*Sulphurea*.)

Brünn (4) 29—5 (20—5 — 6—6),

2 A = (1) 1—7.

Rosenau (1) 22—5.

Wien (4) 20—5 (10—5 — 5—6),

2 A = (3) 22—7 (20—7 — 28—7),

Z = (5) 21—8 (13—8 — 25—8).

Wahrscheinlich zwei Generationen.

207. *Prothymia* Hb.

Flug bei Tage. Zwei Generationen.

477. *Laccata* Sep. Mai, Juni, August. (*Aenea*.)

Gresten (1) 25—4,

2 A = (1) 29—7.

Salzburg (2) (25—4 — 30—5),

2 A = 24—7 (21—7 — 28—7),

Z = (1) 1—9.

208. *Halias* Tr.

478. *Prassinana* L. April bis Juni.

Salzburg (1) 18—6.

209. *Chlocophora* Stph.

479. *Bicolorana* Fsl. Juni, Juli. (*Quercana*.)

Bregenz (1) 10—6.

Brünn (6) 17—6 (5—6 — 25—6).

Rosenau (1) 8—7.

210. *Erarias* Hb.

Zwei Generationen.

480. *Vernana* F. Mai und August.

Prag (1) 2—5.

Wien (1) 30—4.

XVII. DELTOIDAE.

Flug bei Nacht.

213. *Sophronia* Gn.

484. *Emortualis* V. Mai, Juni.

Brünn (1) 4—6.

215. *Zanclognatha* Ld.

Die Schmetterlinge fliegen im Juni und Juli.

487. *Tarsicrinalis* Kn.

Rosenau (1) 28—6.

Salzburg (1) 26—6.

216. *Madopa* Stph.

492. *Salicalis* V.

Neutitschein (1) 12—6.

Rosenau (1) 18—7.

217. *Herminia* Tr.

495. *Barbalis* L. Mai, Juni. (*Pectitalis*.)

Neutitschein (1) 8—6 (4—6 — 12—6).

Rosenau (2) 13—7 (9—7 — 18—7),

Z = (1) 2—9.

496. *Tentacularis* L. Juni, Juli.

Rosenau (2) 23—5 (22—5 — 24—5).

Salzburg (2) 18—6 (11—6 — 25—6),

Z = (1) 3—8.

497. *Derivalis* Hb. Juni, Juli.

Rosenau (1) 9—7.

219. *Hypena* Tr.

499. *Rostralis* L. März bis Mai, August bis October; auch überwintend. (*Radiatalis*.)

Linz (2) (11—2 — 6—4).

Neutitschein 2 A = 25—8 (22—8 — 28—8).

Salzburg (1) 28—4,

2 A = (5) 17—8 (2—8 — 30—8),

Z = (1) 8—10.

500. *Obesalis* Tr. August. (*Crassalis*.)

Salzburg (1) 28—7.

501. *Proboscidalis* L. Mai bis Juli und wieder im August und September.

Neutitschein 2 A = (2) 20—7 (20—7 — 21—7).

Salzburg 2 A = (1) 17—7.

E. Geometrae.

XIX. GEOMETRINA.

I. DENDROMETRIDAE.

224. *Metrocampa* Latr.

- 1.
- Margaritaria*
- L. Juni, Juli.

Rosenau (1) 17—7.

Salzburg (1) 21—6.

- 2.
- Fasciaria*
- L. Juli, August, einzeln noch im October.
-
- (
- Prasinaria*
- .)

Linz (1) 26—6.

225. *Ellopi* Tr.

- 3.
- Honoraria*
- H. April.

Brünn (3) 25—5 (16—5 — 31—5).

Erscheint erst im Mai.

228. *Crocallis* Tr.

- 6.
- Elinguaria*
- L. Juli.

Linz (1) 15—7.

229. *Eugonia* Hb.

Die Falter im Juli bis October.

- 7.
- Alniaria*
- L. Juli bis October.

Brünn (1) 5—8.

Neutitschein (3) 15—8 (13—8 — 19—8).

Salzburg (2) 28—8 (20—8 — 5—9).

Wien *Z* = (1) 11—10.

Erscheint erst im August.

- 9.
- Angularia*
- V. Juli, August. (
- Carpiniaria*
- .)

Linz (1) 4—7.

Wien *Z* = (1) 23—8.

- 10.
- Quercinaria*
- Hfn. Juli bis September. (
- Erosaria*
- .)

Salzburg (1) 2—8.

230. *Pericallia* Stph.

- 12.
- Syringaria*
- L. Zwei Generationen; im Mai und Juni, und im Juli und August.

Bregenz (1) 24—5.

Innsbruck (1) 19—6.

Linz (1) 3—7.

231. *Selenia* Hb.

Zwei Generationen, im April und Mai, Juli und August.

- 13.
- Tetralunaria*
- Hfn. (
- Illustraria*
- .)

Brünn (2) 5—5 (27—4 — 13—5).

Budweis (1) 2—5.

Neutitschein (3) 25—4 (22—4 — 29—4).

Salzburg (2) (25—3¹ — 20—5),2*A* = (1) 5—7.

- 14.
- Lunaria*
- V. (
- Delunaria*
- .)

Brünn (1) 16—5.

Rosenau (3) (25—4 — 24—5),

2*A* = (1) 6—7.

Wien (1) 10—5.

- 15.
- Illunaria*
- V.

Brünn (2) 19—4 (17—4 — 22—4).

Freistadt (1) 30—5.

Linz (1) 24—4,

2*A* = (1) 17—7.232. *Theraspis* Hb.

- 16.
- Evonymaria*
- V. Juli.

Gresten (1) 28—7.

233. *Plagodis* Hb.

- 17.
- Dolabraria*
- L. Mai, Juni, und wieder im Juli.

Brünn (3) 19—5 (16—5 — 25—5).

Rosenau (1) 17—5.

234. *Epione* Dup.

- 18.
- Advenaria*
- Bk. Mai, Juni.

Brünn (4) 12—5 (9—5 — 15—5).

Neutitschein (1) 28—5.

Rosenau (1) 8—6.

- 19.
- Vespertaria*
- L. Juli, August. (
- Parallelaria*
- .)

Brünn (3) 21—6 (16—6 — 25—6).

Neutitschein (3) 4—7 (29—6 — 10—7),

2*A* = (1) 2—10.

Zuweilen in zwei Generationen? oder erstreckt sich doch wenigstens die erste noch über den September.

235. *Macaria* Crt.

Zwei Generationen, im Mai und Juni, und wieder im Juli bis August.

- 21.
- Notata*
- L.

Salzburg (1) 23—5.

- 22.
- Alternata*
- V.

Brünn (2) 26—4 (22—4 — 30—4).

Rosenau (1) 28—4.

- 23.
- Signaria*
- Hb.

Brünn (4) 5—6 (24—5 — 20—6).

Neutitschein (1) 22—6.

¹ Gezogen.

24. *Liturata* L.

Rosenau 2 A = (1) 8—7.

Die drei Arten dieser Gattung dürften verschiedene Erscheinungszeiten haben, jedenfalls *Alternata* beträchtlich früher als *Signaria* erscheinen.

236. *Uropterix* Lch.26. *Sambucaria* L. Juni, Juli.

Brünn (2) 18—6 (16—6 — 20—6).

Freistadt (1) 1—7.

Linz (1) 10—7.

Neutitschein (2) 13—7 (11—7 — 16—7).

Rosenau (1) 11—7.

237. *Opisthograptis* Hb.27. *Crataegata* L. Mai, Juni.

Brünn (6) 18—5 (9—5 — 26—5).

Freistadt (2) 26—5 (21—5 — 1—6).

Gresten (2) 1—6 (29—5 — 4—6).

Kirchdorf (1) 25—5.

Linz (2) 18—5 (16—5 — 20—5).

Neutitschein (3) 8—6 (3—6 — 12—6).

Rosenau (3) 14—5 (9—5 — 30—5).

Salzburg (2) 2—6 (31—5 — 4—6),

Z = (1) 26—6.

Wien (1) 10—5.

238. *Venilia* Dp.28. *Macularia* L. Mai, Juni.

Brünn (8) 12—5 (5—5 — 25—5).

Hausdorf (6) 26—5 (20—5 — 3—6).

St. Jakob (2) 23—5 (14—5 — 2—6).

Kaschau (1) 20—5.

Linz (4) 21—5 (13—5 — 26—5).

Neutitschein (3) 7—6 (4—6 — 11—6).

Rosenau (5) 7—5 (29—4 — 10—5).

Salzburg (4) 5—5 (22—4 — 19—5),

Z = (7) 5—6 (19—5 — 21—6).

Wien (4) 9—5 (19—4 — 24—5).

239. *Angerona* Dp.29. *Prunaria* L. Juni, Juli.

Brünn (4) 11—6 (7—6 — 15—6).

Freistadt (1) 22—6.

Innsbruck (2) 11—6 (5—6 — 17—6).

Kremsier (1) 14—6.

Linz (3) 19—6 (15—6 — 27—6).

Neutitschein (2) 24—6 (20—6 — 29—6).

(Fritsch.)

Rosenau (3) 13—6 (7—6 — 20—6),

Z = (2) 10—7 (6—7 — 14—7).

Salzburg (7) 10—6 (31—5 — 21—6),

Z = (3) 5—7 (24—6 — 24—7),

2 A = (1) 19—10.

Troppau (1) 20—6.

Wien 2 A = (1) 27—9,¹

Z = (1) 26—11.

Kommt zuweilen in zwei Generationen vor.

240. *Scoria* Stph.30. *Dealbata* L. Mai, Juni.

Brünn (2) 31—5 (26—5 — 7—6).

Freistadt (4) 19—6 (8—6 — 30—6).

Neutitschein (2) 1—6 (29—5 — 5—6).

Rosenau Z = (1) 14—7.

Salzburg (10) 4—6 (25—5 — 12—6),

Z = (5) 7—7 (20—6 — 28—7).

Wien (4) 31—5 (21—5 — 8—6).

Auch noch im Juli.

241. *Cleogene* Dp.

Die Arten auf den Alpen im Juni und Juli.

31. *Lutearia* F. (*Tinctaria*.)

Neutitschein (1) 28—6.

242. *Hypoplectis* Hb.33. *Jacobaearia* Bk. Mai, Juni. (*Adspersaria*.)

Rosenau (1) 18—5.

246. *Phasiane* Dp.37. *Petraria* Esp. Mai, Juni.

Salzburg (1) 20—5.

247. *Aspilates* Tr.38. *Gilvaria* V. Juli, August.

Brünn (4) 11—7 (6—7 — 17—7).

248. *Numeria* Bd.39. *Pulveraria* L. Mai, Juni.

Rosenau (1) 14—5.

250. *Terpnomicta* Ld.43. *Dilectaria* Bk. Juni.

Wien (1) 17—5,

Z = (1) 14—7.

¹ Einmal auch 17—7.

251. *Abraxas* Lch.45. *Grossulariata* L. Juli, August.

Agram (1) 28—3!

 $2A = (2) 17-6 (12-6 - 22-6).$

Bärn (2) 27—7 (27—7 — 28—7).

Bregenz (2) 6—7 (19—6 — 2—7).

Brünn (9) 21—6 (12—6 — 27—6).

Budweis (1) 14—7.

Gresten (1) 5—7 (30—6 — 11—7).

Igla (4) 14—7 (8—7 — 25—7).

Kaschau (2) 30—6 (22—6 — 8—7).

Kirchdorf (1) 5—6.

Kremsier (3) 21—6 (20—6 — 23—6).

Kremsmünster (1) 10—7.

Linz (2) 27—6 (19—6 — 6—7).

Neutitschein (1) 11—7.

Prag (2) 16—7 (10—7 — 23—7).

Rosenau (6) 22—6 (14—6 — 14—7).

Troppau (2) 15—7 (8—7 — 23—7).

Wien (5) 13—7 (1—7 — 24—7),

 $Z = (2) 29-7 (28-7 - 30-7).$

Wilten (1) 6—6.

Scheint höchst selten (Agram) in zwei Generationen vorzukommen oder zu überwintern. Erscheint übrigens gewöhnlich schon im Juni.

46. *Ulmia* F. Juli.

Linz (1) 14—6.

Salzburg (2) 12—6 (6—6 — 18—6).

Auch schon im Juni.

47. *Marginata* L. Mai bis Juni. (*Pollutaria*, *Naevaria*.)

Linz (1) 13—5.

Neutitschein (1) 15—5,

 $2A = (1) 1-8.$

Rosenau (2) (18—5 — 11—6).

Salzburg (3) (15—3 — 21—6),

 $2A = 25-7.$

Wien (2) 4—5 (30—4 — 8—5),

 $2A = (1) 29-7.$

Zwei Generationen wahrscheinlich, oder zieht sich doch wenigstens die erste über den Juli hinaus.

254. *Amphidasis* Tr.

Die Falter erscheinen im März und April, *Betularia* erst im Mai.

55. *Zonaria* V.

Linz (1) 29—3.

56. *Alpinaria* Ser.

Innsbruck (2) (16—5 — 12—6).

Hier erst zu Anfang des Sommers, wahrscheinlich auf Alpen.

57. *Vertumnaria* Lef. (*Pomonaria*.)

Troppau (1) 19—2.

59. *Pilosaria* V.

Linz (3) (29—1 — 4—3).

60. *Hirtaria* L. (*Congeneraria*.)

Brünn (9) 27—3 (17—3 — 2—4).

Freistadt (1) 31—3.

Kaschau (1) 28—3.

Linz (1) 15—3.

Neutitschein (4) 6—4 (19—3 — 18—4).

Prag (2) (28—2 — 3—4).

Rosenau (3) 15—4 (11—4 — 23—4).

Wien (1) 24—3.

Zuweilen schon im Februar.

61. *Strataria* Hfn. (*Prodromaria*.)

Brünn (1) 16—4.

Innsbruck (1) 31—3.

Rosenau (2) 26—2 (18—2 — 7—3).

Salzburg (1) 13—4.

62. *Betularia* L.

Bregenz (2) 2—6 (28—5 — 8—6).

Brünn (7) 9—6 (5—6 — 15—6).

Hausdorf (1) 1—6.

St. Jakob (1) 22—6.

Innsbruck (1) 1—6.

Kremsier (3) 12—6 (1—6 — 25—6).

Linz $Z = (1) 16-7.$

Neutitschein (3) 20—6 (10—6 — 21—6).

Prag (1) 28—6,

 $Z = (1) 27-7.$ Rosenau $Z = (1) 20-7.$

Senftenberg (1) 17—5,

Wien (1) 21—5,

 $Z = (1) 13-7.$

Das nicht seltene Vorkommen im Juli lässt eine zweite Generation vermuthen; in der ersten erscheint der Spanner freilich gewöhnlich erst im Juni, daher habe ich das Vorkommen im Juli mit Z bezeichnet.

256. *Hibernia* Ltr.

Die Schmetterlinge im Herbst, einige im Frühjahr.

64. *Defoliaria* L. September bis November, auch überwintert im Frühjahr.

Brünn (6) 13—10 (5—10 — 20—10).

Freistadt $Z = (1) 12-3$.

Lemberg (1) 19—10.

66. *Progemmaria* Hb. October bis April.

Linz $Z = (1) 21-3$.

Salzburg $Z = (1) 8-4$.

Wien $Z = (1) 16-3$.

67. *Rupicapraria* V. März, April, ob auch im Herbste?

Kaschau (1) 22—3.

68. *Leucophaearia* V. Februar bis April; ob auch im Herbste? (*Nigricaria*, *Sordidaria*.)

Gresten $Z = (1) 24-3$.

Salzburg $Z = (1) 7-4$,

(1) 23—11.

Wien $Z = (1) 28-3$.

Auch schon im Herbste zuweilen.

69. *Bajaria* V.

Brünn (5) 13—10 (5—10 — 25—10).

257. *Cabera* Tr.

Die Schmetterlinge im Mai bis August; ob in zwei Generationen?

70. *Pusaria* L. (*Heyeraria*.)

Brünn (8) 15—5 (9—5 — 21—5).

Kessen (1) 10—5.

Linz (4) 20—5 (10—5 — 29—5).

Neutitschein (2) 22—5 (20—5 — 24—5),

$2A = (2) 10-7 (6-7 — 15-7)$.

Rosenau (4) 22—5 (8—5 — 7—6).

Salzburg (2) 14—5 (6—5 — 23—5),

$2A = 28-7 (20-7 — 2-8)$,

$Z = (2) 11-8 (2-8 — 21-8)$.

Wien (3) 12—5 (30—4 — 25—5),

$2A = (1) 19-7$,

$Z = (1) 11-8$.

Sehr wahrscheinlich in zwei Generationen.

71. *Exanthemaria* Scp. (*Striaria*.)

Salzburg (6) 7—6 (14—5 — 23—6).

Wien (1) 28—5.

Nach den hier nicht angeführten Beobachtungen bei Salzburg wahrscheinlich in zwei Generationen.

258. *Perconia* Hb.

72. *Strigillaria* Hb. Mai, Juni. (*Respersaria*.)

Bregenz (1) 12—4.

Rosenau (1) 8—6.

Auch schon im April.

259. *Bapta* Stph.

Die Schmetterlinge im Mai und Juni, *Temerata* auch im Juli in zweiter Generation.

73. *Bimaculata* V. (*Taminata*.)

Rosenau (2) (19—5 — 28—6).

74. *Temerata* V.

Salzburg (2) 11—5 (4—5 — 19—5).

261. *Fidonia* Tr.

Die Arten haben zum Theil eine doppelte Generation.

76. *Arenacearia* Hb. Mai, Juni.

Salzburg (1) 28—4.

77. *Murinaria* Vill. Mai und Juni.

Rosenau (3) 25—5 (15—5 — 14—6).

Wien (2) (11—5 — 1—6).

78. *Wawaria* L. Juni, Juli.

Brünn (2) (5—6 — 25—6).

Neutitschein (2) 15—6 (10—6 — 20—6),

$Z = (1) 18-8$.

Rosenau (2) 7—7 (5—7 — 10—7).

Salzburg (2) 21—6 (20—6 — 22—6).

79. *Roraria* Esp. Mai, Juni. (*Spartaria*.)

Rosenau (2) 4—7 (29—6 — 10—7).

81. *Brunneata* Thnb. Juni, Juli. (*Pinetaria*, *Quinquaria*.)

Bregenz (1) 16—4.

Brünn (3) 7—5 (5—5 — 9—5).

Freistadt (1) 11—5.

Iglau (1) 21—6.

Innsbruck (1) 13—6.

Linz (1) 26—5.

Prag (1) 8—6.

Rosenau (1) 12—5,

$2A = 11-7 (9-7 — 14-7)$.

Erscheint schon im Mai.

84. *Atomaria* L. April, Mai, Juli, August.

Brünn (10) 20—4 (12—4 — 29—4),

$2A = (7) 5-7 (27-6 — 10-7)$.

Freistadt (3) (23—4 — 7—6).

- Gresten (3) 18—4 (12—4 — 28—4).
 Innsbruck (1) 11—5.
 Kaschau (1) 15—5.
 Kremsier (3) 8—5 (19—4 — 24—5).
 Linz (4) 20—4 (11—4 — 30—4),
 $2A = (2) 19-7 (14-7 - 24-7)$.
 Neutitschein (2) 22—5 (20—5 — 24—5),
 $2A = (1) 26-7$,
 $3A = (1) 29-9$,
 $Z = (2) 17-10 (11-10 - 23-10)$.
 Rosenau (1) 1—3!,
 (4) 1—5 (21—4 — 8—5),
 $2A = (2) 15-7 (13-7 - 18-7)$,
 $Z = (1) 10-8$.
 Rottalowitz (3) 27—5 (18—5 — 5—6).
 Salzburg (7) 18—4 (30—3 — 1—5),
 $2A = (9) 13-7 (30-6 - 1-8)$,
 $Z = (3) 1-8 (27-7 - 5-8)$.
 Troppan (1) 17—5.
 Wien (4) 2—5 (21—4 — 11—5),
 $2A = (2) 8-7 (7-7 - 10-7)$,
 $Z = (1) 3-9$.¹

Erscheint sehr selten schon im März und kommt nach den Beobachtungen in Neutitschein zuweilen in drei Generationen vor.

87. *Clathrata* L. April, Mai, Juli. (*Cancellaria*.)
 Brünn (7) 23—4 (12—4 — 9—5),
 $2A = 6-7 (1-7 - 12-7)$.
 Budweis (1) 1—5.
 Freistadt (5) 17—5 (1—5 — 28—5).
 Gresten (4) 4—5 (19—4 — 21—5).
 Kaschau (2) 17—5 (13—5 — 22—5).
 Kremsier (2) (19—4 — 12—5).
 Linz (4) 3—5 (20—4 — 12—5),
 $2A = (2) 12-7 (4-7 - 20-7)$.
 Neutitschein (3) 12—5 (30—4 — 21—5),
 $2A = (1) 16-7$,
 $Z = (1) 5-9$.
 Prag (4) 11—5 (27—4 — 25—5).
 Rosenau (5) 11—5 (26—4 — 30—5),
 $2A = (2) 2-7 (1-7 - 3-7)$.
 Rottalowitz (1) 18—5.
 Salzburg (4) 23—4 (13—4 — 1—5),
 $2A = (12) 12-7 (30-6 - 31-7)$,

¹ 3A?

- $3A = (4) 20-8 (11-8 - 23-8)$,¹
 $Z = (10) 11-8 (25-7 - 25-8)$.²
 Wien (6) 14—5 (28—4 — 24—5),
 $2A = 17-7 (10-7 - 25-7)$,
 $Z = (2) 6-8 (30-7 - 13-8)$.
 Erscheint auch im Juni (nach hier nicht angeführten Beobachtungen in Salzburg) und noch im August. In manchen Jahren eine dritte Generation.
 88. *Clarearia* V. April, Mai, Juli,
 Kaschau (1) 15—5.
 Wien (2) 22—5 (21—5 — 24—5),
 $2A = (1) 30-7$.
 89. *Punctulata* V. Mai, Juni.
 Brünn (1) 15—5.
 Rosenau (2) 8—5 (29—4 — 18—5).
 Wien (1) 18—4.
 90. *Adustata* V. Mai, Juni und August.
 Brünn (7) 1—5 (17—4 — 22—5).
 Linz (2) 1—6 (30—5 — 3—6).
 Neutitschein (2) (8—5 — 20—6).
 Prag (1) 11—5.
 Salzburg (2) (20—4 — 12—6),
 $2A = (1) 17-7$,
 $Z = (2) 15-8 (5-8 - 25-8)$.
 Wien (4) 22—5 (8—5 — 8—6),
 $2A = (3) 30-7 (26-7 - 1-8)$.
 262. *Gnophos* Tr.
 Juni, Juli.
 92. *Furvata* V.
 Neutitschein (2) 20—6 (12—6 — 28—6).
 93. *Obscurata* V. Juni.
 Rosenau (1) 18—7.
 94. *Glaucinata* Hb. Juli, August.
 Salzburg (1) 11—8.
 96. *Pullata* V.
 Salzburg (5) 27—7 (16—7 — 1—8).
 98. *Dilucitaria* V. Juli.
 Rosenau (1) 22—7.
 265. *Boarmia* Tr.
 Mehrere Arten haben zwei Generationen.

¹ Nach längerer Pause wieder erschienen.

² Nach den absolut letzten Erscheinungen (Beob.) in den einzelnen Jahren.

109. *Lichenaria* Hfn. Juni, Juli.
Brünn (2) 2—7 (1—7 — 3—7).
Salzburg $Z = (1)$ 23—7.
110. *Plumaria* V. Juli, August. (*Penulataria*.)
Brünn (4) 5—7 (1—7 — 10—7).
Wien $Z = (1)$ 25—8.
112. *Glabraria* V. Juli. (*Teneraria*.)
Salzburg (1) 23—7,
 $Z = (1)$ 25—9.
Auch im August und September. Einmal am 27—8 beobachtet.
113. *Cinctaria* V. Mai und Juli.
Brünn (4) 19—4 (15—4 — 22—4).
Hausdorf (2) 7—5 (5—5 — 10—5).
St. Jakob (2) 8—4 (7—4 — 9—4).
Neutitschein (3) 20—4 (18—4 — 24—4).
Prag $2A = (1)$ 25—6.
Rosenau (1) 29—4.
Wien (1) 22—4.
Erscheint zuerst schon im April.
114. *Repandata* L. Juni, Juli, (*Conversaria*.)
Brünn (7) 5—6 (16—5 — 12—6),
 $Z = (1)$ 10—8.
Neutitschein (3) 17—6 (11—6 — 22—6).
Rosenau (2) 8—5 (29—4 — 18—5),
 $Z = (1)$ 11—8.
Salzburg¹ (2) 13—7 (4—7 — 23—7),
 $Z = (2)$ (6—8 — 12—9).
Auch noch im August.
115. *Abietaria* V. April, Juni.
Hausdorf $2A = (1)$ 10—6.
Salzburg $2A = (1)$ 8—6.
118. *Rhomboidaria* V. Juli, August, nach H. S. im Juni und September.
Linz (1) 5—4!.
Rosenau (2) 11—6 (10—6 — 12—6),
 $Z = (1)$ 8—9.²
Salzburg $2A = (1)$ 1—8.
Vielleicht zuweilen überwintend (Linz). Zwei Generationen.
119. *Roboraria* V. Juni, nach H. S. im April und Juli. (*Consobrinaria*.)
Brünn (2) 13—5 (12—5 — 14—5).
Linz (1) 13—5.
Salzburg (1) 28—5,
 $2A = (1)$ 22—7.
Zwei Generationen, die erste im Mai.
120. *Consortaria* F. April bis Juni, und wieder im Juli und August.
Brünn (2) 23—4 (20—4 — 27—4),
 $2A = (1)$ 6—7.
Salzburg (1) 3—5.¹
121. *Crepuscularia* V. April, Mai, Juli.
Brünn (5) 7—4 (31—3 — 15—4),
 $2A = (5)$ 2—7 (23—6 — 14—7).
Kaschau (1) 17—4,
 $2A = (1)$ 12—7.
Neutitschein (4) 9—4 (28—3 — 21—4),
 $2A = (3)$ 4—7 (29—6 — 7—7),
 $Z = (1)$ 27—9.
Prag (5) 11—4 (6—4 — 19—4),
 $2A = (1)$ 25—6.
Rosenau (2) 21—4 (15—4 — 27—4),
 $2A = (2)$ 4—7 (1—7 — 9—7).
Salzburg (3) 7—4 (2—4 — 15—4),
 $2A = (5)$ 6—7 (25—6¹ — 25—7).
Wien (6) 15—4 (3—4 — 5—5),
 $2A = (3)$ 9—7 (25—6 — 21—7),
 $Z = (3)$ 6—9 (25—8 — 20—9).
Auch noch im August und selbst September, vielleicht in diesem Monate zuweilen eine dritte Generation beginnend.
267. *Parascotia* Hb.
127. *Fuliginaria* L. Juni, Juli. (*Carbonaria*.)
Brünn (2) 20—6 (16—6 — 25—6).
Salzburg (5) 6—7 (2—6 — 21—7),
 $Z = (3)$ (28—7 — 2—9).
Auch noch im August.
268. *Pseudoterpna* Hb.
128. *Pruinata* Hfn. Juni bis August. (*Cythisaria*.)
Brünn (3) 21—5 (16—5 — 27—5).
Linz (1) 22—6.
Prag (1) 9—5.
Rosenau (1) 12—7.
Wien (1) 24—5.
¹ Gezogen.

¹ Mit *B. Abietaria*.² $2A$?

269. *Geometra* L.129. *Papilionaria* L. Juni, Juli.

Innsbruck (1) 17—6.

Rosenau (1) 19—7.

130. *Putataria* L. Mai, Juni.

Salzburg (2) 1—6 (26—5 — 8—6).

131. *Aeruginaria* V. Etwas später als *Putataria*, im Juni.

Brünn (1) 15—5.

Schon im Mai.

270. *Thalera* Hb.135. *Thymiaria* L. Juli, August.

Rosenau (1) 14—7.

271. *Nemoria* Hb.136. *Fimbriata* Hfn. Juni, Juli. (*Aestivaria*.)

Brünn (3) 22—6 (16—6 — 1—7).

Prag $Z = (1) 25—7$.

Rosenau (2) 4—7 (1—7 — 8—7).

Salzburg (1) 12—7.

Wien (2) (12—6 — 10—7).

137. *Viridata* L. Mai, Juni.

Gresten (3) 15—5 (8—5 — 28—5).

Rosenau (1) 11—6.

138. *Porrinata* Zll. Mai, Juni. (*Viridata*.)

Salzburg (5) 30—4 (20—4 — 19—5),

 $Z = (4) 28—7 (16—7 — 11—8)$.

Auch im Juli, und zwei Generationen nicht unwahrscheinlich.

273. *Timandra* Dup.140. *Amataria* L. Mai, Juni.

Brünn (7) 1—5 (20—4 — 9—5),

 $2A = 29—6 (25—6 — 4—7)$.

Freistadt (1) 5—6,

 $2A = (1) 11—7$.

Kaschau (2) 30—6 (27—6 — 3—7).

Linz (2) 26—5 (18—5 — 3—6),

 $2A = (2) 10—7 (4—7 — 17—7)$.

Rosenau (1) 11—5,

 $2A = (1) 22—7$, $Z = (1) 8—10$.Salzburg $2A = (5) 21—7 (13—7 — 25—7)$, $Z = (6) 18—8 (1—8 — 8—9)$.

Wien (1) 22—5.

Zwei Generationen, und daher auch noch im Juli bis September.

274. *Pellonia* Dup.141. *Vibicaria* L. Mai, Juli.

Bregenz (1) 12—4.

Brünn (2) 12—5 (9—5 — 15—5),

 $2A = (3) 23—6 (15—6 — 6—7)$.Kaschau $2A = (1) 22—6$.Kremsier $2A = (1) 21—6$.Neutitschein $2A = (1) 23—6$.Rosenau $2A = (3) 2—7 (19—6 — 15—7)$.Wien $2A = (4—6 — 1—7)$, $Z = (1) 7—9$.

Die erste Generation beginnt im April, die zweite im Juni und dauert auch noch im August. In der ersten kommt der Spanner selten vor.

275. *Zonosoma* Ld.

Meist zwei Generationen, im Mai und im Sommer.

142. *Punctaria* L. Mai, August.

Brünn (7) 28—4 (8—4 — 9—5),

 $2A = (1) 15—7$.

Linz (1) 29—4.

Rosenau (2) 8—5 (29—4 — 17—5).

Die erste Generation beginnt im April, die zweite im Juli.

143. *Trilinearia* Zll. Mai, August. (*Linearia*.)

Rosenau (1) 17—7.

148. *Pendularia* L. Mai, Juli, August.

Rosenau (1) 19—5.

149. *Omicronaria* V. April, Mai, Juli.

Linz (1) 13—5.

Wien (1) 9—5.

Die erste Generation beginnt wahrscheinlich im Mai.

276. *Pylarge* H. S.151. *Commutata* Tr. Juni. (*Salutata*.)

Salzburg (1) 23—6.

277. *Arrhostia* Hb.152. *Virgulata* Bk. Juni. (*Strigaria*.)

Rosenau (2) 4—7 (1—7 — 8—7).

153. *Nigropunctata* Hfn. Juni, Juli. (*Strigillata*, *Prataria*.)

Rosenau (1) 8—6.

Salzburg (5) 18—7 (7—7 — 7—8).

154. *Umbellaria* Hb. Juni. (*Compararia*.)

Salzburg (1) 17—7.

157. *Remutata* V. Mai, Juni.

Prag (1) 7—6.

Salzburg (2) 7—6 (1—6 — 14—6),

 $2A = (1) 27—8.$ ¹

Zwei Generationen?

158. *Sylvestrata* Bk. Juni bis August.

Brünn (1) 16—6.

Neutitschein (1) 16—7.

Salzburg (4) 13—7 (4—7 — 20—7),

 $Z = (7) 28—8 (21—8 — 2—9).$

Wien (1) 4—6,

 $Z = (1) 25—8.$ 159. *Cerusaria* H. S. (*Punctata*, *Subpunctaria*.)

Salzburg (2) 11—6 (8—6 — 14—6).

163. *Mutata* Tr. Mai bis Juli.Gresten $2A = (2) 25—7.$ ¹

Rosenau (1) 26—6.

Wien (1) 29—5.

167. *Paludata* L. Mai, Juni, und wieder im August. (*Ornata*.)

Brünn (4) 16—5 (9—5 — 20—5),

 $2A = (1) 6—7.$ Kaschau $2A = (2) 4—7 (3—7 — 6—7).$

Neutitschein (3) 5—6 (24—5 — 15—6),

 $2A = (3) 2—8 (25—7 — 10—8).$ Prag $2A = (1) 28—7.$

Rosenau (3) (2—5 — 19—6).

Salzburg (4) 20—5 (16—5 — 23—5),

 $2A = (6) 20—8 (15—7 — 8—9),$ $Z = (4) 11—9 (20—8 — 27—9).$

Wien (6) 25—5 (14—5 — 13—6),

 $Z = (1) 21—9.$

Die zweite Generation beginnt auch schon im Juli und dauert auch noch im September.

169. *Immorata* L. Juni, Juli. (*Tesselaria*.)

Linz (1) 21—5.

Rosenau (3) 6—6 (24—5 — 19—6).

Salzburg (7) 21—5 (8—5 — 3—6),

 $2A = (5) 18—7 (13—7 — 22—7),$ $Z = (5) 8—8 (2—8 — 19—8).$

Wien (2) 18—5.

Zwei Generationen, bei der ersten schon im Mai, bei der zweiten noch im August.

¹ Z?170. *Rubiginata* Hfn. Juli, August. (*Rubricaria*.)

Brünn (1) 5—6.

Rosenau (2) 13—6 (7—6 — 19—6).

Wien (1) 21—5,

 $2A = (1) 24—8,$ $Z = (1) 7—9.$

Ebenfalls zwei Generationen, die erste im Juni, die zweite im August.

278. *Ptychopoda* Stph.173. *Dimidiata* Hfn. Juni bis August. (*Scutulata*.)

Salzburg (2) 11—7 (11—7 — 11—7),

 $Z = (1) 11—8.$ 177. *Pusillata* Hb. Juli. (*Microsaria*.)Rosenau $2A = (1) 18—7.$

Wien (1) 21—5.

Zwei Generationen?

178. *Incanata* L. Juli, August. (*Virgulata*, *Dilutaria*.)

Neutitschein (1) 7—6.

Salzburg (6) 27—6 (2—6 — 23—7),

 $Z = (2) 16—8 (6—8 — 25—8).$

Schon im Juni. Die grosse Verschiedenheit der ersten Erscheinungszeiten in Salzburg lässt ebenfalls zwei Generationen vermuthen.

179. *Aversata* L. Juli, August.

Rosenau (1) 17—7.

Salzburg (1) 14—6,

 $Z = (1) 28—8.$ 182. *Emarginata* L. Juni, Juli.

Rosenau (1) 9—7.

187. *Straminata* Tr. Juli. (*Sylvestrata*.)

Wien (1) 17—5,

 $2A = (1) 23—7,$ $Z = (1) 11—8.$ 188. *Holosericeata* Dp.

Salzburg (1) 1—8.

Wien (1) 27—6.

192. *Perochraria* F. R. Juni, Juli. (*Ochrearia*.)

Brünn (3) 21—6 (12—6 — 8—7).

Neutitschein (1) 10—7.

Wien (2) 7—6 (4—6 — 11—6),

 $Z = (1) 3—9.$

Auch noch im August.

279. *Acidalia* Tr.193. *Ochreata* Scp. Juli, August.

Gresten (3) 20—6 (13—6 — 1—7).

Rosenau (2) 15—6 (12—6 — 19—6).

Zuerst schon im Juni.

194. *Rufaria* Hb. Juli, August.

Rosenau (1) 10—7.

Salzburg (7) 4—7 (17—6 — 20—7),

 $Z = (5) 21-8 (5-8 - 31-8).$ Wien $Z = (1) 24-8.$ 200. *Aureolaria* V. Juni; nach H. S. im August.

Brünn (4) 15—6 (12—6 — 20—6).

Kaschau (1) 3—6.

Rosenau (1) 3—7.

Wien (3) 20—6 (16—6 — 24—6),

 $2A = (1) 27-8.$

Zuweilen zwei Generationen.

II. PHYTOMETRIDAE.

280. *Odezia* Bd.203. *Chaerophyllata* L. Juni, Juli.

Freistadt (5) 17—6 (8—6 — 27—6).

Gresten (5) 1—6 (25—5 — 10—6).

Kessen (2) 11—6 (9—6 — 13—6).

Kirchdorf (14) 3—6 (17—5 — 30—6).

Linz (2) 2—6 (29—5 — 6—6).

Neutitschein (1) 23—6.

Salzburg (9) 5—6 (23—5 — 21—6),

 $Z = (6) 5-7 (1-7 - 12-7).$ 282. *Chesias* Tr.207. *Griseata* V.

Rosenau (1) 9—5.

Wien (3) 21—5 (9—5 — 1—6).

283. *Anaitis* Dp.209. *Plagiata* L. Juni bis September; ob zwei Generationen?

Brünn (9) 11—5 (9—5 — 15—5).

Kaschau (1) 3—6.

Linz (1) 26—5.

Neutitschein (3) 19—5 (12—5 — 22—5).

Prag (1) 5—6.

Salzburg (1) 11—5,

 $Z = (2) 22-9 (17-9 - 28-9).$ Wien $Z = (2) (7-9 - 7-10).$

Sehr wahrscheinlich zwei Generationen, in der ersten schon im Mai.

210. *Praeformata* Hb. Juli. (*Cassiata*.)

Salzburg (1) 2—6,

 $2A = (3) 24-9 (18-8 - 18-9),$ $Z = (1) 16-10.$

Ebenfalls zwei Generationen, in der ersten schon im Juni, in der zweiten noch im October.

284. *Lobophora* Crt.Die Arten erscheinen im ersten Frühjahre, *Vireolata* und *Sexalata* im Juni.212. *Polycommata* V.

Wien (1) 7—4.

214. *Sertata* Hb. (*Appendicularia*.)

Linz (1) 3—4.

217. *Halterata* Hfn. (*Hexapterata*.)

Rosenau (3) 3—5 (24—4 — 17—5).

218. *Sexalata* Bk. (*Sexaliscata*.)

Salzburg (2) (9—6 — 1—7).

285. *Mesotype* Hb.219. *Virgata* Hfn. April, Juli. (*Lineolata*.)

Wien (1) 16—4.

286. *Larentia* Tr.220. *Coarctaria* V. Alpen. Juli.

Brünn (1) 1—7.

221. *Luridata* Hfn. Mai, Juli, August. (*Palumbaria*.)

Brünn (8) 22—5 (15—5 — 4—6).

223. *Brunnearia* Vll. Juni bis August. (*Vespertaria*.)

Brünn (4) 16—8 (10—8 — 21—8).

Gresten (4) 29—8 (24—8 — 2—9).

Neutitschein (3) 26—8 (24—8 — 30—8).

Salzburg (2) 14—8 (5—8 — 24—8),

 $Z = (2) 4-9 (4-9 - 5-9).$

Erscheint erst im August.

225. *Chenopodiata* L. Juli, August. (*Mensuraria*.)Baumgartenberg $2A = (1) 29-7.$

Brünn (2) 12—5 (9—5 — 16—5),

 $2A = (1) 18-7.$

Linz (1) 17—6.

Neutitschein (1) 21—5,

 $2A = 16-7 (11-7 - 21-7).$ Rosenau $2A = (4) 14-7 (9-7 - 18-7).$ Salzburg $2A = (14) 31-7 (20-7 - 3-9),$ $Z = (8) 29-8 (23-8 - 7-9).$

Zwei Generationen.

226. *Angulata* Hfn. August. (*Moeniaria*.)
 Brünn (3) 13—5 (10—5 — 18—5),
 $2A = (2) 16—8 (8—8 — 25—8)$.
 Neutitschein $2A = (1) 9—8$.
 Prag $2A = (1) 22—8$.
 Salzburg $2A = 18—8 (18—8 — 18—8)$.
 Wien (1) 7—6,
 $Z = (1) 15—9$.
 Ebenfalls zwei Generationen.
227. *Comitata* L. Juni, Juli, August. (*Chenopodiata*.)
 Salzburg (2) (29—6 — 13—8).
228. *Bipunctaria* V. Juli.
 Brünn (7) 12—5 (9—5 — 19—5),
 $2A = (3) 7—7 (4—7 — 12—7)$.
 Kaschau (2) (3—6 — 18—7).
 Neutitschein (3) 16—5 (12—5 — 22—5),
 $2A = (3) 10—7 (7—7 — 16—7)$.
 Prag $2A = (2) 23—7 (22—7 — 24—7)$.
 Rosenau $2A = (2) 22—7 (14—7 — 1—8)$,
 $Z = (1) 4—10$.
 Salzburg $2A = (3) 11—8 (2—8 — 21—8)$,
 $Z = (1) 17—9$.
 Wien (2) 18—7 (11—7 — 26—7).
 Zwei Generationen und bei der zweiten noch im August und September.
231. *Prunata* L. Juni bis September, in zwei Generationen. (*Ribesiaria*.)
 Brünn (3) 8—7 (3—7 — 12—7).
 Rosenau (4) 25—6 (7—6 — 14—7).
 Rottalowitz (1) 16—6.
 Salzburg (7) 22—7 (11—7 — 1—8).
 Zwei Generationen?
232. *Silacea* V. Juli.
 Brünn (2) 6—5 (5—5 — 8—5),
 $2A = (2) 15—7 (12—7 — 18—7)$.
 Neutitschein $2A = (3) 30—7 (26—7 — 6—8)$.
 Zwei Generationen.
234. *Reticulata* V. Juli.
 Neutitschein (3) 15—7 (11—7 — 17—7).
235. *Populata* L. Juni, Juli.
 Brünn (1) 15—6.
 Linz (1) 17—6,
 $Z = (1) 6—8$.

(Fritsch.)

- Neutitschein (1) 17—7.
 Rosenau (1) 14—7.
236. *Pyraliata* V. Juni, Juli.
 Linz (1) 19—6.
 Rosenau (1) 14—7.
 Salzburg (2) (14—7 — 5—8).
 Wien (1) 27—6.
238. *Fulvata* V. Juni, Juli.
 Wien (1) 8—7.
246. *Corylata* Hb. Mai, Juni. (*Ruptata*.)
 Neutitschein (1) 9—6.
 Salzburg $2A = (1) 19—10$.
 Zwei Generationen?
247. *Truncata* Hfn. Mai, Juni und wieder im August. (*Russata*.)
 Salzburg $2A = (6) 12—8 (7—8 — 19—8)$,
 $Z = (3) (12—9 — 18—10)$.
 Auch noch im September und October.
249. *Impluviata* V. Mai, Juni.
 Brünn (3) 13—5 (10—5 — 16—5).
 Neutitschein (1) 11—6.
 Wien (2) 13—5 (10—5 — 17—5).
250. *Pectinataria* Fssl. Juni, Juli. (*Miaria*.)
 Brünn (1) 9—6.
 Neutitschein (3) 12—6 (7—6 — 19—6).
 Rosenau (1) 27—6.
 Salzburg (1) 11—6.
255. *Suffumata* V. April, Mai.
 Brünn (1) 18—5.
 Neutitschein (1) 27—5.
256. *Berberata* V. Im Mai und August.
 Wien (1) 16—6.
257. *Rubidata* V. Juli, nach H. S. im Mai und Juni.
 Rosenau (1) 1—6.
259. *Designata* Hfn. Mai, Juni. (*Propugnata*.)
 Brünn (1) 5—6.
260. *Quadrifasciaria* L. Mai, Juni, dann wieder im August. (*Ligustraria*.)
 Brünn (2) 30—4 (29—4 — 1—5).
 Linz (2) (22—4 — 8—6).
 Neutitschein (3) (4—5 — 20—

261. *Bilineata* L. Juni bis August, in zwei Generationen.

Brünn (1) 27—4,
 $2A = (2) 12-7 (6-7-18-7)$.
 Linz (3) (29—4—8—6).
 Neutitschein (3) 16—6 (11—6—21—6).
 Rosenau (2) 22—6 (18—6—27—6).
 Salzburg (12) 10—6 (31—5—3—7),
 $Z = (10) 4-9 (8-8-22-9)$.
 Wien (2) 11—6 (2—6—21—6),
 $2A = (2) 17-7 (15-7-19-7)$,
 $Z = (3) 14-9 (3-9-21-9)$.

Bei der ersten Generation zuweilen schon im Mai, bei der zweiten, welche nach den Beobachtungen in Salzburg kaum getrennt ist, selbst noch im September.

263. *Ferrugata* L. April, Mai, und wieder im Juni und Juli.

Brünn (2) 3—5 (1—5—5—5),
 $2A = (1) 15-7$.
 Budweis (1) 2—5.
 Neutitschein (2) 11—5 (6—5—17—5).
 Rosenau (1) 6—5.
 Salzburg $2A = (3) 24-7 (14-7-5-8)$.

Beide Generationen beginnen einen Monat später.

267. *Olivata* V. Juni, Juli.

Salzburg $Z = (1) 7-8$.

270. *Galiata* V. Mai, Juni und wieder im August. (*Chalybeata*.)

Brünn (5) 5—6 (20—5—12—6).
 Linz (1) 11—5.
 Neutitschein (2) 16—6 (13—6—20—6).

271. *Quadriannulata* Hw. Juni und Juli. (*Quadri-fasciaria*.)

Rosenau (3) 5—5 (29—4—9—5).
 Salzburg (1) 28—4,
 $2A = (5) 29-7 (26-7-1-8)$,
 $Z = (5) 30-8 (27-8-13-9)$.

Zwei Generationen, welche ineinander überzugehen scheinen, bei der zweiten auch noch im August.

272. *Ocellata* L. Mai, Juli, August.

Brünn (1) 9—4,
 $2A = 9-6 (5-6-12-6)$.
 Budweis (1) 27—5.
 Linz (1) 28—4.

Neutitschein $2A = (1) 12-6$.

Prag $2A = (1) 25-6$.

Rosenau $Z = (1) 11-8$.

Salzburg $Z = (1) 6-8$.

Wien $2A = (1) 12-6$.

Die erste Generation beginnt im April, die zweite im Juni.

273. *Montanata* L. Mai, Juni.

Gresten (1) 2—6.

Neutitschein (1) 11—6.

Rosenau (3) (11—6—18—7).

Salzburg (3) 9—6 (6—6—11—6),

$Z = (1) 13-8$.¹

Nach einer vereinzelt Beobachtung in Salzburg mindestens auch im Juli, wenn nicht zuweilen eine zweite Generation im August beginnt.

275. *Molluginata* Hb. Mai, Juni und wieder Ende Juli, August.

Brünn (2) 22—5 (22—5—22—5).
 Neutitschein (2) 22—6 (17—6—28—6).
 Prag (2) (2—5—25—5).
 Salzburg $2A = (1) 6-7$.

276. *Alchemillata* V. Mai, Juni und wieder im Juli und August.

Brünn (4) 4—5 (27—4—12—5).
 Budweis (1) 2—5.
 Gresten (2) (29—4—23—5).
 Linz (3) (7—4—25—5).
 Rosenau (2) 13—5 (9—5—17—5),
 $2A = (1) 14-7$.
 Salzburg (3) 24—4 (18—4—28—4),
 $2A = (7) 13-7 (6-7-29-7)$,
 $Z = (9) 2-9 (24-8-23-9)$.

Bei der ersten Generation zuweilen schon im April, bei der zweiten noch im September.

278. *Unangulata* Hw. (*Amniculata*.)

Rosenau (2) (27—6—17—7).

279. *Rivata* Hb.

Brünn (5) 10—5 (5—5—22—5).
 Neutitschein (2) 6—5 (3—5—10—5).
 Prag (2) (17—5—30—6).
 Rosenau (2) 24—5 (18—5—30—5),
 $Z = (1) 21-8$.

¹ 2A?

Wien (2) 15—5 (9—5 — 21—5).

Wahrscheinlich zwei Generationen, wie bei der ihr nahe verwandten *L. Alchemillata*.

280. *Tristata* Hb. Mai, Juni. (*Funerata*?)

Agram (1) 28—3!

Brünn (1) 19—4,

2A = (1) 24—6.

Neutitschein 2A = (1) 28—6.

Rosenau (3) 19—5 (16—5 — 24—5).

Salzburg (2) 5—5 (2—5 — 8—5),

2A = (5) 21—7 (14—7 — 29—7),

Z = (3) 9—8 (2—8 — 15—8).

Wien (1) 28—5.

Zwei Generationen, bei der ersten zuweilen schon im April.

281. *Hastata* L. April bis Juni. (*Hastulata*.)

Brünn (3) 12—5 (5—5 — 19—5).

Linz (1) 29—5.

Erscheint erst im Mai.

284. *Rivulata* V. Mai, Juni.

Brünn (3) 2—5 (20—4 — 9—5).

Neutitschein (2) 12—5 (7—5 — 18—5),

2A = (2) 21—7 (17—7 — 25—7).

Rosenau 2A = (1) 17—7.

Salzburg Z = (1) 12—8.

Zwei Generationen, oder wenigstens bei der ersten auch noch im Juli.

288. *Decolorata* Hb. Juni, Juli.

Salzburg (3) 15—6 (5—6 — 24—6),

(12) 13—7 (1—7 — 26—7),

Z = (9) 25—8 (4—8 — 13—9).

Wahrscheinlich zwei, sehr selten selbst drei Generationen, da in Salzburg (1877) eine Erscheinung noch am 14—10 notirt worden ist. Jedenfalls fliegt der Spanner regelmässig noch im August.

289. *Albulata* V. Mai, Juni und wieder im Juli.

Brünn (5) 12—5 (9—5 — 20—5).

Neutitschein (1) 28—5.

Salzburg (1) 14—5,

2A = (1) 24—7.

Wien (1) 29—5.

290. *Minorata* Tr. Juli.

Salzburg (1) 18—7.

291. *Blandiata* V. Mai, Juni und wieder im Juli und August.

Bregenz (1) 28—5.

Gresten 2A = (2) 27—7 (23—7 — 31—7).

Salzburg (3) 17—7 (13—7 — 25—7),

Z = (2) 29—7 (21—7 — 6—8).

293. *Fluctuata* L. Vom Mai bis August in zwei Generationen.

Brünn (8) 3—5 (20—4 — 9—5),

2A = (1) 25—6.

Neutitschein (2) 4—5 (1—5 — 8—5),

2A = (1) 25—7,

Z = (1) 21—9.

Rosenau (2) 12—5 (10—5 — 15—5).

Salzburg (1) 8—5,

Z = (3) 9—9 (1—9 — 24—9).

Wien (1) 11—5.

294. *Procellata* V. Mai bis Juli.

Linz (1) 2—6.

Salzburg (1) 25—5.

295. *Bicolorata* Hfn. (*Rubiginata*.)

Linz (1) 11—7.

Rosenau (3) 10—7 (27—6 — 17—7).

296. *Albicillata* L. Mai bis Juli.

Linz (1) 26—5.

Salzburg (1) 8—6,

Z = (1) 11—8.

297. *Rupestata* V. Juli.

Salzburg (1) 26—6.

308. *Tophaceata* V. Juli.

Salzburg Z = (1) 1—9.

310. *Caesiata* V. Juli. (*Flavicinctata*.)

Linz (1) 5—4!

Wien (2) 2—6 (28—5 — 7—6).

Erscheint wenigstens schon im Juni. Zwei Generationen?

311. *Cyanata* Hb. Juli, August.¹

314. *Dilutata* V. Im Spätherbst, und überwintert im April.

Brünn (2) 4—10 (4—10 — 5—10).

Gresten (2) 12—10 (10—10 — 15—10).

¹ Von K. Fritsch jun. während seiner Ferienreise 1877 am 19—8 in Bruck a. d. M.

- Neutitschein (1) 1—10.
 Rosenau (1) 18—7!.
 Zwei Generationen?
316. *Vetutata* V. Mai bis Juli, in zwei Generationen.
 Salzburg 2 A = (1) 17—7.
317. *Undulata* L. Mai bis Juli.
 Neutitschein (1) 12—6.
319. *Dubitata* L. April, Mai und Juli bis September.
 Brünn (1) 5—5.
 Linz (1) 29—4.
 Neutitschein Z = (1) 27—10.
 Rosenau (1) 12—4.
 Salzburg (1) 2—4,
 2 A = (1) 23—7.
 Wien (1) 9—5.
320. *Certata* Hb. Flugzeit wie bei dem vorigen. (*Cervinata*.)
 Linz (2) (13—4 — 4—5),
 2 A = (1) 14—7.
 Troppau (1) 6—4.
321. *Transversata* Hfn. Im Juni und Juli, auch schon im Frühjahr. (*Rhamnata*.)
 Linz 2 A = (1) 7—7.
 Salzburg Z = (1) 3—8.
322. *Aemulata* Hb.
 Salzburg (1) 8—6.
287. *Eupithecia* Crt.
333. *Signata* Sep. Mai bis Juli. (*Centaureata*.)
 Brünn (2) 12—5 (12—5 — 13—5).
339. *Innotata* Hfn. Mai bis August, wohl in doppelter Generation.
 Brünn (3) 11—5 (9—5 — 15—5).
359. *Satyrata* Hb. Mai, Juni.
 Salzburg (1) 18—5,
 2 A = (1) 21—7,¹
 Zwei Generationen?
380. *Rectangulata* L. Im Mai bis Juli. (*Cydoniata*, *Subaerata*.)
 Bregenz (1) 25—5.
 Brünn (3) 19—5 (13—5 — 25—5).
 Neutitschein (2) 7—6 (28—5 — 16—6).
- 2 Z?
- Rosenau (1) 16—5.
 Salzburg (4) 8—6 (2—6 — 15—6),
 Z = (4) 26—6 (14—6 — 9—7).
381. *Debiliata* Hb.
 Rosenau (2) 13—6 (8—6 — 18—6).
 Salzburg Z = (1) 25—7.
383. *Strobiliata* Bk. Mai, Juni. (*Residuata*.)
 Salzburg (1) 21—6.
288. *Hydrelia* Hb.
388. *Sylvata* V. Juli.
 Brünn (1) 20—6.
391. *Obliterata* Hfn. Mai, Juni. (*Hepararia*.)
 Rosenau Z = (1) 18—7.
290. *Minoa* Tr.
393. *Fuscata* Hfn. Mai, Juni und wieder im Juli und August. (*Euphorbiata*.)
 Brünn (4) 23—5 (16—5 — 1—6).
 Gresten (4) 16—5 (1—5 — 20—5).
 Linz (2) 27—5 (26—5 — 29—5).
 Rosenau (2) 16—5 (15—5 — 17—5).
 Salzburg (4) 25—5 (6—5 — 11—6),
 2 A = (2) (8—7 — 29—7),
 Z = (3) 21—8 (17—8 — 24—8).
291. *Lythria* Hb.
394. *Purpuraria* L. Mai bis August; ob zwei Generationen?
 Bregenz (1) 16—6.
 Brünn (10) 1—5 (16—4 — 19—5),
 2 A = (2) 3—7 (1—7 — 6—7),
 Z = (1) 5—10.
 Nikolsburg (1) 6—6.
 Rosenau (2) (28—3 — 24—4),
 2 A = (1) 24—6.
 Wien (5) 22—4 (9—4 — 28—4),
 2 A = (4) 19—7 (9—7 — 31—7),
 Z = (2) 29—8 (26—8 — 3—9).
292. *Cheimatobia* Stph.
 Flugzeit Ende October bis December.
396. *Brumata* L.
 Brünn (2) 8—10 (7—10 — 10—10).
 Gresten (4) 22—10 (17—10 — 28—10),
 Z = (1) 15—11.

Iglau (1) 29—10,

$Z = (1) 3—11.$

Kremsmünster (4) 30—10 (28—10 — 1—11).

Lemberg (1) 13—10,

$Z = (1) 23—11.$

Linz (8) 29—10 (20—10 — 19—11),

$Z = (3) 21—11 (17—11 — 28—11).$

Neutitschein (2) 20—10 (14—10 — 26—10),

$Z = (1) 11—11.$

Rosenau (4) 23—10 (20—10 — 26—10).¹

$Z = (2) 20—11 (16—11 — 24—11).$

Salzburg (3) 2—11 (20—10 — 7—11),

$Z = (3) 25—11 (21—11 — 30—11).$

Troppau (2) (22—9 — 14—10),

$Z = (1) 30—10.$

Fliegt nicht mehr im December?

293. *Anisopteryx* Stph.

398. *Aescularia* V. März.

Brünn (2) 2—3 (28—2 — 5—3).

Gresten (2) 16—3 (7—3 — 25—3).

Linz (3) 30—3 (16—3 — 15—4).

Neutitschein (1) 19—3.

Prag (2) (28—2 — 27—3).

Rosenau (1) 27—2.

Salzburg (2) 11—3 (8—3 — 15—3).

Wien (3) 13—3 (9—3 — 18—3).

399. *Aceraria* V. November.

Brünn (2) 17—10 (15—10 — 20—10).

Kaschau (1) 20—11.

F. Tortricidae.

XX. TORTRICINA.

294. *Teras* Tr.

Die Arten fliegen vom August bis November, selten früher, oft auch überwintend.

9. *Sponsana* F. Ende August bis October. (*Favillaceana*.)

Salzburg (1) 8—7.

Schon im Juli.

14. *Variiegana* V. Ende August bis October. (*Abilgaardana*, *Cristana*, *V. Nyctemerana*.)

Salzburg (1) 27—8.

18. *Niveana* F. Vom September bis April. (*Treueriana*.)

Salzburg $Z = (1) 30—5.$ ¹

21. *Autumnana* H. (*Rufana*, *Lucidana*, *Densana*.)

Salzburg (1) 21—6.

25. *Ferrugana* V. Von August bis Mai. (*V. Tripunctana*, *V. Brachiana*.)

Salzburg (1) 16—7.

Wien (1) 24—6.

31. *Contaminana* H. August bis October. (*V. Ciliana*, *V. Dimidiana*.)

Neutitschein (2) 27—8 (23—8 — 1—9).

295. *Tortryx* L., Tr.

Sie leben als Falter meist im Juni und Juli.

38. *Rosana* L. (*Laevigana*, *Acerana*, *Oxyacanthana*.)

Salzburg (2) 27—6 (25—6 — 29—6),

$Z = (2) 7—7 (2—7 — 13—7).$

39. *Sorbiana* H.

Rosenau (1) 11—6.

42. *Corylana* F. (*Textana*.)

Salzburg (2) 21—7 (20—7 — 22—7),

$Z = (1) 16—8.$

46. *Heparana* V. (*Carpiniana*, ? *Vulpisana*.)

Brünn (9) 8—6 (5—6 — 15—6).

Neutitschein (2) 14—6 (6—6 — 22—6).

Salzburg (2) 20—6 (14—6 — 27—6),

$Z = (1) 24—7.$

Wien (1) 3—7,

$Z = (1) 10—8.$

48. *Forsterana* F. (*Adjunctana*.)

Salzburg (2) 28—6 (25—6 — 2—7).

50. *Lecheana* L.

Wien (1) 4—6.

52. *Centrana* H. S.

Salzburg (2) 3—7 (30—6 — 6—7),

$Z = (1) 17—8.$

58. *Diversana* H. (*Transitana*.)

Salzburg (1) 28—6.

60. *Politana* Hw. Juni, Juli. (*Sylvana*, *Lepidana*.)

Wien (1) 21—4!.

¹ Einmal (1867) schon 26—9.

¹ Determination unsicher.

61. *Cinctana* V. Juli, August. (*Albidana*.)
Neutitschein (1) 1—8.
65. *Ministrana* L. Mai, Juni. (*Ferrugana*.)
Wien (1) 17—5.
67. *Vividana* L.
Agram (1) 28—3,
2 A = (2) 5—7 (3—7 — 7—7).
Brünn (10) 6—6 (25—5 — 15—6).
Neutitschein (3) 11—6 (8—6 — 16—6).
Wien (1) 30—4,
2 A = (1) 11—6,
Z = (1) 7—8.
68. *Flavana* H. Ende Mai und Juni, in den Gebirgen
im Juli. (*Palleana*, V. *Intermediaria*, V. *Icterana*.)
Salzburg (7) 12—7 (7—6 — 6—8),¹
Z = (5) 30—7 (7—7 — 15—8).
69. *Viburnana* V. Juli, August. (*Unitana*, ♀ *Rhom-*
bana, V. *Scrofulariana*.)
Salzburg (1) 16—6.
72. *Rusticana* Tr. Mai, Juni. (*Helveolana*.)
Salzburg (1) 26—5.
73. *Rolandriana* L. Alpen.
Salzburg (1) 2—7.
71. *Gnomana* L.
Rosenau (1) 11—8.
83. *Rubicundana* H. S.
Salzburg (1) 9—8.
87. *Favillaceana* Hb. Mai. (*Terreana*, ? *Rusticana*,
Ochraceana.)
Cilli (1) 15—4.
Gresten (1) 30—4.
Schon im April.
296. *Sciaphila* Tr.
88. *Gouana* L. Ende Juni, Juli. (*Argentana*, *Mag-*
nana, *Margaritalis*.)
Gresten (4) 5—6 (31—5 — 13—6).
Kessen (1) 21—6.
Salzburg (1) 10—7.
Schon Anfangs Juni.
89. *Osseana* Scp. Ende Juni und Juli. (*Pratana*.)
Neutitschein (1) 19—7.
93. *Chrysanthæana* Dp. Juni, Juli. (? *Alternella*.)
Rosenau (1) 3—6.
94. *Wahlbomiana* Hb. Juni, Juli. (V. *Virgaureana*,
V. *Minorana*, V. *Minusculana*, ? V. *Pascuana*, V.
Communana, V. *Subjectana*, V. *Incertana*, V. *Deri-*
vana.)
Kessen (1) 19—5.
Salzburg (6) 19—6 (2—6 — 5—7),
Z = (1) 26—8.
Wien (1) 24—6.
Auch noch im August, wenn nicht als zweite Generation?
297. *Cheimatophila* Stph.
100. *Tortricella* Hb. October bis April. (*Hyemana*,
Alternella.)
Gresten (3) 15—3 (8—3 — 29—3).
Neutitschein (3) 3—4 (1—4 — 5—4).
Salzburg (1) 30—3,
2 A = (2) 18—11 (13—11 — 21—11).
Erscheint zuerst im November.
299. *Olindia* Gn.
104. *Ulmana* Hb. Juni, Juli. (*Areolana*.)
Salzburg (1) 11—6.
300. *Conchilis* Tr.
106. *Hamana* L. Juni bis August. (*Diversana*.)
Brünn (6) 13—6 (10—6 — 21—6).¹
Kessen (1) 2—6.
Neutitschein (2) 21—6 (17—6 — 26—6).
Prag (1) 11—6.
Rosenau (1) 6—5!.
Salzburg (1) 31—7.
Wien (2) (9—6 — 4—7).
107. *Zoegana* L. Juni bis August.
Salzburg (2) (4—7 — 28—7),
Z = (2) 17—8 (17—8 — 17—8).
126. *Baumanniana* V. Juli, nach H. S. auch im Mai.
(*Hartmanniana*.)
Gresten (3) 6—5 (1—5 — 11—5).
Neutitschein 2 A = (1) 1—8.
Salzburg (2) (10—5 — 19—6).
Wien (1) 15—5.
Auch im Juni.

¹ In einigen Jahren nur je einmal beobachtet.¹ Einmal schon 16—5.

128. *Tesserana* V. Juni, Juli. (*Tesselana*.)
 Gresten (2) 15—5 (11—5 — 19—5).
 Kessen (1) 21—5.
 Salzburg (6) 3—6 (11—5 — 29—6).
 Einen Monat früher: Mai, Juni.
130. *Aurofasciana* Mn. Juni, Juli. (*Valdensiana*.)
 Salzburg (1) 17—5.
147. *Mussehlana* Tr. Mai, Juni und wieder im August und September. (*Permixtana*, *Vectisana*.)
 Gresten (1) 18—5.
301. *Retinia* Gn.
 Die Falter entwickeln sich vom April bis Juli.
171. *Piniana* H. S. Juli.
 Neutitschein (1) 16—7.
302. *Grapholitha* Tr.
 Die Arten fliegen im Mai bis Juli.
176. *Striana* V. Juni, Juli. (*Rusticana*, *Fasciolana*.)
 Salzburg (1) 24—5,
 Z = (1) 22—7.
178. *Profundana* V. Juli bis September. (*Porphyra*, *Wellensiana*.)
 Neutitschein (1) 10—7.
183. *Hartmanniana* L. August, September. (*Scriptana*.)
 Wien (3) 27—5 (24—5 — 29—5),
 (2) 3—7 (30—6 — 7—7),
 Z = (1) 3—9.
 Schon im Juni und Juli; wahrscheinlich zwei Generationen.
188. *Cynosbatella* L. Juni, Juli. (*Variegana*.)
 Salzburg (6) 4—6 (24—5 — 15—6),
 2 A = (1) 24—8.
 Wien (1) 8—6,
 Z = (1) 10—9.
 Zwei Generationen.
189. *Pruniana* Hb. Juni, Juli.
 Rosenau (2) 25—5 (24—5 — 26—5).
200. *Fuligana* Hb. Juni. (*Ustulana*.)
 Salzburg (2) (13—6 — 4—7).
201. *Textana* Fr l.
 Salzburg (1) 7—6.
217. *Olivana* Tr. Juni, Juli. (*Micana*.)
 Neutitschein (1) 19—7.
222. *Urticana* H. Juni, Juli.
 Brünn (6) 14—5 (9—5 — 22—5).
 Neutitschein (2) 23—5 (21—5 — 25—5).
 Rosenau (1) 24—5.
 Schon im Mai zuerst.
223. *Lacunana* V. Mai, Juni. (*Monetana*.)
 Brünn (4) 4—6 (16—5 — 20—6).
 Neutitschein (1) 29—6.
 Salzburg (4) 12—5,
 2 A = (5) 30—7 (18—7 — 5—8),
 Z = (5) 21—8 (14—8 — 25—8).
 Wien (2) 21—5 (18—5 — 24—5),
 2 A = (1) 3—7.
 Zwei Generationen.
224. *Rupestrana* Dp. Im Mai und Juni. (*Rurestrana*.)
 Salzburg (2) (14—5 — 4—6),
 Z = (1) 29—8.
 Zwei Generationen.
235. *Arcuana* Cl. Im Mai bis Juli. (*Arcuella*.)
 Gresten (4) 31—5 (23—5 — 4—6).
 Kessen (1) 18—6.
 Salzburg (1) 13—5,
 Z = (1) 6—7.
239. *Uddmanniana* L. Von Ende Juni bis August. (*Solandriana*, *Achatana*.)
 Salzburg (1) 24—6.
266. *Brunnichiana* V. Im Mai und Juni. (*Profundana*.)
 Brünn (9) 29—5 (21—5 — 7—6).
 Neutitschein (2) 21—6 (20—6 — 23—6).
267. *Cirsiana* Zll. Ende Mai bis Juli. (*Scutulana*.)
 Salzburg (1) 30—5,
 Z = (1) 16—7.
268. *Scutulana* V. Mai, Juni und August.
 Brünn (6) 27—5 (13—5 — 20—6).
 Neutitschein (1) 23—6.
 Salzburg (1) 8—6.
 Wien (1) 3—5.
285. *Tripunctana* V. Juni, Juli. (*Cynosbana*, *Ocellana*.)
 Salzburg (1) 1—6.

286. *Roborana* V. Juni, Juli. (*Aquana*.)
Wien (1) 6—7.
291. *Comitana* V. Im Mai bis Juli. (*Hercyniana*, *Hyr-
ciniana*.)
Gresten (3) 5—6 (31—5 — 13—6).
293. *Nigricana* H. S. April bis Juni.
Salzburg (3) 4—5 (23—4 — 12—5),
Z = (3) 29—6 (20—6 — 16—7).
Manchmal noch im Juli.
300. *Lacteana* Tr. Juli.
Salzburg (1) 29—4,
Z = (1) 4—6.
Schon im Mai.
308. *Hohenwarthiana* V. Im Juni und Juli. (*Pupil-
lana*, *Monetulana*.)
Neutitschein (1) 17—7.
314. *Hypericana* H. Juni, Juli.
Gresten (2) 4—6 (3—6 — 6—6).
Salzburg (1) 18—6.
316. *Gemmiferana* Tr.
Salzburg (1) 28—7.
325. *Dorsana* F. Im Mai und Juni. (*Lunulana*, *Jun-
giana*.)
Salzburg (1) 15—6.
336. *Coniferana* Rtz b. Juni. (*Separatana*.)
St. Jakob Z = (1) 1—8.
349. *Pomonella* L. Im Herbst bis April. (*Pomonana*.)
Brünn (8) 8—5 (5—5 — 16—5).
Salzburg (8) 4—6 (27—5 — 16—6),
Z = (3) 3—7 (20—6 — 11—7).
Im Mai und Juni. Das Vorkommen im Herbst könnte
sich nur auf die Raupe beziehen.
369. *Germanana* H. Juni. (*Germmana*, *Fulvifrontana*,
Puncticostana.)
Salzburg (1) 12—5,
2 A = (1) 14—7.¹
Vielleicht zwei Generationen.
370. *Rhediella* L. April, Mai. (*Aurana*, *Rhediana*,
Daldorfiana.)
Salzburg 2 A = (3) 15—7 (29—6 — 26—7).
Zwei Generationen, wenn das Vorkommen im April,
Mai sicher ist.
372. *Aceriana* Dp.
Wien (2) (28—5 — 28—6).
382. *Corticana* H. Im Juli und August.
Salzburg (1) 6—7.
390. *Fractifasciana* H w. Im Mai und Juni. (*Cuphana*.)
Gresten (3) 22—4 (15—4 — 29—4).
Schon im April.
399. *Trimaculana* Dp. Juni. (*Lithoxyllana*, *Ulma-
riana*.)
Wien (2) (28—5 — 24—6).
402. *Upupana* Tr. (*Ustulana*.)
Wien (1) 22—5.
409. *Apicella* V. Im April und Mai und wieder im Juli
und August. (*Siculana*.)
Salzburg (1) 16—5.
Wien (2) 11—5 (10—5 — 12—5).
Zuerst im Mai.
411. *Badiana* V. Im Mai und Juni. (*Corylana*, *Lun-
dana*.)
Gresten (1) 9—5.
Salzburg (2) (2—5 — 9—6).
414. *Naevana* H. Der Schmetterling Ende Juni und
August (Juli?).
Salzburg (1) 31—7.
303. *Dichrorampha* Gn.
Die Arten fliegen vom April bis August.
416. *Petiverella* L. Im Juni bis August. (*Petiverana*,
Montana.)
Salzburg (4) (27—5 — 14—8).
Wien (5) 1—6 (23—5 — 12—6),
Z = (2) 15—8 (12—8 — 19—8).
- G. Pyralides.
XXI. PYRALIDINA.
I. PYRALIDIDAE.
304. *Cledeobia* Dp.
4. *Angustalis* V. Juni, Juli.
Neutitschein Z = (1) 1—8.

¹ Z?

305. *Aglossa* Latr.6. *Pinguinalis* L. Vom Mai bis August.

Linz (1) 4—6.

Rosenau (4) 17—6 (11—6 — 26—6).

Salzburg (3) (20—6 — 10—8).

Troppau (2) (12—6 — 16—7).

306. *Asopia* Tr.11. *Farinalis* L. Juli bis September.

Brünn (10) 3—6 (25—5 — 8—6).

Iglau (3) 28—6 (15—6 — 12—7).

Linz (1) 18—7.

Neutitschein (2) 15—6 (10—6 — 20—6).

Prag (2) 8—6 (5—6 — 12—6).

Rosenau (2) (26—6 — 20—7).

Troppau (2) (29—5 — 15—7).

Erscheint schon im Juni.

307. *Endotricha* Zll.12. *Flammealis* V. Ende Juni bis Anfang August.Salzburg $Z = (2) 3-8 (1-8 - 5-8)$.

II. BOTIDAE.

309. *Scoparia* Hw. (*Eudorea*.)20. *Ambigualis* Tr. (*Chilo ambiguellus*, var. *Octaviana*, *Mercuriella*, ? *Conicella*, *Ancipitella*.)

Brünn (6) 15—6 (7—6 — 19—6).

Neutitschein (1) 20—6.

Salzburg (3) 19—6 (14—6 — 26—6),

 $Z = (1) 2-8$.

Wien (1) 1—7.

27. *Phaeoleuca* Zll. Im Juli und August. (*Parella Sciaphilella*, *Vesuntialis*.)

Salzburg (1) 18—7.

29. *Truncicolella* Stph. Von Ende Juni bis August. (*Mercurella*, *Chilo merc.*, *Ambigualis*.)

Salzburg (2) 15—6 (11—6 — 20—6),

 $Z = (2) (29-7 - 22-8)$.30. *Frequentella* Stph. (*Crataegella*, ? *Mercurella*.)

Salzburg (1) 28—6,

 $Z = (1) 4-9$.312. *Heliothela* Gn.

Flug im Sonnenschein.

(Fritsch.)

37. *Atralis* Hb. Im Mai und Juli.

Salzburg (1) 2—6.

Wien $2A = (1) 28-9$.

Zwei Generationen.

315. *Hercyna* Tr.

Die Arten bewohnen die Alpen im Juli und August und fliegen im Sonnenschein sehr flüchtig.

41. *Phrygialis* Hb. (*Rupicolalis*, *Sericealis*.)

Rosenau (1) 4—6.

Salzburg (4) 6—6 (4—6 — 9—6),

 $2A = (7) 6-8 (23-7 - 21-8)$, $Z = (5) 21-8 (11-8 - 25-8)$.Wien $2A = (1) 11-8$.316. *Threnodes* Gn.46. *Pollinalis* V. Im Mai und wieder im Juli und August.

Rosenau (1) 17—5.

Wien (1) 24—5,

 $2A = (1) 24-7$.319. *Odontia* Dp.49. *Dentalis* V. Im Juli.

Wien (1) 18—6.

322. *Eurrhyncha* Hb.52. *Urticata* L. Juni, Juli. (*Urticalis*.)

Brünn (8) 23—5 (15—5 — 29—5).

Gresten (2) 29—5 (28—5 — 30—5).

Kaschau (1) 21—5.

Linz (3) 5—6 (1—6 — 10—6).

Neutitschein (3) 2—6 (27—5 — 7—6),

 $Z = (1) 27-8$.

Prag (1) 25—5.

Rosenau (3) 16—5 (8—5 — 24—5).

Salzburg (8) 17—6 (30—5 — 17—7),

 $Z = (6) 24-7 (14-7 - 15-8)$.

Wien (1) 12—6,

 $Z = (2) 7-7 (6-7 - 8-7)$.

Erscheint zuerst schon im Mai.

323. *Botys* Tr.

Die Arten fliegen im Sommer, zum Theil in doppelter Generation; einige bei Tage.

56. *Octomaculata* L. Im Juni, Juli. (*Octomaculalis*, *Guttalis*.)
 Salzburg (2) 11—6 (8—6 — 14—6),¹
 $Z = (1) 1—8$.²
 Wien $Z = (1) 14—8$.
 Vielleicht zwei Generationen.
57. *Anguinialis* Hb. Mai bis August; wohl in zwei Generationen.
 Rosenau (2) 4—5 (2—5 — 7—5).
 Salzburg (4) 14—5 (6—5 — 26—5),
 $2A = (5) 31—7 (6—7 — 26—8)$.
58. *Cingulata* L. Mai bis August. (*Cingulalis*.)
 Melk (1) 14—4.
 Schon im April.
16. *Falcatalis* Gn. Im Juni. (*Phoenicealis*.)
 Salzburg (1) 18—7,
 $Z = (1) 15—8$.
 Erst im Juli.
62. *Aurata* Scp. Im Mai bis August. (*Punicealis*, *Porphyralis*.)
 Brünn (5) 10—5 (3—5 — 27—5).
 Linz (1) 3—5.
 Rosenau (1) 18—5.
 Salzburg (1) 8—5.
 Wien (1) 26—4,
 $2A = (2) 19—7 (10—7 — 28—7)$,
 $Z = (1) 25—9$.
 Zwei Generationen.
63. *Porphyralis* V. Im Mai und September. (*Coccinialis*.)
 Salzburg (3) 27—4 (19—4 — 1—5),
 $2A = (3) 31—7 (22—7 — 10—8)$,
 $Z = (4) 28—8 (21—8 — 3—9)$.
 Zwei Generationen; die zweite im August, nicht September.
64. *Purpuralis* L. In zwei Generationen, vom Mai bis August. (*Punicealis*.)
 Brünn (8) 12—5 (27—4 — 21—5),
 $2A = (1) 15—7$.
 Gresten (2) 20—4 (20—4 — 21—4).
 Neutitschein (1) 23—5.
- Rosenau (1) 17—5.
 Salzburg (3) 24—5 (18—5 — 12—6),
 $2A = (5) 18—7 (15—7 — 30—7)$,
 $Z = (3) 28—8 (21—8 — 10—9)$.
65. *Ostrinalis* Hb. Im Mai bis September. (?*Purpuralis*.)
 Salzburg (2) 19—5 (13—5 — 25—5),
 $2A = (4) 21—7 (12—7 — 30—7)$,
 $Z = (2) 13—9 (12—9 — 13—9)$.
 Zwei Generationen.
66. *Cespitalis* V. Vom Mai bis August, muthmasslich in zwei Generationen. (*Sordidalis*.)
 Gresten (2) 20—4 (19—4 — 21—4).
 Prag (1) 19—4.
 Rosenau (1) 2—5.
 Salzburg (6) 15—4 (1—4 — 5—5),
 $2A = (6) 14—7 (6—7 — 6—8)$,
 $Z = (5) 27—8 (5—8 — 13—9)$.
 Wien (1) 16—4,
 $Z = (2) 20—9 (10—9 — 30—9)$.
 Zwei Generationen. Schon im April und noch im September.
67. *Sanguinalis* L. Juni bis August. (*Haematalis*.)
 Salzburg $Z = (2) (5—8 — 26—8)$.¹
 Zwei Generationen?
69. *Limbalis* V. Mai bis Juni. (*Rusticalis*.)
 Salzburg (1) 18—6.
72. *Repandalis* V. Im Juni und August. (*Pallidalis*.)
 Salzburg $Z = (2) 26—8 (24—8 — 28—8)$.¹
 Zwei Generationen?
76. *Lupulina* Cl. Mai und Juni. (*Silacealis*, *Nubilalis*.)
 Rosenau $2A = (1) 9—7$.²
77. *Pandalis* H. Im Juni, Juli. (*Verbascalis*.)
 Brünn (6) 16—5 (5—5 — 25—5).
 Neutitschein (2) 1—6 (28—5 — 5—6).
 Rosenau (2) 23—5 (17—5 — 29—5).
 Salzburg (1) 29—5.
 Wien (2) 18—5 (9—5 — 27—5).
 Schon im Mai bei der ersten Erscheinung.

¹ Einmal schon 29—4!² 2A?.¹ 2A?² Z?.

78. *Hyalinalis* H. Im Juli.

Brünn 2 A = (3) 5—7 (1—7 — 10—7).

Linz (2) 13—5 (6—5 — 20—5),

2 A = (1) 11—7.

Neutitschein 2 A = (1) 16—7.

Salzburg (2) (8—6 — 29—6),

Z = (3) (4—7 — 25—8).

Erscheint schon im Mai und Juni und auch noch im August. Nach den Beobachtungen in Salzburg die Erscheinungszeiten beider Generationen kaum trennbar.

80. *Ruralis* Sep. Im Juni und Juli. (*Verticalis*.)

Brünn (8) 7—6 (1—6 — 15—6).

Neutitschein (2) (10—6 — 1—7).

Prag (2) 20—7 (19—7 — 22—7).

Salzburg (9) 14—7 (26—6 — 26—7),

Z = (7) 19—8 (2—8 — 21—9).

Wien (1) 19—7,

Z = (1) 10—8.

Auch noch im August und zuweilen selbst September.

85. *Crocealis* H. Im Juli und August. (*Ochrealis*.)

Rosenau (1) 7—5!

86. *Sambucalis* V. Vom Juli bis August.

Kaschau (1) 21—5!

Salzburg (6) 25—6 (1—6 — 15—7),

Z = (6) 4—8 (25—7 — 25—8).

Schon im Mai und Juni; scheint demnach zwei Generationen zu haben.

93. *Prunalis* V. Juni, Juli. (*Leucophaealis*.)

Neutitschein (1) 20—6.

Salzburg (2) 12—7 (9—7 — 16—7),

Z = (1) 4—9.

Wahrscheinlich auch im August.

104. *Austriacalis* H. S.? ¹110. *Aereal* H. Ende Juni, Juli. (*Opacalis*, *Suffusalis*.)

Salzburg (1) 27—5.

324. *Eurycreon* Ld.119. *Verticalis* L. Juli, August. (*Cinctalis*, *Limbalis*.)

Brünn (6) 16—6 (12—6 — 21—6).

Hausdorf (2) 14—6 (4—6 — 23—6).

St. Jakob (1) 30—6.

Linz (1) 28—5.

¹ Von K. Fritsch jun. auf seiner Ferienreise (1877) am 8—8 bei Eisenerz gesammelt.

Neutitschein (2) 13—7 (12—7 — 15—7).

Rosenau (2) 20—5 (20—5 — 20—5).

Salzburg (4) 4—5 (17—4 — 19—5),

2 A = (7) 20—7 (13—7 — 8—8),

Z = (8) 20—8 (12—8 — 29—8).

Wien (2) 8—6 (4—6 — 12—6).

Zwei Generationen; in der ersten schon im Mai und Juni.

120. *Stricticalis* L. Juli, August.

Salzburg 2 A = (1) 27—7,

(1) 12—5!.

Wien (1) 12—5!.

2 A = (1) 10—8,

Z = (1) 27—9.

Zwei Generationen.

325. *Nomophila* Hb.121. *Noctuella* V. Vom Juli bis September. (*Hybridalis*.)

Rosenau (1) 17—5!.

Salzburg (4) 12—9 (29—8 — 27—9), ¹

Z = 27—10 (23—10 — 1—11).

Wien (1) 24—8.

Die Beobachtung in Rosenau deutet auf zwei Generationen. Bei der zweiten auch noch im October.

327. *Pionea* Gn.123. *Forficalis* L. Im Mai und Juni, und wieder im Juli und August.

Admont (1) 26—4.

Brünn (5) 23—5 (16—5 — 26—5),

Z = (1) 20—10.

Neutitschein (2) 2—6 (2—5 — 7—6),

2 A = (2) 11—8 (11—8 — 11—8),

Z = (1) 21—9.

Salzburg (3) 11—6 (3—6 — 16—6),

2 A = (3) 22—7 (17—7 — 31—7),

Z = (7) 16—8 (4—8 — 28—8).

In der zweiten Generation noch im September und selbst October.

328. *Orobena* Gn.125. *Extimalis* Sep. Juni bis August. (*Margaritalis*, *Erucalis*.)

Salzburg (4) 24—7 (7—7 — 1—8),

Z = (2) (10—7 — 3—8).

Zuerst im Juli.

¹ Bei Werfen von K. Fritsch jun. 1878 am 30—7.

127. *Stramentalis* Hb. Juli, August. (*Elutalis*.)
Neutitschein (2) 11—7 (11—7 — 11—7).

128. *Politalis* V. Im Juni und Juli.

Salzburg (1) 15—7,
Z = (1) 20—8.

Erst im Juli und August.¹

129. *Frumentalis* L. Vom Ende Mai bis August. (*Repandalis*.)

Salzburg (1) 27—6.
Wien (2) 3—6 (3—6 — 3—6).

Zuerst im Juni.

130. *Sophialis* F. Im Juli.

Brünn (7) 9—6 (5—6 — 15—6).
Neutitschein (3) 24—6 (15—6 — 4—7).
Salzburg (2) 6—7 (6—7 — 7—7).

Schon im Juni.

330. *Diasemia* Gn.

132. *Literata* Sep. Mai bis August. Ob in zwei Generationen?

Brünn (6) 15—5 (5—5 — 24—5).
Gresten (5) 13—5 (9—5 — 21—5).
Kaschau (2) 29—5 (21—5 — 7—6).
Kessen (1) 23—5.
Neutitschein (1) 17—6.
Rosenau (1) 31—5,

2A = (1) 14—7.

Salzburg (3) 20—5 (14—5 — 30—5),
2A = (5) 24—7 (15—7 — 31—7),
Z = (6) 25—8 (15—8 — 5—9).

Wien (2) 26—5 (17—5 — 4—6),
Z = (1) 3—9.

In zwei Generationen.

334. *Hydrocampa* Gn.

Die Falter im Juni und Juli.

139. *Nymphaeata* L. (*Nymphaealis*, *Potamogalis*.)

Brünn (4) 26—5 (22—5 — 3—6).
Neutitschein (1) 30—5.
Salzburg (6) 16—6 (28—5 — 30—6),
Z = (6) 17—8 (29—7 — 5—9).

¹ In vier Jahren an sieben verschiedenen Tagen beobachtet, von denen zwei auf den Juli, die übrigen August fallen.

Wien (1) 11—6,
Z = (1) 6—9.

Auch im August. Ob nicht zwei Generationen?

335. *Paraponyx* Hb.

Der Falter im Juni bis August.

141. *Stratiotata* L. (*Stratiotalis*.)

Salzburg (2) 27—5 (23—5 — 31—5),
Z = (2) 16—8 (16—8 — 16—8).

Wien (1) 31—7.¹

Ob nicht zwei Generationen?

336. *Cataclysta* Hb.

142. *Lemnata* L. Juni bis August. (*Lemnalis*.)

Neutitschein Z = (1) 6—9.
Salzburg (4) 1—6 (28—5 — 5—5),
2A = (6) 12—7 (4—7 — 26—7),
Z = (7) (8—8 — 25—9).

IV. CRAMBIDAE.

342. *Crambus* F.

Die Falter erscheinen vom Mai bis September.

157. *Pascuellus* L. Ende Juni und im Juli.

Prag (1) 8—6.
Rosenau (1) 28—6.
Salzburg (2) 3—6 (2—6 — 5—6),
Z = (3) 23—7 (10—7 — 6—8).
Wien (1) 24—6.

Schon Anfangs Juni.

158. *Silvellus* H. Juli, August. (*Adippellus*.)

Neutitschein (1) 16—7.
Salzburg (6) 16—6 (26—5 — 9—7),
Z = (5) 21—7 (2—7 — 19—8).

Erscheint schon im Juni.

162. *Dumetellus* H. Juni, Juli. (*Pratella*.)

Rosenau (1) 29—6.

163. *Pratellus* Cl. Von Ende Mai bis Ende Juli. (*Pratorum*.)

Brünn (10) 6—6 (25—5 — 11—6).
Gresten (3) 24—5 (23—5 — 24—5).
Hausdorf (4) 15—6 (7—6 — 23—6).
Neutitschein (3) 16—6 (12—6 — 23—6),
Z = (1) 5—9.²

¹ Kaum erste Erscheinung, eher eine der letzten.

² 2A?

- Prag (1) 11—5.!
- Salzburg (4) 18—5 (14—5 — 5—6),
 $2A = (1) 29—7$,
 $Z = (2) 5—8$ (14—8 — 17—8).
 Wien (2) 4—6 (4—6 — 4—6).
 Auch noch im August und vielleicht zwei Generationen.
164. *Nemorellus* H. Ende Mai, Juni.
 Rosenau (1) 24—5.
166. *Hortuellus* H. Juni, Juli. (*Cespitella*.)
 Rosenau (1) 28—6.
 Salzburg (2) 21—6 (13—6 — 29—6),
 $Z = (2) 12—7$ (11—7 — 14—7).
167. *Chrysonuchellus* Scp. Mai, Juni. (*Campella*.)
 Kaschau (1) 21—5 (20—5 — 22—5).
 Rosenau (4) 11—5 (2—5 — 20—5).
 Salzburg (4) 19—5 (16—5 — 25—5),
 $Z = (2) 8—6$ (2—6 — 14—6).
 Wien (7) 18—5 (7—5 — 3—6),
 $Z = (3) 24—6$ (14—6 — 4—7),
 $2A = (1) 27—8$.
 $Z = (1) 21—9$.
 Zuweilen eine zweite Generation im September.
168. *Rorellus* L. (*Chrysonuchella*, *Cassentiniellus*.)
 Wien (2) 27—5 (20—5 — 4—6),
 $Z = (1) 24—6$.
169. *Culmellus* L. Juni, Juli. (*Straminella*.)
 Salzburg (10) 20—7 (9—7 — 11—8),
 $Z = (10) 21—8$ (13—8 — 1—9).
 Erst im Juli und August.
180. *Conchellus* V. Juli, August. (*Stenziellus*.)
 Bozen (1) 2—6.
 Schon im Juni, wenigstens im Süden.
181. *Pinetellus* L. Im Juli und August. (*Conchella*.)
 Salzburg (1) 28—6,¹
 $Z = (1) 6—8$.
183. *Margaritellus* H. Im Juli bis August.
 Hausdorf (2) 18—6 (10—6 — 27—6).
 St. Jakob (1) 30—6.
 Rosenau $Z = (1) 8—9$.
 Schon im Juni.

¹ 3500' Seehöhe.

192. *Fascelinellus* H. Von Mitte Juni bis in den August. (? *Pedricolellus*.)
 Wien (1) 23—6.
200. *Tristellus* V. Vom Juli bis September. (*Aquilellus*, *Culmella*, *Paleella*.)
 Brünn (2) 22—6 (20—6 — 24—6),
 (2) 9—8 (8—8 — 10—8).
 Gresten (3) 10—8 (8—8 — 12—8).
 Kessen (1) 8—6!.
 Rosenau $Z = (1) 8—9$.
 Salzburg (8) 1—8 (21—7 — 19—8),
 $Z = (4) 22—9$ (7—9 — 3—10).
 Wien (1) 21—8,
 $Z = (3) 16—9$ (10—9 — 21—9).
202. *Inquinatellus* V. Im Juni und Juli.
 Neutitschein (1) 1—8.
 Salzburg (4) 25—7 (9—7 — 6—8),
 $Z = (6) 18—8$ (29—7 — 24—8).
 Wien $Z = (1) 14—9$.
 Erst im Juli und August.
203. *Luteellus* V. Im Juni und Juli. (*Exoletella*, *Ochrella*.)
 Prag (1) 13—6.
 Rosenau (1) 30—6.
 Salzburg $Z = (2) 19—8$ (16—8 — 22—8).
 Wien (3) 23—6 (14—6 — 1—7),
 $Z = (1) 24—8$.
 Auch noch im August.
204. *Lithargyrellus* Hb. Im August und September.
 Salzburg (1) 25—8.
205. *Perlellus* Scp. Im Juni bis August. (Var. *Warringtonellus*.)
 Brünn (7) 20—6 (7—6 — 30—6).
 Neutitschein (1) 23—6,
 $Z = (1) 28—8$.
 Rosenau (1) 23—7.
 Salzburg (8) 22—6 (30—5 — 11—7),
 $Z = (8) 7—8$ (25—7 — 7—9).
 Wien (1) 30—6.
 Wilten (1) 6—3!!.

V. PHYCIDEAE.

345. *Diorycetria* Zll.209. *Simplicella* V.Salzburg (1) 26—7.¹348. *Salebria* Zll.221. *Semirubella* Scp. Juli. (*Carnella*, *Sanguinella*.)

Brünn (4) 11—7 (4—7 — 18—7).

Gresten (4) 21—7 (9—7 — 6—8).

Neutitschein (2) 13—7 (11—7 — 16—7),

Z = (1) 18—8.

Prag (1) 11—7.

Rosenau Z = (1) 10—8.

Salzburg (4) 20—7 (17—7 — 25—7).

Wien (3) 14—7 (11—7 — 16—7).

Auch noch im August.

229. *Obductella* F. R. Im Juli und August. (*Origanella*.)

Neutitschein (1) 1—8.

349. *Pempelia* Hb.233. *Ornatella* V. Juli, August. (*Criptella*.)

Neutitschein (1) 12—7.

354. *Hypochalcia* Hb.241. *Ahenella* V. Juni, Juli. (*Aeneella*, Var. *Luridella*.)

Rosenau (1) 24—5.

359. *Myelois* Zll.258. *Rubrotibiella* F. R. Im Juli.

Neutitschein (1) 11—7.

267. *Cribrum* V. Juni bis August. (*Cribrella*.)

Linz (1) 23—6.

370. *Ephestia* Gn.294. *Elutella* Hb. Juni bis August.

Salzburg (2) 11—6 (9—6 — 13—6),

Z = (2) (5—7 — 11—8).

VI. GALERIAE.

372. *Melissoblastes* Zll.299. *Anellus* V. Im August. (*Sociella*.)Brünn (6) 3—6 (25—5 — 11—6)!.
Schon im Juni.¹ Gezogen.373. *Aphomia* Hb.300. *Colonella* L. Juni bis September. (*Tribunella*.)

Neutitschein (1) 9—6.

Salzburg (4) 26—6 (2—6 — 16—7),

Z = (2) (19—7 — 12—8).

374. *Galleria* F.301. *Melonella* L. In zwei Generationen, im Frühlinge und im Juli und August.

Rosenau (1) 12—4,

2A = (1) 9—7.

H. Tineidae.

XXIII. ATYCHINA.

377. *Atychia*.1. *Appendiculata* Esp. Im Mai bis Juli.

Wien (1) 23—6.

XXIV. TINEINA.

Die Flugzeit der meisten Tineinen fällt in die Monate Mai bis August, später erscheinen nur noch wenige Arten, eine nicht unerhebliche Anzahl überwintert. Eine doppelte Generation kommt bei vielen, namentlich den kleinen Arten vor.

III. TINEIDAE.

384. *Euplocamus* Ltr.

Die Falter im Juni und Juli.

19. *Fuesslinellus* Slz. (*Anthracinella*, *Anthracina*.)

Brünn (6) 24—5 (16—5 — 7—6).

Gresten (4) 26—5 (21—5 — 3—6).

Kaschau (1) 20—5.

Linz (1) 22—5.

Rosenau (3) 15—5 (4—5 — 25—5).

Erscheint zuerst im Mai.

387. *Tinea* L.29. *Tapeziella* L. Der Schmetterling im Juni und Juli, auch im Herbst. (*Tapezella*.)

Kessen (1) 14—6,

Z = (1) 19—7.

39. *Granella* L. Im April und Mai, und wieder von Ende Juni bis August.

Agram (1) 28—3.

Salzburg Z = (1) 8—6.¹Wien Z = (2) 24—5 (20—5 — 28—5).¹¹ 2A?

54. *Spretella* V. Im Mai und Juni, und wieder im October. (*Fuscipunctella*.)

Salzburg (1) 29—5.

390. *Incurvaria* Hw.

74. *Oelmanniella* Tr. Ende Mai bis Juli. (*Trimaculella*, *Rubella*.)

Wien (1) 17—5.

392. *Nemophora* Hb.

Die Schmetterlinge fliegen gegen Abend von Ende April bis Juni.

86. *Swammerdammella* L. Ende April und im Mai.

Brünn (9) 9—4 (15—3 — 10—5).

Freistadt Z = (1) 10—6.¹

Gresten (4) 5—5 (1—5 — 8—5).

Rosenau (2) 27—4 (25—4 — 29—4),

Z = (1) 18—5.

Salzburg Z = (2) 19—6 (13—6 — 25—6).¹

Wien (3) 9—5 (2—5 — 17—5).

Zuweilen schon im März und auch noch im Juni; vielleicht dann als zweite Generation.

88. *Schwarziella* Zll. Schon im April.

Salzburg (1) 13—5.

91. *Metaxella* Hb. Von Ende Mai bis in den Juli.

Salzburg (2) 10—5 (6—5 — 14—5).

Wien (1) 17—5.

Zuerst schon Anfangs Mai.

IV. ADELIDAE.

Die Falter vom Mai bis August, im Sonnenschein fliegend.

393. *Adela* Ltr.

96. *Mazzelella* H. Im Juni.

Salzburg (1) 9—6.

99. *Degeerella* L. Ende Mai bis Anfang Juli. (*Geerella*.)

Brünn (8) 7—6 (25—5 — 17—6).

Hausdorf (6) 21—6 (4—6 — 1—7).

St. Jakob (1) 29—6.

Kaschau (1) 30—5.

Linz (3) 9—6 (4—6 — 16—6).

Neutitschein (3) 18—6 (11—6 — 22—6).

Salzburg (7) 21—6 (13—6 — 5—7),

Z = (1) 6—8.

Wien (2) 28—5 (18—5 — 7—6).

Auch noch im Juli.

¹ 2 A ?

101. *Sulzeriella* Zll. Ende Mai und Juni. (*Sulzella*, Var. *Laqueatella*.)

Rosenau (2) (8—5 — 14—6).

Salzburg (1) 18—5.

Wien (1) 18—5.

Schon Anfangs Mai.

104. *Viridella* Sep. Im Mai und Juni. (*Spingiella*, Var. *Speyeri*.)

Prag 2 A = (1) 25—7.¹

Wien (1) 8—5.

394. *Nematois* Hb.

Die Falter fliegen von Mitte Juni bis in den August im Sonnenschein.

107. *Scabiosellus* Sep. (*Viridella*, Var. *Aerosellus*.)

Brünn (5) 8—6 (5—6 — 12—6).

Freistadt (2) (16—6 — 22—7).

Neutitschein (3) 14—7 (4—7 — 1—8).

Prag Z = (1) 12—8.

Salzburg (7) 13—7 (28—6 — 25—7),

Z = (5) 17—8 (4—8 — 23—8).

109. *Raddellus* H. Im Juli und August.

Salzburg (1) 26—5!.

113. *Fasciellus* F. Im Juli und August. (*Schiffermüllerella*, *Schiffermüllerellus*.)

Wien (1) 25—7.

116. *Minimellus* V.

Kessen (1) 2—6.

VIII. HYPONOMEUTIDAE.

Die Schmetterlinge fliegen Abends oder Nachts.

403. *Hyponomeuta* Ltr.

144. *Plumbellus* V. Im Juli und August.

Neutitschein (2) 7—8 (6—8 — 8—8).

145. *Irrorellus* Hb. Im Juli.

Salzburg (1) 7—7.²

146. *Variabilis* Zll. Im Juli. (*Padella*.)

Neutitschein (1) 16—7.

Wien (1) 30—7,

Z = (1) 26—8.

¹ Z?

² An diesem Tage erhalten von Herrn Richter R. R.

149. *Evonymellus* Sep. Im Juli und August. (*Cagnagella*, *Cognatella*, *Evonymi*, ? *Padella*.)

Brünn (1) 15—6 (5—6 — 20—6).

Gresten (3) 5—7 (4—7 — 7—7).

Linz (1) 17—6.

Prag (1) 23—7.

Rosenau (1) 8—8.

Salzburg (6) 1—7 (18—6 — 11—7),

$Z = (6) 2-9 (28-8 - 9-9)$.

Schon im Juni.

151. *Padi* Zll. Im Juli und August. (*Evonymella*.)

Iglau (1) 2—7.

Kessen (2) 9—7 (6—7 — 13—7).

Linz (1) 4—7.

Salzburg (3) 2—7 (25—6 — 16—7).

Wien (1) 17—7.

XI. PLUTELLIDAE.

407. *Plutella* Schr.

Die Schmetterlinge haben meist zwei Generationen.

157. *Porrectella* L. Im Mai und Juli. (*Hesperidella*.)

Salzburg (5) 27—5 (15—5 — 22—6),

$2A = (4) 29-7 (14-7 - 11-8)$,

$Z = (4) 8-10 (29-9 - 17-10)$.

408. *Cerostoma* Ltr.

Die Falter im Juli und August, einzelne Arten bis zum Herbst und nach der Überwinterung im ersten Frühjahr.

164. *Sequellum* L.

Salzburg (1) 25—6,

$Z = (2) (6-9 - 21-10)$.

165. *Radiatellum* Dn. (*Variella*, *Fissella*, *Lutarella*, *Byssinella*, *Unitella*, *Fulvella*.)

Prag (2) 31—3 (29—3 — 2—4).

177. *Xylostellum* L. (*Harpella*.)

Salzburg (1) 13—7,

$Z = (1) 12-9$.

XI. CHIMABACCHIDAE.

412. *Chimabache* Zll.

182. *Fagella* V. April bis Juni.

Prag (1) 10—4 (6—4 — 15—4).

Rosenau (1) 16—3.

Salzburg (1) 18—4.

Wien (1) 11—4.

XII. GELECHIDAE.

Die Arten fliegen in der Dunkelheit.

413. *Semioscopis* Hb.

Im ersten Frühling.

186. *Steinkellneriana* V.

Wien (1) 19—4.

414. *Psecadia* Hb.

190. *Bypunctella* F. Im Mai und August. (*Echiella*.)

Brünn (2) 25—4 (25—4 — 25—4).

Prag (1) 19—5.

192. *Funerella* F. Ende Mai und Anfangs Juni.

Wien (1) 27—5.

416. *Depressaria* Hw.

Die Arten leben sehr versteckt und überwintern.

207. *Arenella* V. Vom August an.

Linz $Z = (1) 4-3$.

230. *Applana* F. Vom Ende Juli an. (*Applanella*, *Cicutella*.)

Neutitschein (2) 20—8 (20—8 — 21—8).

267. *Nervosa* St. Vom August an. (*Aprilla*, *Daucella*.)

Linz $Z = (1) 8-3$.

418. *Gelechia* Zll.

Die Schmetterlinge erscheinen vom Mai bis in den August.

277. *Rhombella* V. Im Juli.

Neutitschein (3) 16—8 (14—8 — 21—8).

420. *Bryotropha*.

340. *Terrella* V. (*Zephyrella*, *Inulella*.)

Wien (1) 28—5.

422. *Teleia*.

408. *Fugacella* Zll. Im Juni.

Salzburg $Z = (1) 21-7$.

Wien (1) 24—6.

426. *Nannodia*.

Die Falter im Mai und wieder im August.

423. *Stipella* H. (Var. *Naeviferella*.)

Salzburg (1) 13—6.

435. *Lamprotes*.

Die Schmetterlinge im Juli.

463. *Unicolorella* H. S.

Wien (1) 12—5!.

437. *Acanthophila*.484. *Alacella* Zll. Im Juli.

Wien (1) 19—7.

438. *Tachyptilia*.

Die Schmetterlinge im Juli und August.

485. *Populella* L. (*Blattariella*, *Fuliginella*.)

Brünn (3) 21—6 (16—6 — 27—6).

Rosenau (1) 18—7.

Wien (2) 3—7 (30—6 — 7—7),

Z = (1) 6—9.

486. *Scintillella* F. R. (*Brunneella*.)

Salzburg (2) 21—7 (16—7 — 26—7).

454. *Pleurota* Hb.

Flug gegen Abend.

541. *Pyropella* V. Ende Mai bis Juli.

Wien (2) 17—5 (14—5 — 20—5),

Z = (2) 29—6 (24—6 — 4—7).

458. *Hypercallia* Stph.

Flug Abends.

551. *Christierna* L. Im Juni und Juli. (*Christierna*, *Christiernini*.)

Salzburg (1) 2—7,

Z = (1) 4—8.

465. *Harpella* Schr.

Flug in der Dämmerung.

565. *Proboscidella* Sulz. Im Juli und August. (*Majorella*.)

Brünn (2) 7—4 (4—4 — 11—4),

2 A = (2) 7—7 (4—7 — 11—7).

Gresten 2 A = (3) 19—7 (17—7 — 20—7).

Rosenau (1) 14—7.

466. *Dasycera* Hw.569. *Sulphurella* F. Im April. (*Orbonella*.)

Wien (1) 29—4,

Z = (1) 4—10.

Entweder zwei Generationen, oder überwintert.

472. *Pancalia* Crt.603. *Leuwenhoekella* L. Im Mai und Juni, und wieder im August. (*Schmidtella*.)

Wien (3) 6—5 (4—5 — 8—5),

2 A = (1) 19—7.

(Fritsch.)

XIII. GLYPHIPTERIGIDAE.

Die Schmetterlinge fliegen am Tage.

473. *Glyphipteryx* Hb.607. *Thrasonella* Sep. Im Juni und Juli. (*Sepella*, *Aillyella*, *Equitella* var., ? *V. Cladiella*.)

Salzburg (1) 18—5.

Wien (1) 27—5.

XV. LAVERNIDAE.

487. *Stathmopoda* Stph.650. *Pedella* L. Im Juli. (*Angustipennella*.)

Wien (1) 19—7.

XVI. BUTALIDAE.

Die Schmetterlinge fliegen meist bei Tage. Alle haben nur eine Generation.

494. *Butalis* Tr.691. *Laminella* H. S. Im Juni und Juli.

Salzburg (1) 30—6.

XVII. ELACHISTIDAE.

Die Schmetterlinge fliegen Abends um Sonnenuntergang.

498. *Elachista* Sep.710. *Cingillella* H. S. Im Mai und Juni.

Salzburg (3) 24—6 (6—6 — 6—7).

Im Juni und Juli.

715. *Taeniatella* Stph. Im Mai und Juni. (*Gangabella*.)

Salzburg Z = (1) 6—7.

724. *Immolatella* Zll. Juli.

Salzburg (1) 20—5!.

726. *Pollutella* H. S. Im April und Mai.

Wien (4) 29—4 (22—4 — 7—5).

727. *Rudectella* H. S. Im Mai bis Juli.Salzburg¹ (1) 15—4,

Z = (1) 28—7.

XVIII. DOUGLASIDAE.

Sie fliegen gegen Abend.

501. *Tinagma* Zll.791. *Perdicellum* Zll. Im Juni und Juli.

Gresten (1) 14—5.

¹ In meiner Wohnung.

XXII. BATRACHEDRAE.

Flug Abends.

507. *Batrachedra* Stph.807. *Praeangusta* Hw. Im Juli. (*Turdipenella*.)

Wien (1) 19—7.

XXIII. AUGASMIDAE.

508. *Augasma* H. S.809. *Aeratellum* Zll. Im Juni und Juli.

Wien Z = (1) 13—8.

XXIV. COLEOPHORIDAE.

Die Schmetterlinge vom Mai bis August, die oft eine lange Flugzeit haben. Eine doppelte Generation kommt nicht vor.

510. *Coleophora* Zll.813. *Laricella* H. (*Argyropenella*.)

Hausdorf (3) 3—6 (30—5 — 10—6).

Hochwald (1) 25—5.

St. Jakob (3) 11—6 (28—5 — 21—6),

Z = (1) 10—7.

835. *Binderella* Kollar. Im Juni.

Wien (2) 17—6 (11—6 — 24—6).

846. *Frischella* L. Die Falter im Juli.

Salzburg (2) (13—4 — 19—5),

2 A = (1) 2—7.

Wien (1) 17—5.

Zwei Generationen.

853. *Ornatipenella* Hb. Im Juni und Juli.

Gresten (2) 24—5 (24—5 — 24—5).

927. *Alpicola* Wk. Juli.

Salzburg (1) 5—8.

928. *Lineariella* Zll. Von Ende Mai bis September.

Salzburg (1) 15—8.

XXV. GRACILARIDAE.

Die Schmetterlinge fliegen in der Dämmerung. Die Arten haben in der Regel eine doppelte Generation.

513. *Coriscium* Zll.

Die Schmetterlinge im Herbst, oft überwintert, gewöhnlich nur in einer Generation.

989. *Remotellum* Wk. (? *Roscipennella*.)

Salzburg (1) 19—6!

514. *Ornix* Zll.

Die Schmetterlinge erscheinen Ende April und im Mai, und wieder im Juli.

990. *Gutea* Hw. Im April und Mai, und wieder im Juli und August. (*Guttiferella*.)

Wien (1) 8—6.

999. *Avellanella* Stph. Im Mai und August.

Linz (1) 13—3!

XXVI. ARGYRESTHIDAE.

Die Schmetterlinge vom Juni an, grösstentheils nur in einer Generation.

518. *Argyresthia* Hb.

Die Schmetterlinge vom Juni bis September.

1014. *Mendica* Hw. Vom Ende Mai bis Juli. (*Cae-siella*, *Tetrapodella*.)

Salzburg (1) 26—6.

XXVII. LITHOCOLLETIDAE.

Die Schmetterlinge fliegen Abends.

520. *Lithocolletis* Zll.

Die Falter haben wohl alle eine doppelte Generation, gewöhnlich im Mai und August; bei einigen Arten entwickeln sich die Schmetterlinge der Herbstbrut noch im October und überwintern.

1113. *Tremulae* Zll. (*Populifoliella*, *Tremulella*.)

Salzburg 2 A = (3) 5—8 (1—8 — 12—8).

Wien Z = (1) 16—10.

XXIX. PHYLLOCNISTIDAE.

528. *Bucculatrix* Zll.1145. *Boyerella* Dup. Im Mai, Juni und August.

Wien (1) 18—5.

XXX. NEPTICULIDAE.

531. *Nepticula* Zll.

Die meisten Arten haben zwei Generationen, im Frühjahr und im Sommer. Eine kleinere Zahl hat nur eine Generation, deren Falter Ende Mai und im Juni fliegen.

1172. *Ruficapitella* Hw.

Salzburg (1) 16—5.

1175. *Atricapitella* Hw.

Salzburg (1) 1—5.

XXV. MICROPTERIGINA.

532. *Eriocephala* Crt.

Die Falter fliegen im Sonnenschein.

1. *Calthella* L. Im Mai.

Salzburg (1) 14—5.

Wien (3) 12—5 (6—5 — 17—5).

7. *Anderschella* H. S. Im Mai. (*Allionella* var. d. e.)

Brünn (7) 3—4 (20—3 — 9—4).

Gresten (4) 5—5 (21—4 — 21—5).

Neutitschein (3) 9—4 (5—4 — 18—4).

Schon im April.

8. *Rothembachii* Frey. Im Frühling.Salzburg $Z = (1)$ 9—6.

I. Pterophoridae.

XXVI. PTEROPHORINA.

538. *Oxyptilus* Zll.15. *Kollari* Stph. Am Grossglockner und am Stilsersjoch Ende Juli und im August.

Salzburg (1) 14—5.

18. *Pilosellae* Zll. Vom Juni bis August.

Salzburg (1) 6—7.

539. *Mimaeseoptilus* Wallgr.28. *Coprodactylus* Zll. Alpen, im Juli.

Salzburg (1) 23—5.

32. *Pterodactylus* L. Im Juni und Juli. (*Fuscus*, *Ptilodactyla*.)

Brünn (9) 11—4 (3—4 — 26—4),

 $2A = (1)$ 10—6.¹Lemberg $Z = (1)$ 19—10.

Linz (1) 1—3,

 $Z = (1)$ 29—10.Neutitschein $2A = (3)$ 4—7 (29—6 — 12—7).

Prag (1) 30—4.

Rosenau (2) (24—4 — 23—5),

 $Z = (2)$ (13—9 — 5—11).Salzburg $Z = (1)$ 17—9.

Wien (1) 4—4,

 $Z = (2)$ (15—9 — 3—11).

Schon im März und April, dann noch im September und October. Wenigstens zwei Generationen.

543. *Aciptilia* Hb.51. *Xanthodactyla* Tr. (*Xerodactylus*.)

Salzburg (1) 15—5.

52. *Baliodactyla* Zll. Im Juli.Salzburg $Z = (1)$ 23—10¹.¹ 2A?53. *Tetradactyla* L. Juni bis August.

Brünn (1) 15—6 (15—6 — 16—6).

Neutitschein (2) 10—4 (4—4 — 17—4),

 $2A = (3)$ 14—7 (11—7 — 16—7).Salzburg $2A = (1)$ 2—8, $Z = (1)$ 14—10.

Wien (1) 27—5.

Schon im April und noch im September. Zwei Generationen.

55. *Ischnodactyla* Tr. Im Juni und August.

Salzburg (2) (21—5 — 22—6).

Schon im Juni.

56. *Pentadactyla* L. Mai bis September.

Agram (2) 22—5 (17—5 — 28—5).

Brünn (10) 17—5 (7—5 — 25—5).

Hausdorf $2A = (1)$ 12—7.St. Jakob $2A = (1)$ 18—7.

Kaschau (1) 24—6.

Lemberg (1) 28—6.

Linz (4) 16—6 (11—6 — 20—6).

Neutitschein (2) 8—6 (7—6 — 9—6).

Prag (2) 11—5 (2—5 — 21—5),

 $2A = (1)$ 14—7, $Z = (1)$ 18—8.

Rottalowitz (2) (14—4 — 10—5),

 $2A = (2)$ (20—6 — 13—7).

Salzburg (2) 17—6 (8—6 — 26—6),

 $2A = (2)$ 11—7 (10—7 — 12—7), $Z = (1)$ 1—8.

Wien (6) 31—5 (8—5 — 17—6),

 $2A = (3)$ 29—7 (20—7 — 10—8).

Wahrscheinlich zwei Generationen, aber beide schwer zu trennen. Zuweilen schon im April, dagegen nicht im September beobachtet.

XXVII. ALUCITINA.

544. *Alucita* Zll.4. *Hexadactyla* L. Vom Juli ab bis zum nächsten Frühjahr. (*Polydactyla*.)

Brünn (3) 3—6 (1—6 — 4—6).

Neutitschein (1) 18—6,

 $2A = (4)$ 16—8 (13—8 — 19—8).Prag $2A = (1)$ 4—9.¹

Schon im Juni, und zwei Generationen.

¹ Z?

<i>Batis</i>	10	<i>Leporina</i>	17	<i>Rostralis</i>	499
<i>Bicolorana</i>	479	<i>Leucophaea</i>	124	<i>Rufina</i>	264
<i>Bractea</i>	452	<i>Libatrix</i>	297	<i>Rumicis</i>	26
<i>Brassicae</i>	118	<i>Ligustri</i>	31	<i>Rurea</i>	47
<i>Brunnea</i>	332	<i>Linariae</i>	168	<i>Salicalis</i>	492
<i>Captiuncula</i>	465	<i>Lithargyrea</i>	217	<i>Satellitica</i>	303
<i>Cespitis</i>	127	<i>Lithoxylea</i>	56	<i>Saucia</i>	365
<i>Chenopodii</i>	107	<i>Litura</i>	268	<i>Scolopacina</i>	46
<i>Chi</i>	83	<i>Lucida</i>	406	<i>Scrophulariae</i>	187
<i>Chrysitis</i>	455	<i>Lucifuga</i>	183	<i>Scutosa</i>	394
<i>Cinerea</i>	364	<i>Lucipeta</i>	360	<i>Simulans</i>	350
<i>Circumflexa</i>	449	<i>Luctuosa</i>	407	<i>Socia</i>	153
<i>Citrigo</i>	290	<i>Lunaris</i>	425	<i>Sonchi</i>	180
<i>Clavis</i>	386	<i>Maura</i>	140	<i>Sphinx</i>	247
<i>C. nigrum</i>	334	<i>Megacephala</i>	30	<i>Sponsa</i>	422
<i>Coeruleocephala</i>	11	<i>Menyanthidis</i>	25	<i>Strigilis</i>	40
<i>Comta</i>	95	<i>Meticulosa</i>	137	<i>Strigosa</i>	18
<i>Conigera</i>	219	<i>Mi</i>	410	<i>Suasa</i>	112
<i>Coryli</i>	13	<i>Moneta</i>	456	<i>Suffusa</i>	389
<i>Croceago</i>	296	<i>Myrtilli</i>	403	<i>Sulphuralis</i>	467
<i>Cruda</i>	252	<i>Nebulosa</i>	123	<i>Taraxaci</i>	226
<i>Cubicularis</i>	234	<i>Neglecta</i>	325	<i>Tarsicrinalis</i>	487
<i>Cucubali</i>	97	<i>Nictitans</i>	288	<i>Tenebrata</i>	404
<i>Cuspis</i>	22	<i>Nupta</i>	419	<i>Tentacularis</i>	496
<i>Deceptorica</i>	463	<i>Obeliscia</i>	369	<i>Testacea</i>	75
<i>Dentina</i>	104	<i>Obesalis</i>	500	<i>Tragopoginis</i>	307
<i>Dersa</i>	9	<i>Obsoleta</i>	210	<i>Trapezina</i>	280
<i>Derivalis</i>	497	<i>Ochreago</i>	271	<i>Tridens</i>	20
<i>Didyma</i>	45	<i>Ochroleuca</i>	69	<i>Trigrammica</i>	242
<i>Dipsacea</i>	395	<i>Ocularis</i>	6	<i>Triplasia</i>	434
<i>Duplaris</i>	7	<i>Oleagina</i>	149	<i>Typica</i>	141
<i>Dysodea</i>	106	<i>Oleracea</i>	114	<i>Umbra</i>	287
<i>Electa</i>	418	<i>Orion</i>	16	<i>Umbratica</i>	179
<i>Elocata</i>	420	<i>Ornithopus</i>	158	<i>Urticae</i>	432
<i>Emortualis</i>	484	<i>Oxalina</i>	272	<i>Vaccinii</i>	301
<i>Erythrocephala</i>	300	<i>Oxyacanthae</i>	150	<i>Verbasci</i>	186
<i>Euphorbiae</i>	27	<i>Paleacea</i>	277	<i>Vernana</i>	480
<i>Exclamationis</i>	383	<i>Pallens</i>	208	<i>Veronicae</i>	299
<i>Exoleta</i>	160	<i>Paludicola</i>	195	<i>Viciae</i>	429
<i>Festucac</i>	457	<i>Paranympha</i>	415	<i>Ypsilon</i>	73
<i>Fimbria</i>	311	<i>Perla</i>	32		
<i>Flavicornicta</i>	86	<i>Persicariae</i>	117		
<i>Flavicornis</i>	3	<i>Perspicillaris</i>	132		
<i>Fluxa</i>	200	<i>Petrorhiza</i>	81		
<i>Fraxini</i>	424	<i>Pinastri</i>	142		
<i>Fulvago</i>	293	<i>Pisi</i>	116		
<i>Furuncula</i>	41	<i>Plecta</i>	373		
<i>Gamma</i>	444	<i>Polymita</i>	85		
<i>Genistae</i>	110	<i>Polyodon</i>	55		
<i>Gilvago</i>	294	<i>Popularis</i>	126		
<i>Glauc</i>	102	<i>Prasinana</i>	478		
<i>Glyphica</i>	411	<i>Proboscidalis</i>	501		
<i>Gothica</i>	250	<i>Promissa</i>	421		
<i>Graminis</i>	244	<i>Pronuba</i>	316		
<i>Hyperici</i>	134	<i>Psi</i>	21		
<i>I. cinctum</i>	249	<i>Pyrulina</i>	283		
<i>Illustris</i>	437	<i>Pyramidea</i>	309		
<i>Incerta</i>	257	<i>Pyrarga</i>	464		
<i>Interrogationis</i>	447	<i>Radiosa</i>	133		
<i>Jota</i>	445	<i>Ravida</i>	355		
<i>Laccata</i>	477	<i>Rhomboidea</i>	335		

E. GEOMETRAE.

<i>Abietaria</i>	115
<i>Aceraria</i>	399
<i>Adustata</i>	90
<i>Advenaria</i>	18
<i>Aemulata</i>	322
<i>Aeruginaria</i>	131
<i>Aescularia</i>	398
<i>Albicillata</i>	296
<i>Albulata</i>	289
<i>Alchemillata</i>	276
<i>Alniaria</i>	7
<i>Alpinaria</i>	56
<i>Alternata</i>	22
<i>Amataria</i>	140
<i>Angularia</i>	9
<i>Angulata</i>	226
<i>Arenacearia</i>	76
<i>Atomaria</i>	84
<i>Aureolaria</i>	200

<i>Aversata</i>	179	<i>Honoraria</i>	3	<i>Repandata</i>	114
<i>Bajaria</i>	69	<i>Illunaria</i>	15	<i>Reticulata</i>	234
<i>Berberata</i>	256	<i>Immorata</i>	169	<i>Rhomboidaria</i>	118
<i>Betularia</i>	62	<i>Impluviata</i>	249	<i>Rivata</i>	279
<i>Bicolorata</i>	295	<i>Incanata</i>	178	<i>Rivulata</i>	284
<i>Bilineata</i>	261	<i>Innotata</i>	339	<i>Roboraria</i>	113
<i>Bimaculata</i>	73	<i>Jacobaearia</i>	33	<i>Roraria</i>	79
<i>Bipunctaria</i>	228	<i>Leucophaearia</i>	68	<i>Rubidata</i>	257
<i>Blandiata</i>	291	<i>Lichenaria</i>	109	<i>Rubiginata</i>	170
<i>Brumata</i>	396	<i>Liturata</i>	24	<i>Rufaria</i>	194
<i>Brunnearia</i>	221	<i>Lunaria</i>	14	<i>Rupestrata</i>	297
<i>Brunneata</i>	81	<i>Luridata</i>	221	<i>Rupicaprararia</i>	67
<i>Caesiata</i>	310	<i>Lutearia</i>	31	<i>Sambucaria</i>	26
<i>Certata</i>	320	<i>Macularia</i>	28	<i>Satyrata</i>	359
<i>Cerusaria</i>	159	<i>Margaritaria</i>	1	<i>Sertata</i>	214
<i>Chaerophyllata</i>	203	<i>Marginata</i>	47	<i>Sexalata</i>	218
<i>Chenopodiata</i>	225	<i>Minorata</i>	290	<i>Signaria</i>	23
<i>Cinctaria</i>	113	<i>Molluginata</i>	275	<i>Signata</i>	333
<i>Clathrata</i>	87	<i>Montanata</i>	273	<i>Silaceata</i>	232
<i>Coarctaria</i>	220	<i>Murinaria</i>	77	<i>Straminata</i>	187
<i>Comitata</i>	227	<i>Mutata</i>	163	<i>Strataria</i>	61
<i>Commutata</i>	151	<i>Nigropunctata</i>	153	<i>Strigillaria</i>	72
<i>Consortaria</i>	120	<i>Notata</i>	21	<i>Strobilata</i>	383
<i>Corylata</i>	246	<i>Obliterata</i>	391	<i>Suffumata</i>	255
<i>Crataegata</i>	27	<i>Obscurata</i>	93	<i>Sylvata</i>	388
<i>Crepuscularia</i>	121	<i>Ocellata</i>	272	<i>Sylvestrata</i>	158
<i>Cyanata</i>	311	<i>Ochreatea</i>	193	<i>Syringaria</i>	12
<i>Dealbata</i>	30	<i>Olivata</i>	267	<i>Temerata</i>	74
<i>Debiliata</i>	381	<i>Omicronaria</i>	149	<i>Tetralunaria</i>	13
<i>Decolorata</i>	288	<i>Paludata</i>	167	<i>Thymiaria</i>	135
<i>Defoliaria</i>	64	<i>Papilionaria</i>	129	<i>Tophaceata</i>	308
<i>Designata</i>	259	<i>Pectinataria</i>	250	<i>Transversata</i>	321
<i>Dilectaria</i>	43	<i>Pendularia</i>	148	<i>Trilinearia</i>	143
<i>Dilucidaria</i>	97	<i>Perochraria</i>	192	<i>Tristata</i>	280
<i>Dilutata</i>	314	<i>Petraria</i>	37	<i>Truncata</i>	247
<i>Dimidiata</i>	173	<i>Pilosaria</i>	59	<i>Ulmaria</i>	46
<i>Dolabraria</i>	17	<i>Plagiata</i>	209	<i>Umbellaria</i>	154
<i>Dubitata</i>	319	<i>Plumaria</i>	110	<i>Unangulata</i>	278
<i>Elinguaria</i>	6	<i>Polycommata</i>	212	<i>Undulata</i>	317
<i>Emarginata</i>	182	<i>Populata</i>	235	<i>Vertumnaria</i>	57
<i>Econymaria</i>	16	<i>Porrinata</i>	138	<i>Vespertaria</i>	19
<i>Exanthemaria</i>	71	<i>Praeformata</i>	210	<i>Vetutata</i>	316
<i>Fasciaria</i>	2	<i>Procellata</i>	294	<i>Vibicaria</i>	141
<i>Ferrugata</i>	263	<i>Progemmaria</i>	66	<i>Virgata</i>	219
<i>Fimbriata</i>	136	<i>Pruinata</i>	128	<i>Virgulata</i>	152
<i>Fluctuata</i>	293	<i>Prunaria</i>	29	<i>Viridata</i>	137
<i>Fuliginaria</i>	127	<i>Prunata</i>	231	<i>Wawaria</i>	78
<i>Fulvata</i>	238	<i>Pullata</i>	96	<i>Zonaria</i>	55
<i>Furvata</i>	92	<i>Pulveraria</i>	39		
<i>Fuscata</i>	393	<i>Punctaria</i>	142		
<i>Galiata</i>	270	<i>Punctulata</i>	89		
<i>Gilvaria</i>	38	<i>Purpuraria</i>	394		
<i>Glabraria</i>	112	<i>Pusaria</i>	70		
<i>Glarearia</i>	88	<i>Pusillata</i>	177		
<i>Glaucinata</i>	94	<i>Putataria</i>	130		
<i>Griseata</i>	207	<i>Pyrallata</i>	236		
<i>Grossulariata</i>	45	<i>Quadriannulata</i>	271		
<i>Halterata</i>	217	<i>Quadrifasciaria</i>	260		
<i>Hastata</i>	287	<i>Quercinaria</i>	10		
<i>Hirtaria</i>	60	<i>Rectangulata</i>	380		
<i>Holosericeata</i>	188	<i>Remutata</i>	157		

F. TORTRICIDAE.

<i>Aceriana</i>	372
<i>Apicella</i>	409
<i>Arcuana</i>	235
<i>Aurofasciana</i>	130
<i>Autumnana</i>	21
<i>Badiana</i>	411
<i>Baumanniana</i>	126
<i>Brunnichiana</i>	266
<i>Centrana</i>	52
<i>Chrysanthæana</i>	93
<i>Cinctana</i>	61

<i>Cirsiana</i>	267	<i>Viburnana</i>	69	<i>Porphyralis</i>	63
<i>Comitana</i>	291	<i>Viridana</i>	67	<i>Pratellus</i>	163
<i>Coniferana</i>	336	<i>Wahlbomiana</i>	94	<i>Prunalis</i>	93
<i>Contaminana</i>	31	<i>Zoëgana</i>	107	<i>Purpuralis</i>	64
<i>Corticana</i>	382	G. PYRALIDES.		<i>Repandalis</i>	72
<i>Corylana</i>	42			<i>Rorellus</i>	168
<i>Cynosbatella</i>	188	<i>Aerealis</i>	110	<i>Rubrotibiella</i>	258
<i>Diversana</i>	58	<i>Ahenella</i>	241	<i>Ruralis</i>	80
<i>Dorsana</i>	325	<i>Ambigualis</i>	20	<i>Sambucalis</i>	86
<i>Favillaceana</i>	87	<i>Anellus</i>	299	<i>Sanguinalis</i>	67
<i>Ferrugana</i>	25	<i>Anguinalis</i>	57	<i>Semirubella</i>	221
<i>Flavana</i>	68	<i>Angustalis</i>	4	<i>Silvellus</i>	158
<i>Forsterana</i>	48	<i>Atralis</i>	37	<i>Simplicella</i>	209
<i>Fractifasciana</i>	390	<i>Aurata</i>	62	<i>Sophialis</i>	130
<i>Fuligana</i>	200	<i>Austriacalis</i>	104	<i>Sticticalis</i>	120
<i>Gemmiferana</i>	316	<i>Cespitalis</i>	66	<i>Stramentalis</i>	127
<i>Germarana</i>	369	<i>Chrysonuchellus</i>	167	<i>Stratitotata</i>	141
<i>Gnomana</i>	81	<i>Cingulata</i>	58	<i>Tristellus</i>	200
<i>Gouana</i>	88	<i>Colonella</i>	300	<i>Truncicolella</i>	29
<i>Hamana</i>	106	<i>Conchellus</i>	180	<i>Urticata</i>	52
<i>Hartmanniana</i>	183	<i>Cribrum</i>	267	<i>Verticalis</i>	119
<i>Heparana</i>	46	<i>Crocealis</i>	85	H. TINEIDAE.	
<i>Hohenwarthiana</i>	308	<i>Culmellus</i>	169		
<i>Hypericana</i>	314	<i>Dentalis</i>	49	<i>Aeratellum</i>	809
<i>Lacteana</i>	300	<i>Dumetellus</i>	162	<i>Alacella</i>	484
<i>Lacunana</i>	223	<i>Elutella</i>	294	<i>Alpicola</i>	927
<i>Lecheana</i>	50	<i>Extimalis</i>	125	<i>Anderschella</i> XXV. F.	7
<i>Ministrana</i>	65	<i>Falcatalis</i>	61	<i>Appendiculata</i>	1
<i>Mussehlana</i>	147	<i>Farinalis</i>	11	<i>Applana</i>	230
<i>Naevana</i>	414	<i>Fascelinellus</i>	192	<i>Arenella</i>	207
<i>Nigricana</i>	293	<i>Flammealis</i>	12	<i>Atricapitella</i>	1175
<i>Niveana</i>	18	<i>Forficilis</i>	123	<i>Avellanella</i>	999
<i>Olivana</i>	217	<i>Frequentella</i>	30	<i>Binderella</i>	835
<i>Osseana</i>	89	<i>Fruentalis</i>	129	<i>Bipunctella</i>	190
<i>Petiverella</i>	416	<i>Hortuellus</i>	166	<i>Boyerella</i>	1145
<i>Piniana</i>	171	<i>Hyalinalis</i>	78	<i>Calthella</i> XXV. F.	1
<i>Politana</i>	60	<i>Inquinalis</i>	202	<i>Christiennana</i>	551
<i>Pomonella</i>	349	<i>Lemnata</i>	142	<i>Cingilella</i>	710
<i>Profundana</i>	178	<i>Limbilis</i>	69	<i>Degerella</i>	99
<i>Pruniana</i>	189	<i>Lithargyrellus</i>	204	<i>Evonymellus</i>	149
<i>Rhediella</i>	370	<i>Literata</i>	132	<i>Fagella</i>	182
<i>Roborana</i>	286	<i>Lupulina</i>	76	<i>Fasciellus</i>	113
<i>Rolandriana</i>	73	<i>Luteellus</i>	203	<i>Frischella</i>	846
<i>Rosana</i>	39	<i>Margaritellus</i>	183	<i>Fuësslinellus</i>	19
<i>Rubicundana</i>	83	<i>Mellonella</i>	301	<i>Fugacella</i>	408
<i>Rupestrana</i>	224	<i>Nemorellus</i>	164	<i>Funerella</i>	192
<i>Rusticana</i>	72	<i>Noctuella</i>	121	<i>Granella</i>	39
<i>Scutulana</i>	268	<i>Nymphaeata</i>	139	<i>Guttea</i>	990
<i>Sorbiana</i>	39	<i>Obductella</i>	229	<i>Immolatella</i>	724
<i>Sponsana</i>	9	<i>Octomaculata</i>	56	<i>Irrorellus</i>	145
<i>Striana</i>	176	<i>Ornatella</i>	233	<i>Laminella</i>	691
<i>Tesserana</i>	128	<i>Ostrinalis</i>	65	<i>Laricella</i>	813
<i>Textana</i>	201	<i>Pandalis</i>	77	<i>Leuwenhoeckella</i>	603
<i>Tortricella</i>	100	<i>Pascuella</i>	157	<i>Lineariella</i>	928
<i>Trimaculana</i>	399	<i>P. rlellus</i>	205	<i>Mazzolella</i>	96
<i>Tripunctana</i>	285	<i>Phoeoleuca</i>	27	<i>Mendica</i>	1014
<i>Uddmanniana</i>	239	<i>Phrygialis</i>	41	<i>Metaxella</i>	91
<i>Umana</i>	104	<i>Pinetellus</i>	181	<i>Minimellus</i>	116
<i>Upupana</i>	402	<i>Pinguinalis</i>	6	<i>Nervosa</i>	267
<i>Urticana</i>	222	<i>Politalis</i>	128	<i>Oelmanniella</i>	74
<i>Vari-gana</i>	13	<i>Pollinalis</i>	46	<i>Ornatipennella</i>	853

<i>Padi</i>	151	<i>Ruficapitella</i>	1172	<i>Variabilis</i>	146
<i>Pedella</i>	650	<i>Scabiosellus</i>	107	<i>Viridella</i>	104
<i>Perdicellum</i>	791	<i>Schwarziella</i>	88	<i>Xylostellum</i>	177
<i>Plumbellus</i>	144	<i>Scintillella</i>	486		
<i>Pollutella</i>	726	<i>Sequellum</i>	164		
<i>Populella</i>	485	<i>Spretella</i>	54		
<i>Porrectella</i>	157	<i>Steinkellneriana</i>	186		
<i>Praeangusta</i>	807	<i>Stipella</i>	423		
<i>Proboscidea</i>	565	<i>Sulphurella</i>	569		
<i>Pyropella</i>	541	<i>Sulzeriella</i>	101		
<i>Raddellus</i>	109	<i>Swammerdammella</i>	86		
<i>Radiatellum</i>	165	<i>Tapeziella</i>	29		
<i>Remotellum</i>	989	<i>Terella</i>	340		
<i>Rhombella</i>	277	<i>Thrasonella</i>	607		
<i>Rothenbachii</i> XXV. F.	8	<i>Tremulae</i>	1113		
<i>Rudectella</i>	727	<i>Unicolorella</i>	463		

I. PTEROPHORIDAE.

<i>Baliodactyla</i>	52
<i>Coprodactylus</i>	28
<i>Hexadactyla</i> XXVII. F.	4
<i>Ischnodactyla</i>	55
<i>Kollari</i>	15
<i>Pentadactyla</i>	56
<i>Pilosellae</i>	18
<i>Pterodactylus</i>	32
<i>Tetradactyla</i>	53
<i>Xanthodactyla</i>	51

Index der an den einzelnen Stationen beobachteten Arten.

	B. <i>Sphinges.</i>							Igló.	36.	43.					
Admont.	36.	47.	49.					Innsbruck.	1.	9.	12.	14.	34.	36.	*38.
Agram.	1.	36.	*38.	42.	43.	46.	47.		39.	43.	46.	47.	48.	49.	50.
	49.	50.	52.	53.	76.	79.			52.	53.	57.	59.	66.	68.	76.
Altenburg (Ung-).	36.							Kalksburg.	49.						
Bärn.	76.							Kaschau.	1.	33.	36.	*38.	39.	42.	43.
Bania.	49.								46.	47.	48.	50.	53.	57.	59.
Baumgartenberg.	43.	78.						60.	76.						
Biala.	36.	*38.	42.	43.	47.	48.	49.	Kesmark.	50.						
	50.	52.	53.	55.				Kessen.	9.	36.	38.	*38.	47.	49.	50.
Bludenz.	36.	49.	76.						52.	59.	68.	76.			
Bozen.	36.	38.	*38.	47.	53.			Kirchdorf.	36.	52.	53.	57.	76.		
Bregenz.	33.	36.	38.	39.	43.	47.	48.	Korneuburg.	49.						
	49.	50.	52.	53.	57.	76.	78.	Kremsier.	36.	42.	43.	46.	47.	48.	49
Brünn.	1.	6.	9.	11.	21.	23.	31.		50.	52.	53.	76.			
	33.	34.	36.	*38.	39.	42.	43.	Kremsmünster.	36.	43.	49.	52.	76.		
	46.	47.	48.	49.	50.	52.	53.	Lemberg.	1.	34.	36.	52.			
	55.	57.	59.	60.	64.	66.	68.	Lesina.	36.						
	72.	76.	78.	79.				Leutschau.	43.	50.	52.	76.			
Budweis.	36.	*38.	42.	48.	52.	53.	59.	Linz.	32.	33.	36.	37.	*38.	42.	43.
Bugganz.	36.	60.	76.						46.	47.	48.	49.	50.	52.	53.
Cilli.	14.	34.	36.	49.	53.	76.			57.	59.	60.	76.	78.	79.	
St. Florian.	36.							Melk.	*38.	50.	52.	53.			
Freistadt.	1.	34.	36.	39.	46.	48.	50.	Mistek.	50.	52.	76.				
	52.	53.	59.	60.	64.	66.		Neusohl.	36.	43.	46.	50.	52.	53.	
Gresten.	33.	36.	48.	59.	60.	71.	76.	Neutitschein.	1.	12.	21.	36.	39.	43.	46.
	79.								47.	49.	50.	52.	53.	57.	60.
Hausdorf.	32.	36.	57.	59.	60.	74.	76.		76.	78.					
Hochwald.	68.							Nikolsburg.	52.						
St. Jakob.	17.	36.	47.	57.	59.	60.	64.	Oberhaag.	36.	49.					
	76.							Oberschützen.	36.						
Iglau.	1.	33.	36.	*38.	39.	43.	47.	Prag.	33.	36.	59.	60.	66.	68.	76.
	48.	50.	52.	53.	55.				78.	79.					

Pressburg.	9.	36.	*38.	49.	52.		
Raab.	52.						
Rosenau (Gömör).	1.	4.	6.	14.	21.	33.	36.
	*38.	39.	43.	47.	49.	50.	52.
	53.	59.	60.	68.	72.	76.	
Rottalowitz.	4.	36.	43.	47.	49.	52.	59.
	60.	68.	76.	78.			
Salzburg.	3.	5.	9.	14.	16.	31.	32.
	33.	34.	36.	*38.	39.	41.	42.
	43.	46.	47.	48.	49.	50.	57.
	59.	60.	66.	68.	71.	76.	78.
Schässburg.	36.	49.					
Senftenberg.	36.	*38.	43.	47.	48.	52.	53.
	60.	76.					
Taufers.	36.	43.	46.	47.	48.	50.	52.
	53.	60.	76.				
Troppau.	1.	36.	39.	42.	43.	47.	50.
	52.	53.	60.	76.			
Trotzberg.	12.	17.	32.				
Weissbriach.	49.						
Wien.	11.	32.	33.	34.	36.	42.	43.
	47.	49.	50.	52.	53.	55.	57.
	60.	66.	68.	72.	76.	78.	79.
Wilten.	36.	49.					

C. Bombyces.

Admont.	9.						
Agram.	1.	47.	49.	52.	55.	64.	67.
	76.	102.	120.	123.	125.	146.	157.
Bärn.	67.						
Baumgartenberg.	152.						
Biala.	1.	51.	*52.	55.	60.	61.	67.
	78.	79.	105.	113.	118.	120.	123.
	146.	154.					
Botzen.	1.	47.	173.				
Bregenz.	1.	49.	51.	55.	60.	61.	62.
	64.	78.	84.	94.	100.	105.	111.
	117.	118.	120.	131.	146.	151.	152.
	154.						
Brünn.	1.	4.	7.	9.	22.	33.	42.
	43.	47.	48.	49.	51.	*52.	52.
	55.	58.	60.	61.	63.	65.	67.
	70.	71.	78.	79.	81.	94.	95.
	96.	97.	99.	102.	104.	105.	108.
	110.	113.	115.	117.	118.	120.	123.
	124.	125.	126.	127.	131.	132.	134.
	135.	137.	139.	140.	143.	145.	146.
	148.	150.	151.	152.	154.	157.	158.
	162.	166.	176.	177.	181.	191.	193.
Budweis.	1.	49.	55.	57.	60.	67.	78.
	105.	117.	120.	124.	125.	126.	131.
	134.	135.	146.	151.			
Bugganz.	47.	51.	78.	146.	157.		

(Fritsch.)

Cilli.	33.	48.	49.	51.	55.	61.	78.
	145.						
Freistadt.	1.	9.	22.	28.	49.	51.	52.
	58.	60.	63.	71.	78.	105.	118.
	120.	124.	126.	135.	140.	143.	146.
	148.	151.	177.	191.			
Gresten.	1.	33.	51.	105.	113.	115.	151.
	176.	191.					
Hausdorf.	22.	23.	51.	55.	56.	120.	
Hochwald.	51.	124.					
St. Jakob.	48.	146.					
Iglau.	1.	52.	67.	105.	118.	120.	134.
	146.	150.	157.				
Igló.	51.	120.					
Innsbruck.	1.	4.	22.	24.	25.	44.	49.
	51.	52.	60.	63.	67.	78.	105.
	120.	125.	132.	134.	151.	177.	191.
Kaschau.	1.	47.	48.	49.	51.	*52.	55.
	67.	120.	123.	125.	131.	132.	143.
	146.	151.	152.	154.	157.		
Kessen.	25.	33.	51.	56.	61.	62.	67.
	78.	102.	108.	118.	120.	124.	125.
	146.	151.	152.				
Kirchdorf.	1.	78.	124.	146.	151.		
Korneuburg.	47.						
Kremsier.	1.	47.	49.	52.	55.	65.	67.
	78.	120.	123.	124.	125.	126.	131.
	132.	139.	146.				
Leibitz.	52.						
Lemberg.	52.						
Leutschau.	9.	51.	55.	78.	126.	191.	
Linz.	1.	9.	44.	46.	47.	51.	*52.
	54.	55.	60.	61.	63.	68.	70.
	71.	105.	113.	115.	118.	120.	123.
	124.	125.	126.	131.	134.	135.	139.
	140.	146.	148.	151.	152.	154.	155.
	162.	163.	168.	172.	176.	177.	191.
	192.	193.					
Mediasch.	47.						
Melk.	4.	47.	49.	51.	67.	78.	120.
	132.	137.					
Mistek.	120.	154.					
Neusohl.	49.	51.	63.	78.	105.	120.	157.
Neutitschein.	1.	9.	33.	46.	51.	55.	58.
	63.	67.	78.	79.	97.	104.	105.
	110.	113.	115.	117.	123.	124.	125.
	131.	134.	135.	139.	146.	151.	162.
	163.	176.	177.				
Nikolsburg.	47.	48.	105.	132.	150.	157.	
Oberhaag.	47.						
Oberschützen.	49.	151.					

	424.	425.	444.	445.	449.	455.	463.	Kaschau.	28.	45.	60.	67.	84.	87.	88.
	467.	479.	487.	492.	495.	496.	497.		121.	140.	141.	167.	200.	209.	228.
									399.						
Rottalowitz.	297.	316.	411.	415.	419.	420.	444.	Kessen.	70.	203.					
	455.							Kirchdorf.	27.	45.	203.				
Salzburg.	6.	7.	10.	11.	20.	26.	39.	Kremsier.	29.	45.	62.	84.	87.	141.	
	40.	41.	45.	52.	55.	56.	73.	Kremsmünster.	45.	396.					
	83.	95.	97.	110.	112.	114.	116.	Lemberg.	46.	396.					
	117.	118.	124.	126.	127.	132.	137.	Linz.	2.	6.	9.	12.	15.	26.	27.
	150.	153.	179.	183.	186.	217.	219.		28.	29.	45.	46.	47.	55.	59.
	225.	226.	234.	244.	250.	268.	271.		60.	62.	66.	70.	81.	84.	87.
	272.	280.	283.	287.	296.	297.	307.		90.	118.	119.	128.	140.	142.	149.
	309.	316.	323.	334.	335.	365.	373.		169.	203.	209.	214.	225.	235.	236.
	382.	389.	404.	409.	410.	411.	418.		260.	261.	270.	272.	276.	281.	294.
	419.	421.	424.	429.	432.	434.	437.		295.	296.	310.	319.	320.	321.	393.
	444.	447.	451.	455.	456.	464.	465.		396.	398.					
	477.	478.	487.	496.	499.	500.	501.	Neutitschein.	7.	13.	18.	19.	23.	26.	27.
Senftenberg.	419.								28.	29.	30.	31.	45.	47.	60.
Taufers.	444.								62.	70.	78.	84.	87.	90.	92.
Troppau.	386.	411.	424.	444.					113.	114.	121.	141.	158.	167.	178.
Trotzberg.	180.								192.	203.	209.	223.	225.	226.	228.
Wien.	7.	13.	20.	26.	30.	32.	45.		232.	234.	235.	246.	249.	250.	255.
	55.	95.	107.	114.	118.	124.	158.		260.	261.	263.	270.	272.	273.	275.
	179.	226.	249.	257.	288.	296.	303.		279.	280.	284.	289.	293.	314.	317.
	316.	334.	382.	406.	407.	410.	411.		319.	380.	396.	398.			
	419.	424.	444.	467.	480.			Nikolsburg.	394.						
E. Geometrae.								Prag.	45.	60.	62.	81.	87.	90.	113.
Agram.	45.	280.							121.	128.	136.	157.	167.	209.	226.
Bärn.	45.								228.	272.	275.	279.	398.		
Baumgartenberg.	225.							Rosenau.	1.	14.	17.	18.	22.	24.	26.
Brünn.	3.	7.	13.	14.	15.	17.	18.		27.	28.	29.	30.	33.	39.	45.
	19.	22.	23.	26.	27.	28.	29.		47.	60.	61.	62.	70.	72.	73.
	30.	38.	45.	60.	62.	64.	69.		77.	78.	79.	81.	84.	87.	89.
	70.	78.	81.	84.	87.	89.	90.		93.	98.	113.	114.	118.	121.	128.
	109.	110.	113.	114.	119.	120.	121.		129.	135.	136.	137.	140.	141.	142.
	127.	128.	131.	136.	140.	141.	142.		143.	148.	152.	153.	163.	167.	169.
	158.	167.	170.	192.	200.	209.	220.		170.	177.	179.	182.	193.	194.	200.
	221.	223.	225.	226.	228.	231.	232.		207.	217.	225.	228.	231.	235.	236.
	235.	249.	250.	255.	259.	260.	261.		250.	257.	261.	263.	271.	272.	273.
	263.	270.	272.	275.	279.	280.	281.		276.	278.	279.	280.	284.	293.	295.
	284.	289.	293.	314.	319.	333.	339.		314.	319.	380.	381.	391.	393.	394.
	380.	388.	393.	394.	396.	398.	399.	Rottalowitz.	396.	398.					
Budweis.	13.	45.	87.	263.	272.	276.		Salzburg.	84.	87.	89.	231.			
Freistadt.	15.	26.	27.	30.	60.	64.	81.		1.	7.	10.	13.	21.	27.	28.
	84.	87.	140.	203.					29.	30.	37.	46.	47.	61.	66.
Gresten.	16.	27.	29.	45.	68.	84.	87.		68.	70.	71.	74.	76.	78.	84.
	137.	163.	193.	203.	223.	273.	276.		87.	90.	94.	96.	109.	112.	114.
	291.	314.	393.	396.	398.				115.	118.	119.	120.	121.	127.	130.
Hausdorf.	28.	62.	113.	115.					136.	138.	140.	151.	153.	154.	157.
St. Jakob.	28.	62.	113.						158.	159.	167.	169.	173.	178.	179.
Iglau.	45.	81.	396.						188.	194.	203.	209.	210.	218.	223.
Innsbruck.	12.	29.	56.	61.	62.	81.	84.		225.	226.	227.	228.	231.	236.	246.
	129.								247.	250.	261.	263.	267.	271.	272.
									273.	275.	276.	280.	284.	288.	289.
									290.	291.	293.	294.	296.	297.	308.
									316.	319.	321.	322.	359.	380.	381.
									383.	393.	396.	398.			

Senftenberg.	62.						
Troppau.	29.	45.	57.	84.	320.	396.	
Wien.	7.	9.	14.	27.	28.	29.	30.
	43.	45.	47.	60.	62.	66.	68.
	70.	71.	77.	84.	87.	88.	89.
	90.	110.	113.	121.	128.	136.	140.
	141.	149.	158.	163.	167.	169.	170.
	177.	187.	188.	192.	194.	200.	207.
	209.	212.	219.	226.	228.	236.	238.
	249.	256.	261.	272.	279.	280.	289.
	293.	310.	319.	394.	398.		

Wilten.	45.						
---------	-----	--	--	--	--	--	--

F. *Tortricidae*.

Agram.	67.						
Brünn.	46.	67.	106.	222.	223.	266.	268.
	349.						
Cilli.	87.						
Gresten.	87.	88.	100.	126.	128.	147.	235.
	291.	314.	390.	411.			
St. Jakob.	336.						
Kessen.	88.	94.	106.	128.	235.		
Neutitschein.	31.	46.	61.	67.	89.	100.	106.
	126.	171.	178.	217.	222.	233.	266.
	268.	308.					

Prag.	106.						
Rosenau.	39.	81.	93.	106.	189.	222.	
Salzburg.	9.	13.	18.	21.	25.	38.	42.
	46.	48.	52.	58.	68.	69.	72.
	73.	83.	88.	94.	100.	104.	106.
	107.	126.	128.	130.	176.	188.	200.
	201.	223.	224.	235.	239.	267.	268.
	285.	293.	300.	314.	316.	325.	349.
	369.	370.	382.	409.	411.	414.	416.
Wien.	25.	46.	50.	60.	65.	67.	94.
	106.	126.	183.	188.	223.	268.	286.
	372.	399.	402.	409.	416.		

G. *Pyralides*.

Admont.	123.						
Bozen.	180.						
Brünn.	11.	20.	52.	62.	64.	77.	78.
	80.	119.	123.	130.	132.	139.	163.
	200.	205.	221.	299.			
Gresten.	52.	64.	66.	132.	163.	200.	221.
Hausdorf.	119.	163.	183.				
St. Jakob.	119.	183.					
Iglau.	11.						
Kaschau.	52.	86.	132.	167.			
Kessen.	132.	200.					
Linz.	6.	11.	52.	62.	78.	119.	267.

Melk.	58.						
Neutitschein.	4.	11.	20.	52.	64.	77.	78.
	80.	93.	119.	123.	127.	130.	132.
	139.	142.	158.	163.	202.	205.	221.
	229.	233.	258.	300.			

Prag.	11.	52.	66.	80.	157.	163.	203.
	221.						

Rosenau.	6.	11.	41.	46.	52.	57.	62.
	64.	66.	76.	77.	85.	119.	121.
	132.	157.	162.	164.	166.	167.	183.
	200.	203.	205.	221.	241.	301.	

Salzburg.	6.	12.	20.	27.	29.	30.	37.
	41.	52.	56.	57.	61.	62.	63.
	64.	65.	66.	67.	69.	72.	77.
	78.	80.	86.	93.	110.	119.	120.
	121.	123.	125.	128.	129.	130.	132.
	139.	141.	142.	157.	158.	163.	166.
	167.	169.	181.	200.	202.	203.	204.
	205.	209.	221.	294.	300.		

Troppau.	6.	11.					
Wien.	20.	37.	41.	46.	49.	52.	56.
	62.	66.	77.	80.	119.	120.	121.
	129.	132.	139.	141.	157.	163.	167.
	168.	192.	200.	202.	203.	205.	221.

Wilten.	205.						
---------	------	--	--	--	--	--	--

H. *Tineidae*.

Agram.	39.						
Brünn.	19.	86.	99.	107.	149.	190.	485
	565.	XXV.	7.				

Freistadt.	86.	107.					
Gresten.	19.	86.	149.	565.	791.	853.	
	XXV.	7.					

Hausdorf.	99.	813.					
Hochwald.	813.						
St. Jakob.	99.	813.					

Iglau.	151.						
Kaschau.	19.	99.					
Kessen.	29.	116.	151.				

Linz.	19.	99.	149.	151.	207.	267.	999.
Neutitschein.	99.	107.	144.	146.	230.	277.	
	XXV.	7.					

Prag.	104.	107.	149.	165.	182.	190.	
Rosenau.	19.	86.	101.	149.	182.	485.	565.

Salzburg.	39.	54.	86.	88.	91.	96.	99.
	101.	107.	109.	145.	149.	151.	157.
	164.	177.	182.	408.	423.	486.	551.
	607.	691.	710.	715.	724.	727.	846.
	927.	928.	989.	1014.	1113.	1172.	1175.
	XXV.	1.	8.				

Wien.	1.	39.	74.	86.	91.	99.	101.
	104.	113.	146.	151.	182.	186.	192.
	340.	408.	463.	484.	485.	541.	569.

603. 607. 650. 726. 807. 809. 835. 846. 990. 1113. 1145. XXV. 1.

I. *Pterophoridae.*

| | |
|------------|-----------------------|
| Agram. | 56. |
| Brünn. | 32. 53. 56. XXVII. 4. |
| Hausdorf. | 56. |
| St. Jakob. | 56. |
| Kaschau. | 56. |
| Lemberg. | 32. 56. |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Linz. | 32. 56. |
| Neutitschein. | 32. 53. 56. XXVII. 4. |
| Prag. | 32. 56. XXVII. 4. |
| Rosenau. | 32. |
| Rottalowitz. | 56. |
| Salzburg. | 15. 18. 28. 32. 51. 52. 53. 55. 56. |
| Wien. | 32. 53. 56. |

B. Frequenz und Vertheilung im Laufe des Jahres (nach Beobachtungen in Salzburg).

Alles in der Einleitung dieses Abschnittes im ersten Theile meiner Arbeit Angeführte, findet im Allgemeinen auch hier Anwendung.

Die Wiener Beobachtungen sind jedoch nicht mehr berücksichtigt. Erwiesen sie sich schon nicht vollständig genug für die Tagfalter, *Rhopalocera*, so konnte um so weniger erwartet werden, dass sie für die Nachtfalter, *Heterocera*, ausreichen; zumal sie eigentlich nur auf die Bestimmung der ersten und letzten Erscheinungszeiten und nur indirect auf die jährliche Frequenz und Vertheilung gerichtet waren.

Bei den Salzburger Beobachtungen hingegen war dies von Jahr zu Jahr immer mehr der Fall. Auch konnte noch der Jahrgang 1878 hinzugefügt werden, welcher vorzugsweise der eifrigen und nachhaltigen Unterstützung meines Sohnes zu danken ist und zu den reichhaltigsten der ganzen Reihe gehört.

Die Beobachtungen umfassen daher im

| | | | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| Jänner | 6 Jahre | Mai | 6 Jahre | September | 8 Jahre |
| Februar | 6 „ | Juni | 10 „ | October | 6 „ |
| März | 6 „ | Juli | 13 „ | November | 6 „ |
| April | 6 „ | August | 14 „ | December | 6 „ |

Diese Zahlen stellen die Divisoren der monatlichen Tagessummen der Erscheinungszeiten von allen Jahren zusammen dar, die Frequenzzahlen in den folgenden Registern sind die Quotienten hieraus und machen die Zahl der Tage (in Decimalien) ersichtlich, an welchen die einzelnen Arten im Mittel sämtlicher Jahre in den einzelnen Monaten erschienen sind.

Die Schwärmer der Gattung *Sphinx*, denn die Arten der übrigen Gattungen fliegen fast ausschliessend am Tage, wurden von 1866—1871 ausser der gewöhnlichen Beobachtungszeit (am Tage) während der Abenddämmerung in einem offenen Hausgarten, vorzugsweise auf blühender *Saponaria officinalis* und *Hesperis matronalis* schwebend beobachtet. Für diese Gattung umfassen die Beobachtungen desshalb nur etwa fünf Jahrgänge, wesshalb die Frequenzzahlen verhältnissmässig zu gross ausgefallen sind. Auf den jährlichen Gang derselben hat dies jedoch keinen Einfluss.

Theilweise hätte ich auch bei Eulen so verfahren können, sowie bei den Zünslern, welche sehr oft mit den Schwärmern Abends fliegend angetroffen worden sind. Da jedoch viele andere wieder tagsüber vorkamen, so habe ich die Frequenzzahlen für diese Ordnung auf dieselbe Weise wie für die übrigen abgeleitet, da der jährliche Gang der Frequenzzahlen hiedurch ebenfalls nicht alterirt worden ist, wenn sie auch kleiner ausfielen und nicht für alle Arten unter sich vergleichbar sind. Zu der allerdings wünschenswerthen Sonderung der Arten nach der täglichen Flugzeit fehlen leider die Notizen in meinem Zettelkataloge der Beobachtungen.

Eine solche Sonderung nahm ich auch nicht rücksichtlich jener Arten vor, welche ich mittelst eines Essigstellers von Schierl (Schmetterlingsselbstfänger) fing,¹ welchen ich zwei Jahrgänge einen Theil des

¹ Ich verdanke den Apparat der Vermittlung des Herrn Custos A. Rogenhofer.

Sommers hindurch aufgestellt hatte. Fast ohne Ausnahme fing ich mit denselben nur Eulen. Das folgende Verzeichniss dieser Fänge dürfte von Interesse sein.

Agronicta Rumicis von 19. bis 26. August 1871 an 4 Tagen 7 Stück. Maximum an einem Tage 3 St.

Agrotis Baja am 6. August 1875. 1 St.

„ *C. nigrum* am 4. August 1875. 1 St.

„ *Plecta* am 23. Juli 1875. 1 St.

„ *Pronuba* am 30. Juli und 4. August 1875 je 1 St.

Amphipyra Pyramidea von 19. August bis 8. September 1871 an 9 Tagen 10 St. Maximum an einem 2 St.

Von 25. Juli bis 14. August 1875. 12 St. Maximum an einem Tage 5 St.

Caradrina Taraxaci am 24. und 27. Juli 1875. 3 St. Maximum an einem Tage 2 St.

Catocala Electa von 19. August bis 23. September 1871 an 11 Tagen 18 St. Maximum an einem Tage 4 St.

Von 22. Juli bis 22. August 1875 an 14 Tagen 23 St. Maximum an einem Tage 4 St.

Catocala Fraxini am 7. und 10. September 1875 je 1 St.

„ *Nupta* von 2.—15. September 1871 an 4 Tagen 4 St. Von 25.—31. Juli 1875 an 3 Tagen 5 St. Maximum an einem Tage 3 St.

Catocala Promissa am 27. Juli 1875. 1 St.

Cuculia Lucifuga am 23. August 1871. 1 St.

Cymatophora Ocularis von 6.—14. August 1875 an 3 Tagen je 1 St.

Hadena Didyma von 22.—30. Juli 1875 an 6 Tagen 6 St. zusammen.

„ *Lithoxylea* von 26.—27. Juli 1875 2 St.

„ *Polyodon* von 22.—31. Juli 1875 an 5 Tagen 7 St. Maximum an einem 3 St.

Miselia Oxyacanthae am 7. August und 20. October 1871 2 St.

Thyatira Batis am 19. August 1871. 1 St.

Im Ganzen von 7. August bis 2. October 1871 und 22. Juli bis 10. September 1875 nur 18 Arten Eulen in 112 Exemplaren.

Von Spinnern fing ich nur *Gnophria Quadra* am 29. Juli 1875, von Rhopaloceren: *Apartura Iris* am 14. August 1871.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass bei permanenter Aufstellung des Selbstfängers und gleichförmiger Constitution der gährenden Flüssigkeit schöne Beobachtungsreihen für den jährlichen Gang der Frequenz einzelner Arten der Falter gewonnen werden könnten, besonders für solche, welche man nicht anderwärts antrifft, wie z. B. in meinen Versuchen bei *Catocala Electa*, zu deren Beobachtung sich mir keine andere Gelegenheit darbot.

Für die Nachttiere ist aber auch noch die Anwendung anderer Fangmethoden wünschenswerth, wenn die Beobachtungen nicht auf verhältnissmässig wenige Arten beschränkt bleiben sollen.

Überhaupt ist es in dieser Hinsicht wünschenswerth, die Beobachtungen immer in derselben Localität und auf gleiche Weise anzustellen. Als ich in den Jahren 1864—1871 auf dem Lande wohnte, war ich nicht wenig erstaunt über die grosse Menge der Falter, welche in den Sommermonaten an jedem Abend durch das offene Fenster dem Lichte in meiner Wohnung zuflogen — mehr noch über die Regelmässigkeit, mit welcher in einander folgenden Jahren die Zeit eingehalten wurde, nicht allein die Tages-, sondern auch Jahreszeit. Es sei mir gestattet, einige Fälle anzuführen.

So beobachtete ich *Neuronia (Hadena) Popularis* 1864 am 5. September, 1865 am 31. August, 1866, 1867 und 1869 immer genau am 30. August, in Mehrzahl und mit grossem Ungestüm anfliegend.

Obgleich ich in den Jahren 1864, 1866 und 1867 erst etwa um die Mitte September von Salzburg abreiste, so beobachtete ich diese Eule dennoch nur 1867 an anderen Tagen, als jenen der ersten Erscheinung, nämlich am 2., 4. und 9. September. Sie scheint demnach nur eine sehr kurze Schwärmezeit zu haben.

Es waren lauter Männchen.

Von dem bekannten Spinner *Phragmatobia fuliginosa* kamen am 25. Juli 1865 6 St. ins Zimmer geflogen, am 19. Juli 1866 4 St., am 21. Juli 1870 1 St. Aber in dem sehr späten Jahre 1871 erst am 18. August.

Eine kleine Motte, *Lithocolletis Tremulae* erschien am 1. August 1865 in grosser Menge an den Wänden meines Wohnzimmers, an demselben Tage, aber nur einzeln auch 1869. Im Jahre 1866 hingegen bemerkte ich sie erst den 12. August und ebenfalls in grosser Menge.

Wie genau sich die Erscheinungszeiten bestimmen lassen, wenn die Beobachtungen immer in derselben Localität angestellt werden, davon liefert der bekannte Spinner, *Hepialus Sylvinus* ein schönes Beispiel. Derselbe erscheint immer gegen Ende August auf den Wiesen in der nächsten Nähe des von mir früher bewohnten Landhauses plötzlich in grosser Menge am Abend über den Wiesen schwärmend. Die Tage der ersten Erscheinung waren 1866 am 26., 1868 am 22., 1875 am 23., 1876 am 22., 1877 am 27. August, nur 1878, in welchem Jahre die erste Erscheinung wahrscheinlich versäumt worden ist, erst am 3. September.

Wenn man die Beobachtungen immer in derselben Localität anstellt, wie es die Aufgaben meiner Untersuchungen wünschenswerth erscheinen lassen, so ergibt sich auch die Gelegenheit, andere interessante Erscheinungen zu beobachten, die sonst leicht unbemerkt bleiben. Hierher gehört das Erscheinen mancher Arten in grosser Menge in einzelnen Jahren und ihre Abwesenheit in anderen. So beobachtete ich *Sphinx Porcellus*, den kleinen Weinschwärmer in der Regel immer nur einzeln und an einigen wenigen Tagen, war daher um so mehr überrascht über die erstaunliche Menge im J. 1868.

Zwischen 8—9 Uhr Abends stellte er sich in dem genannten Jahre fast täglich auf den Blüthen des Seifenkrautes, *Saponaria officinalis* schwärmend ein. Es wurden von mir beobachtet im Juli am 17. (1), 18. (1), 19. (1), 20. (4), 21. (6), 23. (3), 25. (50)! und von meinem Sohne am 26. (4), 27. (1), 28. (2) u. s. w. Am 25. Juli beobachtete ich also 50 Exemplare in einer Stunde. Nicht unerwähnt darf ich aber lassen, dass das Seifenkraut erst in diesem Jahre gepflanzt und in früheren Jahren die Beobachtungen auf *Hesperis matronalis* und *Melandrium sylvestre* angestellt worden waren. Aber auch in den späteren Jahren 1870 und 1871 wurde nur an einem einzigen Tage 1 Exemplar beobachtet.

Der Windenschwärmer, *Sphinx Convolvuli* scheint in dieser Hinsicht beständiger zu sein. Von 2. August bis 12. September 1867 beobachtete ich an 9 Tagen 10 St.; von 21. Juli bis 23. August 1868 an 14 Tagen 17 St.; von 31. Juli bis 25. August 1869 an 9 Tagen 10 St.; von 30. Juli bis 8. August 1870 an 4 Tagen 5 St. und von 11. Juli bis 25. September an 7 Tagen 7 St. theils auf *Phlox paniculata*, theils auf *Saponaria officinalis* schwärmend.

Der jährliche Gang der Frequenz ist aus vier Tabellen ersichtlich: I. für die Arten. II. Gattungen. III. Familien. IV. Ordnungen. Aus einer V. entnimmt man die jährliche Vertheilung der Arten auf die einzelnen Monate.

Für die gemeinsten Arten, Gattungen und Familien dann alle Ordnungen ist der jährliche Gang der Frequenz auf 4 Tafeln graphisch dargestellt. Um eine regelmässiger Form der Curven zu erhalten, als sie sich aus der unmittelbaren Beobachtung ergeben haben würde, ist ein einfaches Interpolationsverfahren angewendet worden, nach der Formel: $\frac{1}{3}(n_{-1} + n_0 + n_{+1})$, in welcher n_{-1} die Frequenzzahl des vorhergehenden, n_{+1} jener des folgenden Monates bedeutet. Für die Ordnungen sind die so gewonnenen Frequenzzahlen mit den Abweichungen von den Beobachtungswerthen $B-R$ ersichtlich.

Einige Ergebnisse.

Nach Tab. IV können in allen Monaten Schmetterlinge vorkommen, selbst im Winter, wenn sie gleich in diesem zu den Seltenheiten gehören.

Ihre Anzahl wächst regelmässig vom Jänner bis Ende Juli oder Anfangs August und nimmt dann wieder ebenso regelmässig ab. Das Maximum der Frequenz fällt in den wärmsten, das Minimum in den kältesten Monat.

Im Winter beobachtete ich nur einen Spinner, eine *Gastropacha Populi*, welcher fast ganz erstarrt an einer Hausmauer sass.

Es war am 28. Jänner 1872, die Temperatur-Extreme dieses Tages waren -5.0 und -1.6 C. Aber einige Tage früher (am 24.) war das Maximum bis auf 11.8 gestiegen, sank aber dann von Tag zu Tag.

Am 2. Februar 1877 schlüpfte eine *Cuculia Verbasii* zwischen den Fenstern meiner Wohnung aus, wenn ich nicht irre, die ich gezogen hatte, die einzige Eule, die mir in den Wintermonaten unterkam, aber eigentlich nicht hier anzuführen gewesen wäre, weil sie nicht im Freien ausgeschlüpft ist.

Am 28. December 1873 sah mein Sohn in einer Wohnung eine *Macroglossa Stellatarum* nahe am Fenster sitzend, welche sich schon im Herbst dahin zur winterlichen Ruhe geflüchtet haben kann. Aber an einem warmen sonnigen Wintertage, den ich mir zu notiren vergass, im J. 1879 beobachtete mein Sohn eine *M. Stellatarum* im Freien fliegend.

Nach diesen spärlichen Daten kann man das Vorkommen der *Heterocera* zur Winterszeit (December—Februar) im Freien füglich verneinen. *Rhopalocera* habe ich zur Winterszeit nur im Februar beobachtet (m. s. erste Abtheilung), also schon im Vorfrühling mancher Jahre, welcher zuweilen in den Februar fällt.

Bei den einzelnen Ordnungen der Schmetterlinge zeigen sich Abweichungen von dem allgemeinen Gange der Frequenzzahlen. *Tortricidae* haben das Maximum am frühesten, es fällt schon in den Mai. *Pyrallides* erreichen es im Juni. Bei den übrigen Familien fällt es conform der allgemeinen Regel in den Juli oder August. Die *Pterophoridae* können der geringen Zahl der Beobachtungen wegen hier nicht in Betracht kommen.

Das zweite Maximum, welches die Tagschmetterlinge (*Rhopalocera*) im September aufweisen, kann man mit Recht bezweifeln (m. s. erste Abtheilung).

Von den einzelnen Familien (Tab. III) erreichen ihr Maximum, wenn man nur jene Familien berücksichtigt, bei welchen es bestimmt ausgesprochen ist; eine gewisse Willkür bei der Auswahl ist kaum zu vermeiden.

März: *Brephina*.

April: *Saturnina*.

Mai: *Psychina*.

Juli: *Zygaenoidea*, *Bombycoidea*, *Liparidina*, *Lithosina*, *Hadenidae*, *Orthosidae*, *Dentrometridae*, *Botidae*.

August: *Ophiuridae*, *Phytometridae*, *Hyponomeutidae*.

September: *Plusiidae*, *Plutellidae*.

Zwei Maxima haben aufzuweisen:

Sphingina im Juli und September, *Arctioidea* im Mai und Juli, *Crambidae* im Juni und August. Sie sind jedoch nur bei der letzten dieser Familien sicher ausgeprägt. Bei den hier nicht genannten Familien sind die Beobachtungen nicht zahlreich genug, um die Monate der Maxima mit Bestimmtheit zu erkennen. Noch schwieriger wird dies aus demselben Grunde bei den Gattungen (Tab. II). Es erreichen ihr Maximum, wenn man nur jene Gattungen berücksichtigt, bei welchen es bestimmt ausgesprochen ist: Im

März: *Brephos*.

April: *Aglia*.

Mai: *Epichnopteryx*, *Venilia*, *Nemoria*, *Grapholitha*.

Juni: *Ino*, *Angerona*, *Scoria*, *Abraxas*, *Cabera*, *Odezia*, *Eupithecia*, *Minoa*, *Eurrhypara*, *Hydrocampa*, *Adela*.

Juli: *Sphinx*, *Zygaena*, *Gastropacha*, *Porthesia*, *Hadena*, *Tortrix*.

August: *Callimorpha*, *Hypena*, *Larentia*, *Hyponomeuta*.

September: *Plusia*, *Plutella*.

October: *Nomophila*.

November: *Cheimatobia*, *Cheimatophila*.

Zwei Maxima haben wahrscheinlich:

Macroglossa im Juni und September.*Arctia* „ Mai „ Juli.*Euclidia* „ Juni „ August.*Fidonia* „ April „ Juli.*Boarmia* im Mai und Juli.*Arrhostia* „ „ „ „*Botys* „ „ „ „*Crambus* „ Juni „ August.

Verhältnissmässig noch weniger entfallen von den einzelnen Arten, deren Maxima sich mit einiger Sicherheit bestimmen lassen (Tab. I). Es erreichen ihr Maximum im

März: *Brephos Notha*.April: *Agria Tau*.Mai: *Epichnopteryx Pulla*, *Arctia Menthastri*, *Venilia Macularia*, *Nemoria Porrinata*, *Grapholitha Nigricana*.Juni: *Ino Statices*, *Angerona Prunaria*, *Scoria Dealbaria*, *Abraxas Marginata*, *Nemoria Porrinata*, *Odezia Chaerophyllata*, *Minoa Fuscaria*, *Sciaphila Wahlbomiana*, *Grapholitha Pomonella*, *Eurrhyncha Urticata*, *Hydrocampa Nymphaeata*, *Crambus Sylvellus*, *C. Hortuellus*, *Adela Degeerella*.Juli: *Sphinx Elpenor*, *S. Porcellus*, *S. Ligustri*, *Zygaena Lonicerae*, *Gastropacha Quercus*, *Porthesia Chrysorrhoea*, *Chelonia Caja*, *Hadena Didyma*, *Tortrix Flavana*, *Botys Sambucalis*, *Crambus Perlellus*.August: *Sphinx Convolvuli*, *Zygaena Filipendulae*, *Epialus Sylvinus*, *Callimorpha Hera*, *Amphipyra Pyramidea*, *Catocala Electa*, *Arrhostia Sylvestrata*, *Larentia Chenopodiata*, *L. Decolorata*, *Botys Ruralis*, *Crambus Culmellus*, *C. Tristellus*, *Hyponomeuta Evonymellus*.September: *Plusia Gamma*, *Larentia Truncata*.October: *Nomophila Noctuella*.November: *Cheimatobia Brumata*, *Cheimatophila Tortricella*.

Zwei Maxima erreichen:

Macroglossa Stellatarum im Juni und September.*Fidonia Atomaria* „ April „ Juli.„ *Clathraria* „ Mai „ „*Larentia Bilineata* „ Juni „ August.*Larentia Alchemillata* im Mai und August.*Grapholitha Lacunana* „ „ „ „*Diasemia Literata* „ Juni „ „

Es sind Ergebnisse der unmittelbaren Beobachtung ohne Anwendung eines Interpolationsverfahrens, wodurch dieselben hätten vermehrt werden können in Bezug auf die Anzahl der Familien, Gattungen und Arten. In der Regel ziehe ich immer die Vervielfältigung der Beobachtungen vor, um die Anomalien im Gange der Erscheinungen zu verringern, anstatt die Lücken durch Interpolation zu entfernen; wenn ich auch nicht verkenne, dass die Ermittlung der Maxima hiedurch erschwert wird, und theilweise auch eine willkürliche ist.

Die im ganzen Jahre durch ihre Frequenz vorherrschenden Ordnungen,¹ Familien, Gattungen und Arten kann man aus den graphischen Darstellungen entnehmen.

In den einzelnen Monaten von März bis einschliesslich November sind vorherrschend² folgende Familien, wobei die in den Klammern eingeschlossenen gleich häufig wie die früher genannten sind:

März: *Brephina*.April: *Dentrometridae*, *Botidae*.¹ M. s. die geographische Darstellung, Taf. IV.² Die *Sphingina*, insbesondere die Gattung *Sphinx* und ihre Arten dürften verhältnissmässig zu hohe Frequenzzahlen haben.

- Mai: *Dentrometridae*, (*Tortricina*, *Botidae*), *Crambidae*.
 Juni: *Dentrometridae*, *Botidae*, *Phytometridae*.
 Juli: *Dentrometridae*, *Sphingina*?, *Botidae*, *Phytometridae*.
 August: *Phytometridae*, *Sphingina*?, *Botidae*.
 September: *Plusiidae*, *Sphingina*?, *Phytometridae*.
 October: *Plusiidae*, *Botidae*.
 November: (*Phytometridae*, *Tortricina*.)

Die *Dentrometridae* behaupten den übrigen Familien gegenüber ihr Übergewicht von April bis Juli, sowie die *Botidae*, die ihnen übrigens nachstehen.

Von Juni an beginnen mit ihnen die *Phytometridae* zu concurriren, welche im August an der Spitze stehen.

Im September und October sind *Plusiidae* vor den übrigen herrschend. Andere Familien concurriren nur in einzelnen Monaten u. s. w.

Da den Frequenzzahlen der *Sphingina*, soweit sie nicht tagsüber fliegen, sondern nur in der Dämmerung, ein besonderes Beobachtungssystem zu Grunde liegt, so blieben sie hier nicht weiter berücksichtigt.

Gattungen.

- März: *Brephos*.
 April: *Botys*, *Fidonia*, *Euclidia*.
 Mai: *Grapholitha*, *Larentia*, *Crambus*.
 Juni: *Crambus*, *Grapholitha*, *Larentia*.
 Juli: *Sphinx*?, *Larentia*, *Crambus*.
 August: *Larentia*, *Sphinx*?, *Crambus*, *Plusia*.
 September: *Plusia*, *Larentia*, *Sphinx*?.
 October: *Plusia*, *Nomophila*.
 November: *Cheimatobia*, (*Cheimatophila*).

Die freilich artenreichste Gattung *Larentia* wetteifert mit anderen herrschenden Gattungen von Mai bis September, erreicht aber nur im August die Spitze.

Ihr zunächst kommt die Gattung *Crambus*, welche sich von Mai bis August unter den herrschenden Familien behauptet. Dann *Plusia* im August bis October, hier und im September in erster Linie u. s. w.

Arten.

- März: *Brephos Notha*.
 April: *Bothys Cespitalis*, (*Euclidia Glyphica*, *Fidonia Atomaria*).
 Mai: *Grapholitha Lacunana*, *Crambus Pratellus*, *Eurycreon Verticalis*.
 Juni: *Crambus Pratellus*.¹
 Juli: *Sphinx Porcellus*?, (*S. Elpenor*?, *Porthesia Chrysorrhoea*, *Fidonia Clathrata*).
 August: *Sphinx Convolvuli*?, *Larentia Chenopodiata*, *L. Bilineata*, *L. Decolorata*.
 September: *Plusia Gamma*, *Macroglossa Stellatarum*, *Sphinx Convolvuli*?
 October: *Plusia Gamma*, *Nomophila Noctuella*, *Macroglossa Stellatarum*.
 November: *Cheimatobia Brumata*, *Cheimatophila Tortricella*.

Die einzelnen Arten erhalten sich höchstens zwei Monate lang als vorherrschende.

Alle diese Verhältnisse haben in der Voraussetzung ihre Geltung, dass die tägliche Flugzeit bei allen Familien, Gattungen und Arten übereinstimme. Dies ist aber nur bei einem, wenn auch beträchtlichen Theile

¹ Und einige andere, wenig hervortretende Arten.

derselben der Fall. Jene, deren Flugzeit in die Nacht fällt, sind zu wenig vertreten und konnten daher kein Übergewicht über die tagsüber fliegenden erlangen, wenn sie auch zu den häufig vorkommenden gehören. Auf den jährlichen Gang der Frequenzzahlen, welcher hier vorzugsweise im Auge behalten worden ist, ist die tägliche Flugzeit von keinem Einfluss, wenn auch die gleichzeitigen (in dieselben Monate) fallenden Frequenzzahlen verschiedener Arten, Gattungen und Familien nicht streng vergleichbar sind.

Hätte man die Beobachtungen statt am Tage in der Nacht angestellt, so würden von den Gross-Schmetterlingen die Spinner und wahrscheinlich auch die Eulen mit ihrer Frequenzzahl die Tagfalter, Schwärmer und Spanner übertroffen haben, wenn von diesen auch jene berücksichtigt worden wären, welche man nicht fliegend, sondern sitzend angetroffen hat, wie es auch vice versa geschehen ist.

Man sollte daher die einzelnen Familien in jenen Stunden beobachten, auf welche ihre Hauptflugzeit fällt, wie ich die Arten der Gattung *Sphinx* in der Abenddämmerung beobachtete. Dadurch sind die Frequenzzahlen dieser Gattung, wohl jenen der Tagfalter und des grössten Theiles der Spanner gegenüber, nicht aber in Beziehung auf die Frequenzzahlen der Spinner und Eulen vergleichbar geworden, welche viel zu klein ausfielen, vorzüglich bei den ersteren, während die letzteren ihre Flugzeit mit den Schwärmern zu theilen scheinen. Noch auffallender wären die Unterschiede, wenn die Arten der Gattung *Sphinx* auch noch in der Morgendämmerung beobachtet worden wären.

Eine theilweise Ausgleichung der Verhältnisse findet dadurch statt, dass bei allen Ordnungen der Nachtfalter (Schwärmer, Spinner etc.) Ausnahmen von der allgemeinen Regel für die tägliche Flugzeit vorkommen. Von den Schwärmern fliegen die Arten mehrerer Gattungen tagsüber. Spinner sind aber nur durch wenige Arten am Tage fliegend vertreten. Von den Eulen haben ebenfalls nicht viele ihre Flugzeit am Tage, sowie von den Spannern, welche vorwiegend tagsüber fliegen, wieder bei der Nacht. Bei exacten Beobachtungen sollten diese Verhältnisse berücksichtigt werden, obgleich es bei einem allgemeinen Beobachtungssysteme kaum möglich scheint, denselben Rechnung zu tragen, es wäre denn, dass man sich entschliessen könnte, wechselweise am Tage und bei der Nacht zu beobachten.

Die Tab. V macht die Zahl der Arten von Monat zu Monat für alle Ordnungen ersichtlich. Aus der Vergleichung der analogen Tabelle IV für die Frequenz geht Folgendes hervor.

Die meisten Arten kommen im Allgemeinen im Juli vor, in welchem Monate auch die meisten Falter fliegen. Das Maximum der Arten neigt sich aber gegen den Juni, jenes der Frequenz gegen den August.

Die Arten der *Papiliones* haben nur ein Maximum im Juli, dem 2 freilich zweifelhafte Maxima ihrer Frequenz im Juli und September gegenüberstehen.

Das Maximum der *Sphinges* und *Bombyces* fällt übereinstimmend in den Juli.

Noctuae und *Geometrae* haben die meisten Arten ebenfalls im Juli, kommen aber am häufigsten im August vor.

Tortricidae sind durch die meisten Arten im Juni repräsentirt, sind aber schon im Mai am häufigsten.

Grösser ist die Divergenz noch bei den *Pyralides*, welche erst im Juli und August durch die meisten Arten vertreten sind, während sie schon im Juni am häufigsten sind.

Tineidae haben das Maximum der Arten schon im Juni, jenes der Frequenz hingegen erst im August.

Pterophoridae lassen ihrer geringen Anzahl wegen keine Vergleichung zu.

Tab. I.

Frequenz der Arten.

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| B. Sphinges. | | | | | | | | | | | | | |
| II. SESIARIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 30. <i>Trochilia</i> (<i>Trochilium</i> Scop.) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. <i>Laphriiformis</i> | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 31. <i>Sesia</i> Lsp. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. <i>Scoliiformis</i> Bk. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 9. <i>Tipuliformis</i> L. | | | | | | 3 | 3 | | | | | | 6 |
| 14. <i>Culiciformis</i> L. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 16. <i>Formiciformis</i> Esp. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 32. <i>Bembecia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 31. <i>Hylaeiformis</i> Lsp. | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| III. THYRIDINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 33. <i>Thyris</i> Ill. | | | | | | | | | | | | | |
| 32. <i>Fenestrella</i> Scop. | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
| IV. SPHINGINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 34. <i>Macroglossa</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 33. <i>Fuciformis</i> L. | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 9 |
| 34. <i>Bombyliiformis</i> O. | | | | 2 | 2 | 6 | | | | | | | 8 |
| 36. <i>Stellatarum</i> L. | | | | | 5 | 17 | 6 | 4 | 42 | 25 | 3 | 3 | 105 |
| 35. <i>Sphinx</i> L. | | | | | | | | | | | | | |
| *38. <i>Elpenor</i> L. | | | | | | 7 | 22 | 6 | 2 | | | | 37 |
| 39. <i>Porcellus</i> L. | | | | | | 7 | 28 | 10 | 5 | | | | 50 |
| 41. <i>Lineata</i> L. | | | | | | 2 | 6 | | | | | | 8 |
| 42. <i>Galii</i> Rtb. | | | | | | 2 | | 4 | 2 | | | | 8 |
| 43. <i>Euphorbiae</i> L. | | | | | | 4 | 2 | 2 | 5 | | | | 13 |
| 46. <i>Ligustri</i> L. | | | | | | 2 | 6 | 2 | | | | | 10 |
| 47. <i>Convolvuli</i> | | | | | | | 18 | 54 | 40 | | | | 112 |
| 48. <i>Pinastri</i> | | | | | 10 | 7 | 4 | 6 | | | | | 27 |
| 36. <i>Acherontia</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 49. <i>Atropos</i> L. | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| 37. <i>Smerinthus</i> Latr. | | | | | | | | | | | | | |
| 50. <i>Populi</i> L. | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| V. ZYGAENOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 39. <i>Ino</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 57. <i>Globulariae</i> Esp. | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 59. <i>Statice</i> L. | | | | | 5 | 11 | 2 | | | | | | 18 |
| 40. <i>Zygaena</i> F. | | | | | | | | | | | | | |
| 60. <i>Minos</i> F. | | | | | | 4 | 6 | | | | | | 10 |
| 66. <i>Achilleae</i> Esp. | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 68. <i>Lonicerae</i> Esp. | | | | | | 2 | 8 | 3 | 1 | | | | 14 |
| 71. <i>Meliloti</i> Esp. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 76. <i>Filipendulae</i> L. | | | | | | 3 | 5 | 20 | 1 | | | | 29 |
| 78. <i>Ephialtes</i> L. | | | | | | | 7 | 4 | | | | | 11 |
| C Bombyces. | | | | | | | | | | | | | |
| VI. COSSINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 41. <i>Cossus</i> F. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Ligniperda</i> F. | | | | | 2 | 1 | 5 | | 1 | | | | 9 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| VII. EPIALOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 45. <i>Epialus</i> F. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. <i>Sylvinus</i> L. | | | | | | | | 8 | 1 | | | | 9 |
| 15. <i>Hecta</i> L. | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| VII. PSYCHINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 47. <i>Epichnopteryx</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 33. <i>Pulla</i> Esp. | | | 3 | 7 | 10 | 1 | | | | | | | 21 |
| IX. DREPANULINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 50. <i>Platypteryx</i> Lsp. | | | | | | | | | | | | | |
| 44. <i>Falcataria</i> | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| X. SATURNINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 51. <i>Saturnia</i> Schr. | | | | | | | | | | | | | |
| 49. <i>Carpini</i> V. | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 52. <i>Agla</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 51. <i>Tau</i> L. | | | 2 | 8 | 3 | 2 | | | | | | | 15 |
| XI. BOMBYCOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 54. <i>Gastropacha</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 54. <i>Betulifolia</i> F. | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 55. <i>Quercifolia</i> L. | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
| 58. <i>Potatoria</i> L. | | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
| 61. <i>Quercus</i> L. | | | | | | | 12 | 2 | | | | | 14 |
| 62. <i>Trifolii</i> V. | | | | | | | | 6 | 4 | | | | 10 |
| 63. <i>Rubi</i> L. | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 4 |
| 65. <i>Populi</i> L. | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 67. <i>Neustria</i> L. | | | | | | 11 | 11 | | | | | | 22 |
| 71. <i>Lanestris</i> L. | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| XII. NOTODONTINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 57. <i>Ptilophora</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 77. <i>Plumigera</i> F. | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 58. <i>Harpyia</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 78. <i>Vinula</i> L. | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 82. <i>Furcula</i> L. | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 64. <i>Notodonta</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 92. <i>Tremula</i> V. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 68. <i>Pterostoma</i> Grm. | | | | | | | | | | | | | |
| 104. <i>Palpina</i> L. | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 69. <i>Phalera</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 105. <i>Bucephala</i> L. | | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| 70. <i>Pygaera</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 109. <i>Pigra</i> Hofn. | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 110. <i>Anachoreta</i> V. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 111. <i>Curtula</i> L. | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| XIII. LIPARIDINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 71. <i>Orgyia</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 113. <i>Antiqua</i> L. | | | | | | 1 | 1 | | 6 | | | | 8 |
| 73. <i>Dasychira</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 117. <i>Fascellina</i> L. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 118. <i>Pudibunda</i> L. | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 120. <i>Salicis</i> L. | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| 74. <i>Ocneria</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 123. <i>Dispar</i> L. | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 75. <i>Porthesia</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 125. <i>Chrysorrhoea</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | 22 | 1 | . | . | . | . | 24 |
| 126. <i>Auriflua</i> V. | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | 5 |
| XIV. ARCTIOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 79. <i>Phragmatobia</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 131. <i>Fuliginosa</i> L. | . | . | . | 3 | 5 | . | 7 | 2 | . | . | . | . | 17 |
| 81. <i>Arctia</i> Schr. | | | | | | | | | | | | | |
| 134. <i>Lubricipeda</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 135. <i>Menthastri</i> V. | . | . | . | 2 | 5 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 12 |
| 137. <i>Mendica</i> L. | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 139. <i>Russula</i> L. | . | . | . | 2 | 2 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 8 |
| 146. <i>Caja</i> L. | . | . | . | . | . | . | 10 | 4 | 1 | . | . | . | 15 |
| 82. <i>Callimorpha</i> Ltr. | | | | | | | | | | | | | |
| 151. <i>Dominula</i> L. | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 4 |
| 152. <i>Hera</i> L. | . | . | . | . | . | . | 3 | 11 | 5 | . | . | . | 19 |
| 154. <i>Jacobaeae</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVI. LITHOSINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 86. <i>Setina</i> Schr. | | | | | | | | | | | | | |
| 163. <i>Mesomella</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 87. <i>Lithosia</i> F. | | | | | | | | | | | | | |
| 164. <i>Sororcula</i> Hfn. | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 166. <i>Lutarella</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 167. <i>Pallifrons</i> Zll. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 168. <i>Unita</i> V. | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | . | . | . | . | 12 |
| 170. <i>Complana</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 172. <i>Depressa</i> Esp. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 |
| 88. <i>Gnophria</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 176. <i>Quadra</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | 8 |
| 177. <i>Rubricollis</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 89. <i>Nola</i> Lch. | | | | | | | | | | | | | |
| 181. <i>Rosea</i> F. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| XVII. BREPHINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 91. <i>Brephos</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 192. <i>Notha</i> Esp. | . | . | 10 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| D. Noetuae. | | | | | | | | | | | | | |
| XVIII. NOCTUINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. Cymatophoridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 93. <i>Cymatophora</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. <i>Ocularis</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 |
| 7. <i>Duplaris</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 94. <i>Thyatyra</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. <i>Batis</i> | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| II. Bombycoidea. | | | | | | | | | | | | | |
| 95. <i>Diloba</i> Bd. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. <i>Coeruleocephala</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 |
| III. Acronyctidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 101. <i>Acronycta</i> O. | | | | | | | | | | | | | |
| 20. <i>Tridens</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 26. <i>Rumicis</i> L. | . | . | . | 7 | . | 1 | 5 | 12 | . | . | . | . | 25 |
| IV. Hadenidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 103. <i>Hadena</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 39. <i>Atriplicis</i> L. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 40. <i>Strigilis</i> L. | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | 8 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 41. <i>Furuncula</i> V. | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 45. <i>Didyma</i> Esp. | . | . | . | . | . | 3 | 9 | 5 | 1 | . | . | . | 18 |
| 52. <i>Basilinea</i> V. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 55. <i>Polyodon</i> L. | . | . | . | . | . | . | 8 | 4 | . | . | . | . | 12 |
| 56. <i>Lithoxylea</i> V. | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 1 | . | . | . | . | 8 |
| 73. <i>Ypsilon</i> V. | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 4 |
| 107. <i>Polia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 83. <i>Chi</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 109. <i>Dianthoecia</i> Bd. | | | | | | | | | | | | | |
| 95. <i>Comta</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 97. <i>Cucubali</i> V. | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 4 | . | . | . | . | 10 |
| 110. <i>Mamestra</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 110. <i>Genistae</i> Bk. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 112. <i>Suasa</i> V. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 114. <i>Oleracea</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 116. <i>Pisi</i> L. | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 4 | . | . | . | . | 7 |
| 117. <i>Persicariae</i> L. | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 4 |
| 118. <i>Brassicae</i> L. | . | . | . | . | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 11 |
| 124. <i>Leucophaea</i> V. | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 111. <i>Neuromia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 126. <i>Popularis</i> F. | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | 6 |
| 127. <i>Cespitis</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
| 114. <i>Oloantha</i> Bd. | | | | | | | | | | | | | |
| 132. <i>Perspicillaris</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 117. <i>Brotolomia</i> Ld. | | | | | | | | | | | | | |
| 137. <i>Meticulosa</i> L. | . | . | . | . | 2 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | 7 |
| 126. <i>Miselia</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 150. <i>Oxyacanthae</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | 5 |
| V. Xylinidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 127. <i>Xylina</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 153. <i>Socia</i> Hofn. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| VII. Cucullidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 136. <i>Cucullia</i> Schr. | | | | | | | | | | | | | |
| 179. <i>Umbratica</i> L. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 183. <i>Lucifuga</i> V. | . | . | . | 3 | . | 1 | 4 | 6 | 1 | . | . | . | 15 |
| 186. <i>Verbasci</i> L. | . | 2 | . | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 9 |
| VIII. Orthosidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 143. <i>Leucania</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 217. <i>Lithargyrea</i> Esp. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 219. <i>Conigera</i> V. | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 4 |
| 148. <i>Caradrina</i> Bk. | | | | | | | | | | | | | |
| 225. <i>Alsines</i> Bk. | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 3 |
| 226. <i>Taraxaci</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 234. <i>Cubicularis</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 156. <i>Charaeas</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 244. <i>Graminis</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 162. <i>Taeniocampa</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 250. <i>Gothica</i> L. | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 163. <i>Orthosia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 268. <i>Litura</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
| 166. <i>Hiptelia</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 271. <i>Ochreago</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 |
| 167. <i>Mesogona</i> Bd. | | | | | | | | | | | | | |
| 272. <i>Oxalina</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|--|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 171. <i>Calymnia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 280. <i>Trapezina</i> L. | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 283. <i>Pyrulina</i> V. | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| 172. <i>Hydroecia</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 287. <i>Umbra</i> Hfn. | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 175. <i>Oporina</i> Bd. | | | | | | | | | | | | | |
| 296. <i>Croceago</i> V. | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 176. <i>Scoliopteryx</i> Grm. | | | | | | | | | | | | | |
| 297. <i>Libatrix</i> L. | | | 2 | | | | 10 | 9 | 6 | | | | 27 |
| 180. <i>Amphipyra</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 307. <i>Tragopoginis</i> L. | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
| 309. <i>Pyramidea</i> L. | | | | | | | 8 | 10 | 6 | 2 | | | 26 |
| IX. Agrotidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 181. <i>Agrotis</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 316. <i>Pronuba</i> L. | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | 9 |
| 323. <i>Baja</i> V. | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 334. <i>C. nigrum</i> L. | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| 335. <i>Rhomboidea</i> Esp. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 373. <i>Plecta</i> L. | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 382. <i>Exclamationis</i> L. | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 389. <i>Suffusa</i> V. | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| XI. Anartidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 187. <i>Heliaca</i> H. S. | | | | | | | | | | | | | |
| 404. <i>Tenebrata</i> Sep. | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| XIII. Ophiussidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 191. <i>Catephia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 409. <i>Alchymista</i> V. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 192. <i>Euclidia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 410. <i>Mi</i> L. | | | | | 3 | 3 | | | | | | | 6 |
| 411. <i>Glyphica</i> L. | | | | 12 | 8 | 11 | 11 | 14 | 1 | | | | 57 |
| 193. <i>Catocala</i> Schr. | | | | | | | | | | | | | |
| 418. <i>Electa</i> Hb. | | | | | | | 5 | 11 | 7 | | | | 23 |
| 419. <i>Nupta</i> L. | | | | | | | 2 | | 5 | | | | 7 |
| 421. <i>Promissa</i> V. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 424. <i>Fraxini</i> L. | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| 196. <i>Toxocampa</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 429. <i>Viciae</i> Hb. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| XV. Plusiidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 198. <i>Habrostola</i> Sod. | | | | | | | | | | | | | |
| 432. <i>Urticae</i> Hb. | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 434. <i>Triplasia</i> L. | | | | | | 4 | 1 | 7 | 19 | | | | 31 |
| 201. <i>Plusia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 437. <i>Illustris</i> F. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 444. <i>Gamma</i> L. | | | | 2 | | 6 | 11 | 26 | 71 | 52 | 2 | | 170 |
| 447. <i>Interrogationis</i> L. | | | | | | | 5 | 1 | | | | | 6 |
| 451. <i>Festuae</i> L. | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 455. <i>Chrysitis</i> L. | | | | | | 4 | 8 | 26 | 26 | | | | 64 |
| 456. <i>Moneta</i> F. | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| XVI. Noctuophalaenidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 202. <i>Erastris</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 464. <i>Pyrarga</i> Hfn. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 203. <i>Photodes</i> Ld. | | | | | | | | | | | | | |
| 465. <i>Captiuncula</i> Tr. | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 207. <i>Prothymia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 477. <i>Laccata</i> Sep. | . | . | . | 2 | 3 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | 9 |
| 208. <i>Halias</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 478. <i>Prassinana</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVII. Deltoididae. | | | | | | | | | | | | | |
| 215. <i>Zanclognatha</i> Ld. | | | | | | | | | | | | | |
| 487. <i>Tarsicrinalis</i> Kn. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 217. <i>Herminia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 496. <i>Tentacularis</i> L. | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 219. <i>Hypena</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 499. <i>Rostralis</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 2 | . | . | 9 |
| 500. <i>Obesalis</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 501. <i>Proboscidalis</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| E. Geometrae. | | | | | | | | | | | | | |
| XIX. GEOMETRINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. Dendrometridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 224. <i>Metrocampa</i> Latr. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Margaritaria</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 229. <i>Eugonia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. <i>Alniaria</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
| 10. <i>Quercinaria</i> Hfn. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 231. <i>Selenia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 13. <i>Tetralunaria</i> Hfn. | . | . | 2 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 |
| 235. <i>Macaria</i> Crt. | | | | | | | | | | | | | |
| 21. <i>Notata</i> L. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 237. <i>Opisthograptis</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 27. <i>Crataegata</i> L. | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 238. <i>Venilia</i> Dp. | | | | | | | | | | | | | |
| 28. <i>Macularia</i> L. | . | . | . | 2 | 13 | 7 | . | . | . | . | . | . | 22 |
| 239. <i>Angerona</i> Dp. | | | | | | | | | | | | | |
| 29. <i>Prunaria</i> L. | . | . | . | . | 2 | 10 | 3 | . | . | 3 | . | . | 18 |
| 240. <i>Scoria</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 30. <i>Dealbata</i> L. | . | . | . | . | 7 | 12 | 2 | . | . | . | . | . | 21 |
| 246. <i>Phasiane</i> Dp. | | | | | | | | | | | | | |
| 37. <i>Petraria</i> Esp. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 251. <i>Abraxas</i> Lch. | | | | | | | | | | | | | |
| 46. <i>Ulmaria</i> F. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 47. <i>Marginata</i> L. | . | . | . | . | 3 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | 12 |
| 254. <i>Amphidasis</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 61. <i>Strataria</i> Hfn. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 256. <i>Hibernia</i> Ltr. | | | | | | | | | | | | | |
| 66. <i>Progemmaria</i> Hb. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 68. <i>Leucophaearia</i> V. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 4 |
| 257. <i>Cabera</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 70. <i>Pusaria</i> L. | . | . | . | . | 5 | 5 | 2 | 2 | . | . | . | . | 14 |
| 71. <i>Exanthemaria</i> Sep. | . | . | . | . | 3 | 6 | 5 | 1 | . | . | . | . | 15 |
| 259. <i>Bapta</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 74. <i>Temerata</i> V. | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 261. <i>Fidonia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 76. <i>Arenacearia</i> Hb. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 78. <i>Wauaria</i> Esp. | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 4 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|--|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 84. <i>Atomaria</i> L. | . | . | 2 | 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | . | . | . | . | 36 |
| 87. <i>Clathrata</i> L. | . | . | . | 7 | 15 | 6 | 22 | 8 | . | . | . | . | 58 |
| 90. <i>Adustata</i> V. | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | 4 | . | . | . | . | 8 |
| 262. <i>Gnophos</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 94. <i>Glaucinata</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 96. <i>Pullata</i> V. | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | 6 |
| 265. <i>Boarmia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 109. <i>Lichenaria</i> Hfn. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 112. <i>Glabraria</i> V. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 4 |
| 114. <i>Repandata</i> L. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 4 |
| 115. <i>Alietaria</i> V. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 118. <i>Rhomboidaria</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 119. <i>Roboraria</i> V. | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 120. <i>Consortaria</i> F. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 121. <i>Crepuscularia</i> V. | . | . | . | 5 | 2 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | 12 |
| 267. <i>Parascotia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 127. <i>Fuliginaria</i> L. | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 8 |
| 269. <i>Geometra</i> L. | | | | | | | | | | | | | |
| 130. <i>Putataria</i> L. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 271. <i>Nemoria</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 136. <i>Fimbriata</i> Hfn. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 138. <i>Porrinata</i> Zll. | . | . | . | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | . | . | . | . | 20 |
| 273. <i>Timandra</i> Dp. | | | | | | | | | | | | | |
| 140. <i>Amataria</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 3 | 2 | . | . | . | 10 |
| 276. <i>Pylarge</i> H. S. | | | | | | | | | | | | | |
| 151. <i>Commutata</i> Tr. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 277. <i>Arrhostia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 153. <i>Nigropunctata</i> Hfn. | . | . | . | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | 5 |
| 154. <i>Umbellaria</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 157. <i>Remutata</i> V. | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 158. <i>Sylvestrata</i> Bk. | . | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 2 | . | . | . | 10 |
| 159. <i>Cerusaria</i> H. S. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 167. <i>Paludata</i> L. | . | . | . | . | 7 | . | 2 | 2 | 9 | . | . | . | 20 |
| 169. <i>Immorata</i> L. | . | . | . | . | 10 | 6 | 5 | 4 | . | . | . | . | 25 |
| 278. <i>Ptychopoda</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 173. <i>Dimidiata</i> Hfn. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 178. <i>Incanata</i> L. | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 1 | . | . | . | . | 8 |
| 179. <i>Aversata</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 188. <i>Holosericeata</i> Dp. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 279. <i>Acidalia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 194. <i>Rufaria</i> Hb. | . | . | . | . | . | 2 | 13 | 19 | . | . | . | . | 34 |
| II. Phytometridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 280. <i>Odezia</i> Bd. | | | | | | | | | | | | | |
| 203. <i>Chaerophyllata</i> L. | . | . | . | . | 3 | 17 | 8 | . | . | . | . | . | 28 |
| 283. <i>Anaitis</i> Dp. | | | | | | | | | | | | | |
| 209. <i>Plagiata</i> L. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 3 | . | . | . | 5 |
| 210. <i>Praeformata</i> Hb. | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 7 |
| 284. <i>Lobophora</i> Crt. | | | | | | | | | | | | | |
| 218. <i>Sexalata</i> Bk. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 286. <i>Larentia</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 223. <i>Brunnearia</i> Vll. | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 4 |
| 225. <i>Chenopodiata</i> L. | . | . | . | . | . | . | 8 | 53 | 11 | . | . | . | 72 |
| 226. <i>Angulata</i> Hfn. | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | . | . | . | 6 |
| 227. <i>Comitata</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 228. <i>Bipunctaria</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 |
| 231. <i>Prunata</i> L. | . | . | . | . | . | . | 6 | 2 | . | . | . | . | 8 |
| 236. <i>Pyrallata</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 246. <i>Corylata</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 247. <i>Truncata</i> Hfn. | . | . | . | . | . | 1 | . | 5 | 11 | 3 | . | . | 19 |
| 250. <i>Pectinataria</i> Fssl. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 261. <i>Bilineata</i> L. | . | . | . | . | 2 | 16 | 5 | 44 | 30 | . | . | . | 97 |
| 263. <i>Ferrugata</i> L. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 267. <i>Olivata</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 271. <i>Quadriannulata</i> Hw. | . | . | . | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | . | . | . | 27 |
| 272. <i>Ocellata</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 273. <i>Montanata</i> V. | . | . | . | . | . | 4 | . | 1 | . | . | . | . | 5 |
| 275. <i>Molluginata</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 276. <i>Alchemillata</i> V. | . | . | . | 5 | 18 | 3 | 10 | 13 | 6 | . | . | . | 55 |
| 280. <i>Tristata</i> L. | . | . | . | . | 7 | 3 | 5 | 4 | . | . | . | . | 19 |
| 284. <i>Rivulata</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 288. <i>Decolorata</i> Hb. | . | . | . | . | . | 6 | 17 | 38 | 12 | . | . | . | 73 |
| 289. <i>Albulata</i> V. | . | . | . | . | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 8 |
| 290. <i>Minorata</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 291. <i>Blandiata</i> V. | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 4 |
| 293. <i>Fluctuata</i> L. | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 5 | . | . | . | 8 |
| 294. <i>Procellata</i> V. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 296. <i>Albicillata</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 297. <i>Rupestrata</i> V. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 308. <i>Tophaceata</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 316. <i>Vetutata</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 319. <i>Dubitata</i> L. | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 321. <i>Transversata</i> Hfn. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 322. <i>Aemulata</i> Hb. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 287. <i>Eupithecia</i> Crt. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 359. <i>Satyrata</i> Hb. | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 380. <i>Rectangulata</i> L. | . | . | . | . | . | 8 | 1 | . | . | . | . | . | 9 |
| 381. <i>Debiliata</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 383. <i>Strobiliata</i> Bk. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 290. <i>Minoa</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 393. <i>Fuscata</i> Hfn. | . | . | . | . | 5 | 9 | 2 | 3 | . | . | . | . | 19 |
| 292. <i>Cheimatobia</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 396. <i>Brumata</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 12 | . | 16 |
| 293. <i>Anisopteryx</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 398. <i>Aescularia</i> V. | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| F. Tortricidae. | | | | | | | | | | | | | |
| XX. TORTRICINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 294. <i>Teras</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9. <i>Sponsana</i> F. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 13. <i>Variegana</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 18. <i>Niveana</i> F. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 21. <i>Autumnana</i> H. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 25. <i>Ferrugana</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 295. <i>Tortrix</i> L. Tr. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 38. <i>Rosana</i> L. | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 5 |
| 42. <i>Corylana</i> F. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 46. <i>Heparana</i> V. | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 4 |
| 48. <i>Forsterana</i> F. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 52. <i>Centrana</i> H. S. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 58. <i>Diversana</i> H. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 68. <i>Flavana</i> H. | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 3 | . | . | . | . | 16 |
| 69. <i>Viburnana</i> V. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 72. <i>Rusticana</i> Tr. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 73. <i>Rolandriana</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 83. <i>Rubicundana</i> H. S. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 296. <i>Sciaphila</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 88. <i>Gouana</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 94. <i>Wahlbomiana</i> L. | . | . | . | . | . | 10 | 2 | 1 | . | . | . | . | 13 |
| 297. <i>Cheimatophila</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 100. <i>Tortricella</i> H. | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | 14 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|--------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 299. <i>Olindia</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 104. <i>Ulmiana</i> H. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 300. <i>Conchilis</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 106. <i>Hamana</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 107. <i>Zoëgana</i> L. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 126. <i>Baumanniana</i> V. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 128. <i>Tesserana</i> V. | . | . | . | . | 7 | 6 | . | . | . | . | . | . | 13 |
| 130. <i>Aurofasciana</i> Mn. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 302. <i>Grapholitha</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 176. <i>Striana</i> V. | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 4 |
| 188. <i>Cynosbatella</i> L. | . | . | . | . | 8 | 10 | . | 1 | . | . | . | . | 19 |
| 200. <i>Fuligana</i> H. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 201. <i>Textana</i> Frh. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 223. <i>Lacunana</i> V. | . | . | . | 2 | 28 | 9 | 2 | 8 | 2 | . | . | . | 51 |
| 224. <i>Rupestana</i> Dp. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 4 |
| 235. <i>Arcuana</i> Cl. | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 5 |
| 239. <i>Uddmanniana</i> L. | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 267. <i>Cirsiana</i> Zll. | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 5 |
| 268. <i>Scutulana</i> V. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 285. <i>Tripunctana</i> V. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 293. <i>Nigricana</i> H. S. | . | . | . | 2 | 12 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 17 |
| 300. <i>Lacteana</i> Tr. | . | . | . | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 314. <i>Hypericana</i> H. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 316. <i>Gemmiferana</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 325. <i>Dorsana</i> F. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 349. <i>Pomonella</i> L. | . | . | . | . | 3 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | 13 |
| 369. <i>Germarana</i> H. | . | . | . | . | 7 | . | 1 | . | . | . | . | . | 8 |
| 370. <i>Rhediella</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 3 |
| 382. <i>Corticana</i> H. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 409. <i>Apicella</i> V. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 411. <i>Badiana</i> V. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 414. <i>Naevana</i> H. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 303. <i>Dichrorampha</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 416. <i>Petiverella</i> L. | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 6 |
| G. Pyralides. | | | | | | | | | | | | | |
| XXI. PYRALIDINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. Pyralididae. | | | | | | | | | | | | | |
| 305. <i>Aglossa</i> Ltr. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. <i>Pinguinalis</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 307. <i>Endotricha</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. <i>Flammealis</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 |
| II. Botidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 309. <i>Scoparia</i> Hw. | | | | | | | | | | | | | |
| 20. <i>Ambigualis</i> Tr. | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 |
| 27. <i>Phlaeoleuca</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 29. <i>Truncicolella</i> St. | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | 6 |
| 30. <i>Frequentella</i> St. | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 |
| 312. <i>Heliothela</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 37. <i>Atralis</i> H. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 315. <i>Hercyna</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 41. <i>Phrygialis</i> H. | . | . | . | . | . | 5 | 3 | 7 | . | . | . | . | 15 |
| 322. <i>Eurrhyncha</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 52. <i>Urticata</i> L. | . | . | . | . | 3 | 18 | 8 | 1 | . | . | . | . | 30 |
| 323. <i>Botys</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 56. <i>Octomaculata</i> L. | . | . | . | 2 | . | 3 | . | 1 | . | . | . | . | 6 |
| 57. <i>Anguinalis</i> H. | . | . | . | . | 12 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 15 |
| 61. <i>Falcatalis</i> Gn. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 62. <i>Aurata</i> Sep. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|--|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 63. <i>Porphyrallis</i> V. | . | . | . | 7 | 2 | . | 2 | 3 | 2 | . | . | . | 16 |
| 64. <i>Purpuralis</i> H. | . | . | . | . | 3 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 6 |
| 65. <i>Ostrinalis</i> H. | . | . | . | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | . | . | . | 23 |
| 66. <i>Cespitalis</i> V. | . | . | . | 18 | 2 | . | 5 | 3 | 5 | . | . | . | 33 |
| 67. <i>Sanguinalis</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 69. <i>Limbalis</i> V. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 72. <i>Repandalis</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 77. <i>Pandalis</i> H. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 78. <i>Hyalinalis</i> H. | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 1 | . | . | . | . | 7 |
| 80. <i>Ruralis</i> Sep. | . | . | . | . | . | 1 | 8 | 12 | 2 | . | . | . | 23 |
| 86. <i>Sambucalis</i> V. | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 3 | . | . | . | . | 14 |
| 93. <i>Prunalis</i> V. | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 1 | . | . | . | 4 |
| 110. <i>Aerealis</i> H. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 324. <i>Eurycreon</i> Ld. | | | | | | | | | | | | | |
| 119. <i>Verticalis</i> L. | . | . | . | 5 | 23 | 2 | 8 | 10 | . | . | . | . | 48 |
| 120. <i>Sticticalis</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 325. <i>Nomophila</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 121. <i>Noctuella</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 13 | 37 | 3 | . | 57 |
| 327. <i>Pionea</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 123. <i>Forficalis</i> L. | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 7 | . | . | . | . | 13 |
| 328. <i>Orobena</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 125. <i>Extimalis</i> Sep. | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | 5 |
| 128. <i>Politalis</i> V. | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | . | . | . | . | 6 |
| 129. <i>Frumentalis</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 130. <i>Sophialis</i> F. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 330. <i>Diasemia</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 132. <i>Literata</i> Scop. | . | . | . | . | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | . | . | . | 28 |
| 334. <i>Hydrocampa</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 139. <i>Nymphaeata</i> L. | . | . | . | . | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | . | . | . | 27 |
| 335. <i>Paraponyx</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 141. <i>Stratiotata</i> L. | . | . | . | . | 3 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | 9 |
| 336. <i>Cataclysta</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 142. <i>Lemnata</i> L. | . | . | . | . | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | . | . | . | 31 |
| IV. Crambidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 342. <i>Crambus</i> F. | | | | | | | | | | | | | |
| 157. <i>Pascuellus</i> L. | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 1 | . | . | . | . | 7 |
| 158. <i>Sylvellus</i> H. | . | . | . | . | 2 | 11 | 5 | 1 | . | . | . | . | 19 |
| 163. <i>Pratellus</i> Cl. | . | . | . | . | 25 | 52 | 7 | 5 | . | . | . | . | 89 |
| 166. <i>Hortuellus</i> H. | . | . | . | . | . | 4 | 8 | . | . | . | . | . | 12 |
| 167. <i>Chrysonuchellus</i> Sep. | . | . | . | . | 7 | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 169. <i>Culmellus</i> L. | . | . | . | . | . | . | 16 | 21 | 1 | . | . | . | 48 |
| 181. <i>Pinetellus</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 200. <i>Tristellus</i> V. | . | . | . | . | . | . | 4 | 22 | 19 | . | . | . | 45 |
| 202. <i>Inquinalis</i> V. | . | . | . | . | . | . | 2 | 9 | . | . | . | . | 11 |
| 203. <i>Luteellus</i> V. | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | 4 |
| 204. <i>Lithargyrellus</i> H. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 205. <i>Perlellus</i> Sep. | . | . | . | . | 2 | 9 | 15 | 6 | 2 | . | . | . | 34 |
| V. PHYCIDEAE. | | | | | | | | | | | | | |
| 345. <i>Dioryctria</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 209. <i>Simplicella</i> V. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 348. <i>Salebria</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 221. <i>Semirubella</i> Sep. | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 5 |
| 370. <i>Ephestia</i> Gn. | | | | | | | | | | | | | |
| 294. <i>Elutella</i> H. | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| VI. GALLERIAE. | | | | | | | | | | | | | |
| 373. <i>Aphomia</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 300. <i>Colonella</i> L. | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 1 | . | . | . | . | 10 |

| Art. | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|--|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| <i>H. Tineidae.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| XXIV. Fam. TINEINA. | | | | | | | | | | | | | |
| III. Tineidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 387. <i>Tinea</i> L. | | | | | | | | | | | | | |
| 39. <i>Granella</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 54. <i>Spretella</i> V. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 392. <i>Nemophora</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 86. <i>Swammerdammella</i> L. | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 88. <i>Schwarziella</i> Zll. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 91. <i>Metaxella</i> H. | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| IV. Adelidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 393. <i>Adela</i> Ltr. | | | | | | | | | | | | | |
| 96. <i>Mazzeola</i> H. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 99. <i>Degeerella</i> L. | . | . | . | . | . | 10 | 2 | 1 | . | . | . | . | 13 |
| 101. <i>Sulzeriella</i> Zll. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 394. <i>Nematois</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 107. <i>Scabiosellus</i> Scp. | . | . | . | . | . | 1 | 6 | 6 | . | . | . | . | 13 |
| 109. <i>Raddellus</i> H. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| VIII. Hyponomeutidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 403. <i>Hyponomeuta</i> Latr. | | | | | | | | | | | | | |
| 145. <i>Irrorrellus</i> H. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 149. <i>Evonymellus</i> Scp. | . | . | . | . | . | 3 | 12 | 26 | 9 | . | . | . | 50 |
| 151. <i>Padi</i> | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| IX. Plutellidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 407. <i>Plutella</i> L. | | | | | | | | | | | | | |
| 157. <i>Porrectella</i> L. | . | . | . | . | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | 12 | . | . | 53 |
| 408. <i>Cerostoma</i> Ltr. | | | | | | | | | | | | | |
| 164. <i>Sequellum</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | 4 |
| 177. <i>Xylostellum</i> L. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | 3 |
| XI. Chimabachidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 412. <i>Chimabache</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 182. <i>Fagella</i> V. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| XII. Gelechiidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 422. <i>Teleia</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 408. <i>Fugacella</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 426. <i>Nannodia</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 423. <i>Stipella</i> H. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 438. <i>Tachyptilia</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 486. <i>Scintillella</i> F. R. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 458. <i>Hyporcallia</i> Stph. | | | | | | | | | | | | | |
| 551. <i>Christiarnana</i> L. | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 |
| XIII. Glyphipterigidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 473. <i>Glyphipteryx</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 607. <i>Thrasonella</i> Scp. | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVI. Butalidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 494. <i>Butalis</i> Tr. | | | | | | | | | | | | | |
| 691. <i>Laminella</i> H. S. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVII. Elachistidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 498. <i>Elachista</i> Sc. | | | | | | | | | | | | | |
| 710. <i>Cingillella</i> H. S. | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 715. <i>Taeniatella</i> St. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|--|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 724. <i>Immolatella</i> Zll. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 727. <i>Rudectella</i> H. S. | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 |
| XXIV. Coleophoridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 510. <i>Coleophora</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 846. <i>Frischella</i> L. | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 |
| 927. <i>Alpicola</i> Wk. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 928. <i>Lineariella</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| XXV. Gracilaridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 513. <i>Coriscium</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 989. <i>Remotellum</i> Wk. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XXVI. Argyresthidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 518. <i>Argyresthia</i> H. | | | | | | | | | | | | | |
| 1014. <i>Mendica</i> Hw. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XXVII. Lithocolletidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 520. <i>Lithocolletis</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 1113. <i>Tremulae</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 |
| XXX. Nepticulidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 531. <i>Nepticula</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 1172. <i>Ruficapitella</i> Hw. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 1175. <i>Atricapitella</i> Hw. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| XXV. Fam. MICROPTERIGINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 532. <i>Eriocephala</i> Curtis. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Calthella</i> L. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 8. <i>Rothenbachii</i> Frey. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XXVI. Fam. PTEROPHORINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 538. <i>Oxyptilus</i> Zll. | | | | | | | | | | | | | |
| 15. <i>Kollari</i> St. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 18. <i>Pilosellae</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 539. <i>Mimaeseoptilus</i> Wallgr. | | | | | | | | | | | | | |
| 28. <i>Coprodactylus</i> Zll. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 32. <i>Pterodactylus</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 543. <i>Acyptilia</i> Hb. | | | | | | | | | | | | | |
| 51. <i>Xanthodactyla</i> Tr. | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 52. <i>Baliodactyla</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 |
| 53. <i>Tetradactyla</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 4 |
| 55. <i>Ischnodactyla</i> Tr. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 56. <i>Pentadactyla</i> L. | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | 5 |

Tab. II.

Frequenz der Gattungen.

| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| B. Sphinges. | | | | | | | | | | | | | |
| II. SESIARIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 30. <i>Trochilia</i> | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 31. <i>Sesia</i> Lsp. | . | . | . | . | . | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 9 |
| 32. <i>Rembecia</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| III. THYRIDINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 33. <i>Thyris</i> Ill. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |

| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| IV. SPHINGINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 34. <i>Macroglossa</i> O. | . | . | . | 2 | 9 | 25 | 9 | 4 | 42 | 25 | 3 | 3 | 122 |
| 35. <i>Sphinx</i> L. | . | . | . | . | 10 | 31 | 86 | 84 | 54 | . | . | . | 265 |
| 36. <i>Acherontia</i> O. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 3 |
| 37. <i>Smerinthus</i> Latr. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| V. ZYGAENOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 30. <i>Ino</i> Leach. | . | . | . | . | 5 | 13 | 2 | . | . | . | . | . | 20 |
| 40. <i>Zygaena</i> F. | . | . | . | . | . | 10 | 28 | 27 | 2 | . | . | . | 67 |
| C. Bombyces. | | | | | | | | | | | | | |
| VI. COSSINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 41. <i>Cossus</i> F. | . | . | . | . | 2 | 1 | 5 | . | 1 | . | . | . | 9 |
| VII. EPIALOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 45. <i>Epialus</i> F. | . | . | . | . | . | 2 | . | 8 | 1 | . | . | . | 11 |
| VIII. PSYCHINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 47. <i>Epichnopteryx</i> Hb. | . | . | 3 | 7 | 10 | 1 | . | . | . | . | . | . | 21 |
| IX. DREPANULINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 50. <i>Platypteryx</i> Lsp. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| X. SATURNINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 51. <i>Saturnia</i> Schr. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 52. <i>Aglia</i> O. | . | . | 2 | 8 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 15 |
| XI. BOMBYCOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 54. <i>Gastropacha</i> O. | 2 | . | 3 | 2 | 2 | 14 | 30 | 9 | 4 | . | . | . | 66 |
| XII. NOTODONTINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 57. <i>Ptilophora</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 3 |
| 58. <i>Harpyia</i> O. | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 64. <i>Notodonta</i> O. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 68. <i>Pterostoma</i> Grm. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 69. <i>Phalera</i> Hb. | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 70. <i>Pygaera</i> O. | . | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 |
| XIII. LIPARIDINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 71. <i>Orgyia</i> O. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 6 | . | . | . | 8 |
| 73. <i>Dasychira</i> Stph. | . | . | . | 5 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 8 |
| 74. <i>Oeneria</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 75. <i>Porthesia</i> Stph. | . | . | . | . | . | 1 | 25 | 3 | . | . | . | . | 29 |
| XIV. ARCTIOIDEA. | | | | | | | | | | | | | |
| 79. <i>Phragmatobia</i> Stph. | . | . | . | 3 | 5 | . | 7 | 2 | . | . | . | . | 17 |
| 81. <i>Arctia</i> Schr. | . | . | . | 6 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | . | . | . | 41 |
| 82. <i>Callimorpha</i> Ltr. | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 11 | 5 | . | . | . | 24 |
| XVI. LITHOSINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 86. <i>Setina</i> Schr. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 87. <i>Lithosia</i> F. | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | . | . | . | 22 |
| 88. <i>Gnophria</i> Stph. | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 2 | 2 | . | . | . | 9 |
| 89. <i>Nola</i> Lch. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| XVII. BREPHINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 91. <i>Brephos</i> O. | . | . | 10 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| D. Noctuae. | | | | | | | | | | | | | |
| XVIII. NOCTUINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. Cymatophoridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 93. <i>Cymatophora</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 |
| 94. <i>Thyatira</i> O. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |

| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| II. Bombycoidea. | | | | | | | | | | | | | |
| 95. <i>Diloba</i> Bd. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 |
| III. Acronyctidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 101. <i>Acronycta</i> O. | . | . | . | 7 | . | 1 | 6 | 12 | . | . | . | . | 26 |
| IV. Hadenidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 103. <i>Hadena</i> Tr. | . | . | . | . | 2 | 17 | 25 | 11 | 1 | . | . | . | 56 |
| 107. <i>Polia</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 109. <i>Dianthoecia</i> Bd. | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | 11 |
| 110. <i>Mamestra</i> Tr. | . | . | . | . | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | . | . | . | 31 |
| 111. <i>Neuromia</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 3 | . | . | . | 8 |
| 114. <i>Cloantha</i> Ld. | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 117. <i>Brotolomia</i> Ld. | . | . | . | . | 2 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | 7 |
| 126. <i>Miselia</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | 5 |
| V. Xylinidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 127. <i>Xylina</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| VII. Cucullidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 136. <i>Cucullia</i> Schr. | . | 2 | . | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | . | . | . | 26 |
| VIII. Orthosidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 143. <i>Leucania</i> Tr. | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 5 |
| 148. <i>Caradrina</i> Bk. | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 1 | . | . | . | . | 7 |
| 156. <i>Charaas</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 162. <i>Taeniocampa</i> Gn. | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 163. <i>Orthosia</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
| 166. <i>Hyptelia</i> Gn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 |
| 167. <i>Mesogona</i> Bd. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 171. <i>Calymnia</i> Hb. | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 3 |
| 172. <i>Hydroecia</i> Gn. | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 175. <i>Oporina</i> Bd. | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
| 176. <i>Scoliopteryx</i> Grm. | . | . | 2 | . | . | . | 10 | 9 | 6 | . | . | . | 27 |
| 180. <i>Amphipyra</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | 10 | 10 | 7 | 2 | . | . | 29 |
| IX. Agrotidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 181. <i>Agrotis</i> Tr. | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | 19 |
| XI. Anartidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 187. <i>Heliaca</i> H. S. | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| XIII. Ophiidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 191. <i>Catephia</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 192. <i>Euclidia</i> Tr. | . | . | . | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 1 | . | . | . | 63 |
| 193. <i>Catocala</i> Schr. | . | . | . | . | . | . | 8 | 11 | 14 | . | . | . | 33 |
| 196. <i>Toxocampa</i> Gn. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XV. Plusiidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 198. <i>Habrostola</i> Sod. | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 7 | 19 | . | . | . | 33 |
| 201. <i>Plusia</i> Tr. | . | . | . | 2 | . | 11 | 26 | 53 | 98 | 52 | 2 | . | 244 |
| XVI. Noctuophalaenidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 202. <i>Erastria</i> Tr. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 203. <i>Photodes</i> Ld. | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 207. <i>Phrothymia</i> Hb. | . | . | . | 2 | 3 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | 9 |
| 208. <i>Halias</i> Tr. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVII. Deltoideae. | | | | | | | | | | | | | |
| 215. <i>Zanclognatha</i> Ld. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 217. <i>Hermia</i> Tr. | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 219. <i>Hypena</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | 2 | 7 | . | 2 | . | . | 11 |

| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|--------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| E. Geometrae. | | | | | | | | | | | | | |
| XIX. GEOMETRINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. Dendrometrinae. | | | | | | | | | | | | | |
| 224. <i>Metrocampa</i> Latr. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 229. <i>Eugonia</i> Hb. | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 |
| 231. <i>Selenia</i> Hb. | . | . | 2 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 |
| 235. <i>Macaria</i> Crt. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 237. <i>Opisthograptis</i> Hb. | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 238. <i>Venilia</i> L. | . | . | . | 2 | 13 | 7 | . | . | . | . | . | . | 22 |
| 239. <i>Angerona</i> L. | . | . | . | . | 2 | 10 | 3 | . | . | 3 | . | . | 18 |
| 240. <i>Scoria</i> Stph. | . | . | . | . | 7 | 12 | 2 | . | . | . | . | . | 21 |
| 246. <i>Phasiane</i> Dp. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 251. <i>Abraxas</i> Lch. | . | . | . | . | 3 | 9 | 2 | . | . | . | . | . | 14 |
| 254. <i>Amphidasis</i> Tr. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 256. <i>Hibernia</i> Ltr. | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 6 |
| 257. <i>Cabera</i> Tr. | . | . | . | . | 8 | 11 | 7 | 3 | . | . | . | . | 29 |
| 259. <i>Bapta</i> Stph. | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 261. <i>Fidonia</i> Tr. | . | . | 2 | 23 | 18 | 16 | 35 | 14 | . | . | . | . | 108 |
| 262. <i>Gnophos</i> Tr. | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | . | . | . | . | 7 |
| 265. <i>Boarmia</i> Tr. | . | . | . | 5 | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | . | . | . | 30 |
| 267. <i>Parascotia</i> Hb. | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 8 |
| 269. <i>Geometra</i> L. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 271. <i>Nemoria</i> Hb. | . | . | . | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | . | . | . | . | 20 |
| 273. <i>Timandra</i> Dp. | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 3 | 2 | . | . | . | 10 |
| 276. <i>Pilarge</i> H. S. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 277. <i>Arrhostia</i> Hb. | . | . | . | . | 17 | 10 | 15 | 13 | 11 | . | . | . | 66 |
| 278. <i>Ptychopoda</i> Stph. | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | 14 |
| 279. <i>Acidalia</i> Tr. | . | . | . | . | . | 2 | 13 | 19 | . | . | . | . | 34 |
| II. Phytometrinae. | | | | | | | | | | | | | |
| 280. <i>Odezia</i> Bd. | . | . | . | . | 3 | 17 | 8 | . | . | . | . | . | 28 |
| 283. <i>Anaitis</i> Dp. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 5 | 3 | . | . | 12 |
| 284. <i>Lobophora</i> Crt. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 286. <i>Larentia</i> Tr. | . | . | . | 9 | 43 | 41 | 70 | 186 | 81 | 6 | . | . | 436 |
| 287. <i>Eupithecia</i> Crt. | . | . | . | . | 2 | 9 | 3 | . | . | . | . | . | 14 |
| 290. <i>Minoa</i> Hfn. | . | . | . | . | 5 | 9 | 2 | 3 | . | . | . | . | 19 |
| 292. <i>Cheimatobia</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 12 | . | 16 |
| 293. <i>Anisopteryx</i> Stph. | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| F. Tortricidae. | | | | | | | | | | | | | |
| XX. TORTRICINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 294. <i>Teras</i> Tr. | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | 6 |
| 295. <i>Tortrix</i> L. Tr. | . | . | . | . | 2 | 15 | 16 | 6 | . | . | . | . | 39 |
| 296. <i>Scaphila</i> Tr. | . | . | . | . | . | 10 | 3 | 1 | . | . | . | . | 14 |
| 297. <i>Cheimatophila</i> H. | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | 14 |
| 299. <i>Olindia</i> Gn. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 300. <i>Conchilis</i> Tr. | . | . | . | . | 11 | 8 | 3 | 1 | . | . | . | . | 23 |
| 302. <i>Grapholitha</i> Tr. | . | . | . | 6 | 73 | 48 | 16 | 10 | 2 | . | . | . | 155 |
| 303. <i>Dichrorampha</i> Gn. | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 6 |
| G. Pyralides. | | | | | | | | | | | | | |
| XXI. PYRALIDINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. Pyralididae. | | | | | | | | | | | | | |
| 305. <i>Aglossa</i> Ltr. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 307. <i>Endotricha</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 |
| II. Botidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 309. <i>Scoparia</i> Hw. | . | . | . | . | . | 7 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | 15 |
| 312. <i>Heliothela</i> Gn. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 315. <i>Hercynia</i> Tr. | . | . | . | . | . | 5 | 3 | 7 | . | . | . | . | 15 |
| 322. <i>Eurrhyncha</i> H. | . | . | . | . | 3 | 18 | 8 | 1 | . | . | . | . | 30 |
| 323. <i>Botys</i> Tr. | . | . | . | 29 | 32 | 16 | 38 | 29 | 16 | . | . | . | 160 |

| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 324. <i>Eurycreon</i> Ld. | . | . | . | 5 | 23 | 2 | 9 | 10 | . | . | . | . | 49 |
| 325. <i>Nomophila</i> H. | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 13 | 37 | 3 | . | 57 |
| 327. <i>Pionea</i> Gn. | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 7 | . | . | . | . | 13 |
| 328. <i>Orobena</i> Gn. | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 6 | . | . | . | . | 14 |
| 330. <i>Diasemia</i> Gn. | . | . | . | . | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | . | . | . | 28 |
| 334. <i>Hydrocampa</i> Gn. | . | . | . | . | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | . | . | . | 27 |
| 335. <i>Paraponyx</i> H. | . | . | . | . | 3 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | 9 |
| 336. <i>Cataclysta</i> H. | . | . | . | . | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | . | . | . | 31 |
| IV. Crambidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 342. <i>Crambus</i> F. | . | . | . | . | 36 | 83 | 59 | 71 | 22 | . | . | . | 271 |
| V. Phycideae. | | | | | | | | | | | | | |
| 345. <i>Dioryctria</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 348. <i>Salebria</i> Zll. | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 5 |
| 370. <i>Ephestia</i> Gn. | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| VI. Galleriae. | | | | | | | | | | | | | |
| 373. <i>Aphomia</i> H. | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 1 | . | . | . | . | 10 |
| H. Tineidae. | | | | | | | | | | | | | |
| XXIV. Fam. TINEINA. | | | | | | | | | | | | | |
| III. Tineidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 387. <i>Tinea</i> L. | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 392. <i>Nemophora</i> H. | . | . | . | . | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 |
| IV. Adelidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 393. <i>Adela</i> Ltr. | . | . | . | . | 2 | 11 | 2 | 1 | . | . | . | . | 16 |
| 394. <i>Nematois</i> H. | . | . | . | . | 2 | 1 | 6 | 6 | . | . | . | . | 15 |
| VIII. Hyponomeutidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 403. <i>Hyponomeuta</i> Latr. | . | . | . | . | . | 5 | 14 | 26 | 9 | . | . | . | 54 |
| IX. Plutellidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 407. <i>Plutella</i> L. | . | . | . | . | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | 12 | . | . | 53 |
| 408. <i>Cerostoma</i> Ltr. | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 7 |
| XI. Chimabachidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 412. <i>Chimabache</i> Zll. | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| XII. Gelechiidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 422. <i>Teleia</i> | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 426. <i>Nannodia</i> | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 438. <i>Tachyptilia</i> | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 458. <i>Hypercallia</i> Stph. | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 |
| XIII. Glyphipterigidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 473. <i>Glyphipteryx</i> H. | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVI. Butalidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 494. <i>Butalis</i> Tr. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVII. Elachistidae. | | | | | | | | | | | | | |
| 498. <i>Elachista</i> Sc. | . | . | . | 2 | 4 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 12 |
| XXIV. Coleophoridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 510. <i>Coleophora</i> Zll. | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 8 |
| XXV. Gracilaridae. | | | | | | | | | | | | | |
| 513. <i>Corisium</i> Zll. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |

| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| XXVI. <i>Argyresthidae</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 518. <i>Argyresthia</i> H. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| XXVII. <i>Lithocolletidae</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 520. <i>Lithocolletis</i> Zell. | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| XXX. <i>Nepticulidae</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| 531. <i>Nepticula</i> Zll. | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
| XXV. Fam. MICROPTERIGINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 532. <i>Eriocephala</i> Curtis. | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
| I. <i>Pterophoridae</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| XXVI. Fam. PTEROPHORINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 538. <i>Oxyptilus</i> Zll. | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
| 539. <i>Mimaesoptilus</i> Wallgr. | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 |
| 543. <i>Acyptilia</i> Hb. | | | | | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | 18 |

Tab. III.

Frequenz der Familien.

| Familie | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| B. <i>Sphinges</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| II. <i>Sesiaria</i> | | | | | | 5 | 5 | 1 | | | | | 11 |
| III. <i>Thyridina</i> | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
| IV. <i>Sphingina</i> | | | | 2 | 19 | 56 | 97 | 88 | 97 | 27 | 3 | 3 | 392 |
| V. <i>Zygaenoidea</i> | | | | | 5 | 23 | 30 | 27 | 2 | | | | 87 |
| C. <i>Bombyces</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| VI. <i>Cossina</i> | | | | | 2 | 1 | 5 | | 1 | | | | 9 |
| VII. <i>Epialoidea</i> | | | | | | 2 | | 8 | 1 | | | | 11 |
| VIII. <i>Psychina</i> | | | 3 | 7 | 10 | 1 | | | | | | | 21 |
| IX. <i>Drepanulia</i> | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| X. <i>Saturnina</i> | | | 2 | 10 | 3 | 2 | | | | | | | 17 |
| XI. <i>Bombycoidea</i> | 2 | | 3 | 4 | 4 | 14 | 31 | 9 | 4 | | | | 71 |
| XII. <i>Notodontina</i> | | | | 3 | 5 | 1 | 2 | | | | 3 | | 14 |
| XIII. <i>Liparidina</i> | | | | 5 | | 4 | 29 | 4 | 6 | | | | 48 |
| XIV. <i>Arctioidea</i> | | | | 9 | 14 | 7 | 28 | 18 | 6 | | | | 82 |
| XVI. <i>Lithosina</i> | | | | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | | | | 35 |
| XVII. <i>Brephina</i> | | | 10 | 2 | | | | | | | | | 12 |
| D. <i>Noctuae</i> . | | | | | | | | | | | | | |
| XVIII. NOCTUINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. <i>Cymatophoridae</i> | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
| II. <i>Bombycoidea</i> | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| III. <i>Acronyctidae</i> | | | | 7 | | 1 | 6 | 12 | | | | | 26 |
| IV. <i>Hadenidae</i> | | | | | 16 | 32 | 33 | 29 | 8 | 3 | | | 121 |
| V. <i>Xylinidae</i> | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| VII. <i>Cucullidae</i> | | 2 | | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | | | | 26 |
| VIII. <i>Orthosidae</i> | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 31 | 23 | 16 | 5 | | | 86 |
| IX. <i>Agrotidae</i> | | | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 19 |
| XI. <i>Anartidae</i> | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| XIII. <i>Ophiussidae</i> | | | | 12 | 11 | 15 | 20 | 25 | 15 | | | | 98 |
| XV. <i>Plusiidae</i> | | | | 2 | | 15 | 29 | 60 | 117 | 52 | 2 | | 277 |
| XVI. <i>Noctuophalaenidae</i> | | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | 14 |
| XVII. <i>Deltoideae</i> | | | | | 2 | 2 | 2 | 8 | | 2 | | | 16 |

| Familie | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| E. Geometrae. | | | | | | | | | | | | | |
| XIX. GEOMETRINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. <i>Dendrometrinae</i> | | | 4 | 41 | 95 | 97 | 107 | 67 | 17 | 3 | 2 | . | 433 |
| II. <i>Phytometrinae</i> | | | 3 | 9 | 55 | 78 | 84 | 190 | 87 | 12 | 12 | . | 530 |
| F. Tortricidae. | | | | | | | | | | | | | |
| XX. TORTRICINA. | | | 2 | 6 | 90 | 85 | 41 | 20 | 2 | . | 12 | . | 258 |
| G. Pyralides. | | | | | | | | | | | | | |
| XXI. PYRALIDINA. | | | | | | | | | | | | | |
| I. <i>Pyralididae</i> | | | . | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | . | . | 5 |
| II. <i>Botidae</i> | | | . | 34 | 72 | 85 | 90 | 86 | 42 | 37 | 3 | . | 449 |
| IV. <i>Crambidae</i> | | | . | . | 36 | 83 | 59 | 71 | 22 | . | . | . | 271 |
| V. <i>Phycidae</i> | | | . | . | . | 3 | 6 | . | . | . | . | . | 9 |
| VI. <i>Galleriae</i> | | | . | . | . | 4 | 5 | 1 | . | . | . | . | 10 |
| H. Tineidae. | | | | | | | | | | | | | |
| XXIV. Fam. TINEINA. | | | | | | | | | | | | | |
| III. <i>Tineidae</i> | | | . | . | 7 | 3 | . | . | . | . | . | . | 10 |
| IV. <i>Adelidae</i> | | | . | . | 4 | 12 | 8 | 7 | . | . | . | . | 31 |
| VIII. <i>Hyponomeutidae</i> | | | . | . | . | 5 | 14 | 26 | 9 | . | . | . | 54 |
| IX. <i>Plutellidae</i> | | | . | . | 3 | 5 | 7 | 8 | 23 | 14 | . | . | 60 |
| XI. <i>Chimabachidae</i> | | | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| XII. <i>Gelechiidae</i> | | | . | . | . | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | 6 |
| XIII. <i>Glyphipterigidae</i> | | | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVI. <i>Butalidae</i> | | | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XVII. <i>Elachistidae</i> | | | . | 2 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 12 |
| XXIV. <i>Coleophoridae</i> | | | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 8 |
| XXV. <i>Gracilaridae</i> | | | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XXVI. <i>Argyresthidae</i> | | | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| XXVII. <i>Lithocolletidae</i> | | | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 |
| XXX. <i>Nepticulidae</i> | | | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| XXV. Fam. MICROPTERIGINA. | | | | | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 |
| I. Pterophoridae. | | | | | | | | | | | | | |
| XXVI. Fam. PTEROPHORINA. | | | . | . | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | . | . | 24 |

Tab. IV.

Frequenz der Ordnungen.

| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| A. <i>Papiliones</i> | . | 12 | 110 | 284 | 294 | 471 | 511 | 494 | 590 | 320 | 58 | . | 3144 |
| B. <i>Sphinges</i> | . | . | . | 2 | 26 | 85 | 132 | 116 | 99 | 27 | 3 | 3 | 493 |
| C. <i>Bombyces</i> | 2 | . | 18 | 42 | 42 | 35 | 109 | 50 | 21 | . | 3 | . | 322 |
| D. <i>Noctuae</i> | . | 2 | 2 | 31 | 45 | 80 | 136 | 173 | 162 | 64 | 2 | . | 697 |
| E. <i>Geometrae</i> | . | . | 7 | 50 | 150 | 175 | 191 | 257 | 104 | 15 | 14 | . | 963 |
| F. <i>Tortricidae</i> | . | . | 2 | 6 | 90 | 85 | 41 | 20 | 2 | . | 12 | . | 258 |
| G. <i>Pyralides</i> | . | . | . | 34 | 108 | 176 | 161 | 161 | 64 | 37 | 3 | . | 744 |
| H. <i>Tineidae</i> | . | . | . | 6 | 27 | 35 | 36 | 47 | 32 | 14 | . | . | 197 |
| I. <i>Pterophoridae</i> | . | . | . | . | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | . | . | 24 |
| Totale | 2 | 14 | 139 | 455 | 791 | 1146 | 1320 | 1320 | 1076 | 481 | 95 | 3 | 6842 |


| Gattung | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| $\frac{1}{3} (n-1 + n + n+1).$ | | | | | | | | | | | | | |
| A. <i>Papiliones</i> | 4 | 40 | 135 | 229 | 350 | 425 | 492 | 532 | 468 | 323 | 126 | 19 | 3143 |
| B. <i>Sphinges</i> | . | . | . | 9 | 38 | 81 | 111 | 116 | 81 | 43 | 11 | 2 | 492 |
| C. <i>Bombyces</i> | 1 | 7 | 20 | 34 | 40 | 62 | 65 | 60 | 24 | 8 | 1 | 2 | 324 |
| D. <i>Noctuae</i> | 1 | 1 | 12 | 26 | 52 | 87 | 130 | 157 | 133 | 76 | 22 | 1 | 698 |
| E. <i>Geometrae</i> | . | 2 | 19 | 69 | 125 | 172 | 208 | 184 | 125 | 44 | 10 | 5 | 963 |
| F. <i>Tortricidae</i> | . | 1 | 3 | 33 | 60 | 72 | 49 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 259 |
| G. <i>Pyrallides</i> | . | . | 11 | 47 | 106 | 148 | 166 | 129 | 87 | 35 | 13 | 1 | 743 |
| H. <i>Tineidae</i> | . | . | 2 | 11 | 23 | 33 | 39 | 38 | 31 | 15 | 5 | . | 197 |
| I. <i>Pterophoridae</i> | . | . | . | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | . | 23 |
| Totale | 6 | 51 | 202 | 461 | 798 | 1085 | 1263 | 1239 | 959 | 551 | 193 | 34 | 6842 |
| <i>B — R.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| A. <i>Papiliones</i> | — 4 | — 28 | — 25 | + 55 | — 56 | + 46 | + 19 | — 38 | + 122 | — 3 | — 68 | — 19 | + 1 |
| B. <i>Sphinges</i> | . | . | . | — 7 | — 12 | + 4 | + 21 | 0 | + 18 | — 16 | — 8 | + 1 | + 1 |
| C. <i>Bombyces</i> | + 1 | — 7 | — 2 | + 8 | + 2 | — 27 | + 44 | — 10 | — 3 | — 8 | + 2 | — 2 | — 2 |
| D. <i>Noctuae</i> | — 1 | + 1 | — 10 | + 5 | — 7 | — 7 | + 6 | + 16 | + 29 | — 12 | — 20 | — 1 | — 1 |
| E. <i>Geometrae</i> | . | — 2 | — 12 | — 19 | + 25 | + 3 | — 17 | + 73 | — 21 | — 29 | + 4 | — 5 | 0 |
| F. <i>Tortricidae</i> | . | — 1 | — 1 | — 27 | + 30 | + 13 | — 8 | — 1 | — 5 | — 5 | + 8 | — 4 | — 1 |
| G. <i>Pyrallides</i> | . | . | — 11 | — 13 | + 2 | + 28 | — 5 | + 32 | — 23 | + 2 | — 10 | — 1 | + 1 |
| H. <i>Tineidae</i> | . | . | — 2 | — 5 | + 4 | + 2 | — 3 | + 9 | + 1 | — 1 | — 5 | . | 0 |
| I. <i>Pterophoridae</i> | . | . | . | — 3 | + 5 | — 1 | 0 | 0 | — 1 | + 2 | — 1 | . | + 1 |
| Totale | — 4 | — 37 | — 63 | — 6 | — 7 | + 61 | + 57 | + 81 | + 117 | — 70 | — 98 | — 31 | 0 |

Tab. V.

Vertheilung der Arten.

| Art | Jänn. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| A. <i>Papiliones</i> | . | 2 | 10 | 28 | 43 | 69 | 72 | 55 | 34 | 20 | 13 | . | 87 |
| B. <i>Sphinges</i> | . | . | . | 1 | 5 | 20 | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| C. <i>Bombyces</i> | 1 | . | 4 | 14 | 13 | 19 | 26 | 15 | 8 | . | 1 | . | 52 |
| D. <i>Noctuae</i> | . | 1 | 1 | 7 | 13 | 33 | 45 | 38 | 26 | 6 | 1 | . | 83 |
| E. <i>Geometrae</i> | . | . | 3 | 13 | 31 | 44 | 49 | 48 | 21 | 5 | 2 | . | 95 |
| F. <i>Tortricidae</i> | . | . | 1 | 3 | 18 | 33 | 27 | 11 | 1 | . | 1 | . | 49 |
| G. <i>Pyrallides</i> | . | . | . | 5 | 18 | 30 | 38 | 38 | 13 | 1 | 1 | . | 94 |
| H. <i>Tineidae</i> | . | . | . | 3 | 13 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | . | . | 37 |
| I. <i>Pterophoridae</i> | . | . | . | . | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 9 |
| Totale | 1 | 3 | 19 | 74 | 158 | 269 | 293 | 227 | 118 | 38 | 20 | 1 | 494 |



Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Arten.



Lith. v. F. Schima.

Druck v. J. Wagner Wien.



Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Gattungen.





Lith. v. F. Schima.

Druck v. J. Wagner Wien.

Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Familien



Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Ordnungen.



Fritsch, Karl,

Jährliche-Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn

Bd.: IV,2

Wien 1875

4 Zool. 128 f,IV-2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11312000-3